



526

~~25-26~~
Phyt 762

Hist. nat

526

~~Phyt. No. 215.~~

H. A. D. H. C. H.

Einleitung in das Studium

Kritische Geschichte der

Philosophie

von A. D. H.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Neumann, Neudamm

1845

Dr. A. D. H.

M. H. A. D. H.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Neumann, Neudamm

1845


H a n d b u c h

der

Einleitung in das Studium

der

kryptogamischen Gewächse.



Praktischer Theil.


Erste Abtheilung.

Deutschlands Filices, Musci frondosi et hepatici.

Von

Fr. Weber und D. M. H. Mohr.

Mit Kupfern.



K i e l,

in der akademischen Buchhandlung.

1807.

Botanisches
Taschenbuch
auf das Jahr 1807.

Deutschlands
kryptogamische Gewächse.


Erste Abtheilung.

Filices, Musci frondosi et hepatici.

Von
Friedr. Weber
und
D. M. H. Möhr.

Mit Kupfern.

Kiel,
in der akademischen Buchhandlung.
1807.



Hier im geheimen Gemach, versteckt vor Kü-
sternen Augen,
Feiert ein scheinendes Geschlecht Aphroditens Fest
im Verborgnen.

Neubek.

**Bayerische
Staatsbibliothek
München**

Ihren verehrten Freunden,

den Herren

Prof. O. S w a r t z

z u S t o c k h o l m

und

D. Dawson Turner

z u Y a r m o u t h ,

den

verdienten Kryptogamenforschern,

widmen

d i e s e n B a n d

mit Hochachtung und Dankbarkeit

die Verfasser.

Die deutsche Literatur

von Heinrich

Prof. Dr. O. W. L.

in der

und

D. Dr. W. L.

in der

der

Verdienten K. Hofrath

Witten

Die deutsche

mit Hochachtung und Dankbarkeit

die Verfasser.

V o r r e d e.

Der Plan dieses Werks ist ein gedoppelter. Zuerst wollen wir in dem gegenwärtigen Bande, und einem oder zwei folgenden (für die Flechten, Pilze und kryptogamischen Wassergewächse), ein dem heutigen Zustande der Wissenschaften angemessenes Hand- und Taschenbuch über die deutschen Kryptogamen liefern. Demnächst wünschen wir in dem theoretischen Theile dem Freunde dieser Pflanzengruppe alle diejenige Anleitung zu geben, die er zu einem fruchtbaren Studium dieser Gewächse bedarf. Wir rechnen dahin: 1) das Abweichende, was, leider! die Terminologie der Kryptogamen von der der Phänoga-

men bekommen hat; 2) etwas über die Physiologie dieser Gewächse, womit 3) zusammenhängt ihre vollständige Generations- und Fructificationstheorie; 4) das ganze Systemgebäude, auch mit Ausdehnung auf die ausländischen Arten; 5) die botanische Geographie dieser Gewächsgruppe, soweit man darüber schon unterrichtet ist; 6) die Geschichte der Wissenschaft und ihrer Bücherkunde, u. m. a. Besonders wichtig schien uns aber bei diesen bloss mikroskopischen Gegenständen die Zugabe einer Reihe von Kupfertafeln, die theils alle generischen Charactere, theils die gesamte Physiologie und Generations- und Fructificationstheorie deutlich und treu nach der Natur darstelle, die mithin die obengenannten Rubriken 2, 3 und 4 auf das Vollkommenste erläutere. In Absicht auf die Rubrik 4, wo diese Abbildungen zwischen der praktischen und theoretischen Abtheilung des Werks vertheilt seyn mussten,

weil von den exotischen Gattungen erst in letzterer die Rede ist, würden dieselben dann zu gleicher Zeit von der andern Seite der Vollendung des Unternehmens Gärtner's über die Früchte der Pflanzen entgegenarbeiten.

Wir wissen wohl, dass die Arbeit, die wir uns vorgesteckt haben, keine leichte ist; wir sind sogar nahe daran gewesen, zu glauben, dass wir sie nicht vollenden könnten. Es ist uns nemlich keineswegs um eine Compilation zu thun. Wir lieben, die Natur selbst zu beobachten. Wir wünschen also nicht bloss die Arten nach der Natur, aus eigner Untersuchung zu characterisiren; es ist vielmehr unsere ernstliche Absicht, theils das System der Kryptogamen im Einverstande mit der Natur, nach den Frucht- und fruchtähnlichen Theilen, und nach ihnen allein, zu vollenden, theils eben so die Lücken auszufüllen, die in den Kenntnissen vom Bau der Vege-

tations- und fortpflanzenden Theile dieser Gewächse sind. Wenn wir also dem Anfänger im Studium eine treue Anleitung zu geben bemüht seyn wollen: so soll unser Werk doch auch dem Kenner im Fach etwas bringen, das ihn uns zum Freunde macht. Kein ephemeres Product mögten wir liefern, als etwa insofern wir die behandelten Gegenstände selbst künftig in andern Schriften noch weiter verfolgten. Denn, wer im Erforschen der Natur seine Arbeit je zu endigen wähnt, der darf bei seinem Leben zum mindesten gar nichts drucken lassen.

Nun ein Paar Worte über die Ausführung und einige nöthige Erinnerungen. Im Ganzen muss sich ein Buch selbst — nicht loben — sondern nur eine freundliche Aufnahme bei den billigen Kundigen erwerben, die bei den Schwierigkeiten der Aufgabe, welche sie kennen, nicht auf das Höchste sehn, was hätte geleistet

werden können, sondern das wirklich Gute beherzigen, was geleistet ist.

Zuerst müssen wir sagen: man richte nicht zu streng unsre Form. Das Gewand ist bei Werken der empirischen Naturforschung (und sollte es eine andre geben?) Nebensache. Sind die Beobachtungen treu, ist mit Einem Worte Neues und Wahres im Buch, so werden wir zufrieden seyn.

Sodann trenne man Meinungen und Beobachtungen sorgfältig von einander. Jene sind ewig dem Wechsel unterworfen, diese müssen es nicht seyn. Der Stich der Kupfer zu diesem Werke ward vor zwei Jahren angefangen; fast ein Jahr ist an dem Buche gedruckt. Mittlerweile änderten sich, bei erlangten bessern Einsichten, über manches unsre Meinungen. Die Genera der Laubmoose z. B. waren durch die Kupfer und später durch den ersten Bogen des Werks schon bestimmt. Wir konnten daran nachher nichts mehr ändern, obwohl

wir es gern gethan hätten; denn manche Verbindungen und manche Trennungen erscheinen uns jetzt unnatürlich. Indess glauben wir nicht, dass in einem Werke, wie das vorliegende, an diesem Punkte so sehr viel hängt. Mag man über natürliches und künstliches System denken, wie man will, so können wenigstens Faunen und Floren, ihrem Object nach, das erste wohl nie anschaulich machen. Für sie, zudem den Handbüchern des Anfängers, der im natürlichen System kein Heil findet, sind die künstlichen Scheidungen, welche allein Schärfe der Definition zulassen. Das beste System kann also der Anfänger nicht aus einer Flora lernen. Ueberdem kommen wir ja zur revidirten Darstellung des ganzen Systems im theoretischen Theile, und in Worten und Zeichnungen wird sich dann Alles ändern und bessern lassen.

Erster Zweck einer Fauna oder Flora ist allerdings, die Producte des

Landes den Einwohnern, die an dem Studium Vergnügen finden, näher bekannt zu machen. Ein zweiter ist aber, glauben wir, überhaupt zur Berichtigung des Verzeichnisses der Arten (*species*) des ganzen Erdbodens beizutragen. Denn woraus entstehen die *Systemata Vegetabilium* oder *Animalium*, als aus den einzelnen Verzeichnissen über die verschiednen Theile der Erde? Den ersten Zweck glaubten wir, ohne durchgängige ausführliche Beschreibungen, durch gute Diagnosen, und, wo es nöthig war, kurze beigefügte Bemerkungen, und mit sparsamer Synonymie erreichen zu können. Auch schien es uns in dem Handbuche über eine so weitläufige Flor, wie die deutsche, nicht schicklich, bei jeder gemeinen Art alle bisher bekannt gewordne Fundorte und ihre Entdecker aufzuzählen; mehr geographisch, als topographisch, gaben wir also, seltne oder neue Arten ausgenommen, die Wohnplätze an.

Durch diese, der Sache gemässe Kürze, gewannen wir dann Platz, dem zweiten oben erwähnten Zweck in einiger Ausführlichkeit Genüge zu leisten. Die verwandten Arten der Schweiz und des Nordens von Europa, Grossbritanniens und Schwedens, liessen wir uns billig am meisten angelegen seyn, vernachlässigten aber auch nicht die ausländischen. So entstanden die den meisten Arten beigefügten kritischen Excurse.

Unsre Charaktere sind und werden seyn — mit wenigen Ausnahmen — mikroskopisch. Ohne das Göttergeschenk des zusammengesetzten Mikroskops ist auf diesem Felde durchaus keine Aernte! Man lernt durch lange Uebung beim häufigen Botanisiren die gewöhnlichen Arten zur Noth aus der Ansicht kennen; aber auch nur zur Noth. Gewissheit giebt nur die geschickte Analyse aller Theile unter dem Mikroskop. Darum bedarf man keiner kostbaren Instru-

mente. Die reine, gut geschliffne Linse in einem schlechten Gewande, thut dasselbe, was die kostbaren englischen Werkzeuge leisten, bei denen natürlich der grösste Theil des Preises auf das zierliche und prächtige — Unwesentliche fällt. In den Gesetzen der Physik findet die Möglichkeit des Grades der Vergrösserung bald ihre Grenze. Wenn uns also jene Instrumente mit Vorspiegelungen überstarker Vergrösserungen *) verkauft werden,

*) Man pflegt wohl von Vergrösserungen von 2 Mill. mal zu reden. Die Rechnung kommt freilich heraus, wenn man eine Linse hat, die 125 mal den Durchmesser vergrössert, und man dann von der cubischen Vergrösserung des Körpers spricht. Wir sehen aber nicht den ganzen Inhalt des Körpers, sondern nur seine halbe Oberfläche; also auch bei jener Linse kann man nur von 15,000 maliger Vergrösserung sprechen. Ohnehin ist dann an der Deutlichkeit mehr verloren, wie an der Vergrösserung gewonnen ist. Die Hoffmann-

so ist das meistens Blendwerk. Selten sieht man deutlich, wenn die Linse des Mikroskops viel mehr als 100mal im Durchmesser, oder 10,000mal in der Fläche vergrössert. Aber, was mehr noth ist, als theure Mikroskope, ist die Kunst der Zergliederung und einige feine und scharfe Messer. Jene will lange Uebung, auch vielleicht ein natürliches Geschick.

Wir weichen nicht selten von den besten Forschern, einem *Hedwig*,

schen und Weikardschen, von Hedwig gebrauchten und durch ihn bekannter gewordenen Mikroskope leisten mit der 6ten Linse die letzterwähnte Vergrösserung. Hedw. gebrauchte sie selbst wenig, und auch uns schien dabei Klarheit zu fehlen. No. 5. jener Mikroskope mag 80- bis 100mal den Durchmesser vergrössert darstellen, und bei dieser Vergrösserung, als der höchsten, befanden wir uns bisher wohl. Sie lässt sich aber in einem Instrumente zu 5 bis 10 Thalern auch haben.

Swartz u. ähnl. ab. Theils ist diess in der Beobachtung. Namentlich sehen wir in sehr vielen Moosen Nerven und Serraturen des Blatts, wo sie Hedwig oder andre läugnen. Fast alle Hypna, die man bisher nervenlos glaubte, sind, nach unserer Beobachtung, unten mit zwei, oft freilich höchst unmerklichen und augenblicklich verlöschenden Nerven versehen. In allen diesen Fällen sind wir mit Vorsicht verfahren, und haben nicht schnell entschieden. Ein Anderes, worin wir oft von der gewöhnlichen Annahme abgehen, beruht auf Meinung. Wir reden davon, dass wir vieles nur Varietät nennen, was andern Species ist. Wir haben auch hier sorgfältig untersucht; und, wo selbst die beste Vergrößerung keine wesentlichen Unterschiede entdeckt, da scheint es uns besser, zu wenig denn zu viel Species. *Die Species sind nicht*

das Ziel der höhern Naturforschung. Was sich nur unmerklich und unwesentlich unterscheidet, wird keine besondere Resultate für die höhere Naturforschung liefern. Ohnehin ist die Metamorphose der Theile, das Formenspiel nach den kleinen Bedingungen der äussern Umstände, auf den untersten Stufen von Vegetabilität und Animalität endlich immer mehr grenzenlos! Hypothetisch ist und bleibt aber bei diesen Pflanzen stets die Bestimmung dessen, was Art ist. Wir können sie nicht durch Versuche erhärten.

Folia apiculata haben wir bei den Moosen genannt, wo der Nerv aus dem Blatte hervortritt, jedoch grün bleibt, folia pilifera die vorigen, wenn die vorragende Spitze weiss ist. Folia acuminata sind uns hingegen Blätter mit einem merklich verschmälerten Obertheil, der jedoch aus der Blattsubstanz selbst, mit

oder ohne Nerven, besteht. Nervum
excurrentem heissen wir den
Nerv, der die ganze pagina des Blatts
durchläuft, weder vor der äusser-
sten Spitze aufhört, noch über sie
hinausgeht, nervum excedentem
hingegen den Nerven, der entweder
folia apiculata oder pilifera bildet.
Verläuft sich der Nerv vor der Spitze
des Blatts, so nennen wir ihn eva-
nescens oder evanidus. Das
Abstehn der Blätter oder Aeste vom
Stamm u. a. haben wir nach Wah-
lenbergs trefflicher scala bei seiner
Caricographie in den nov. act.
Holmenss. bestimmt. Jeder kann
sich diese scala leicht selbst machen.
Folia erecta weichen nach ihr um
10, erecto-patentia um 30, pa-
tentia um 50, patenti-diver-
gentia um 70 Gr. von der Vertical-
linie ab, divergentia um 90 Gr.,
sie sind also folia horizontalia.
Abwärts weichen von den foliis
horizontalibus um 20 Gr. folia

divergenti-divaricata ab, um 40 divaricata, um 60 divaricato-reflexa, endlich um 80 folia reflexa. — Sonst sind wir in der Terminologie bei den Moosen fast immer dem gefolgt, was Hedw. vor den *Spec. musc.* angegeben hat. Man wird uns verstehen. Logisch revidirt ist die Terminologie ja, leider! überall nicht, und wir mögen an ihr nicht zu Helden werden. Wir sind hier Eklektiker.

Die ganz neuen Arten sind vorn mit einem †, die für die deutsche Flora neuen mit einem * bezeichnet.

Die von Sprengel in Zweifel gesetzte Existenz der Hedwigschen Gattung *Pohlia* ist durch unsre fig. 1. Taf. X. bestärkt; hingegen haben wir erwiesen (s. die *Emend.*), dass es nur Eine *Pohlia*, die *elongata*, gibt. Das innere Peristom der *Funaria*, was Hr. Palisot de Beau-

vois ablängnet, und daraus die Trüglichkeit von Hedwigs mikroskopischen Beobachtungen erweist, haben wir doch gefunden (T. IX. ff. 6. 8.). Das Peristom der *Buxbaumia aphylla* ist wohl zum erstenmal richtig hier gezeichnet (T. XI. f. 2.). Die Gattung *Andreaea* hat an einer gleich ausgezeichneten als merkwürdigen Art einen Zuwachs gewonnen (T. XI. ff. 7-9.), und die Existenz der, wenn gleich als Art nicht so ganz unzweifelhaften *Andr. rupestris* in Deutschland, ist endlich erwiesen (T. XI. ff. 5. 6.). Die beiden *Timmien* sind wohl zum erstenmal ganz genau behandelt. Die verschiednen Formen der *Calyptra* bei den Laubmoosen sind sorgfältiger, wie zuvor, auseinandergesetzt. Einige Gattungsskaraktere der *Farnkräuter*, und die der *Radicalien* waren früher minder deutlich dargestellt. In Absicht der letztern muss man jedoch erst noch die Zeichnungen von den befruchten-

den Organen im theoretischen Theile erwarten.

Endlich, freundlicher Leser:

Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti; si non, his utere mecum.

Kiel, zur Ostermesse 1807.

W. M.

Index auctorum.

- A**bhot Flora bedfordensis.
Allioni, Car., Flora pedemontana etc. T. 1-3.
Aug. Taur. 1785. fol.
Anales de histor. natur. No. 1-6. Madrid 1799.
1800. — Anal. de Ciencias natural. No. 7-20.
Ibid. 1801-1804. 8.
Barrelier, Jac., Plantae p. Gall., Hispan. et Ital.
observv. Paris. 1714. fol.
Beauvois, A. M. F. J. Palisot-, Prodrôme des
cinq. et six. famill. de l'Aethéogamie. Paris
1805. 8.
Bellardi, Ludov., Append. ad Flor. pedemont.
Aug. Taur. 1792. 4.
Blackwell herbar. emend. et auct. c. praef. Chr.
Trew. Cent. 1-6. Norimb. 1750-1772. fol.
Blandow, O. C., Musci frondosi exsicc. Fasc.
1-3.
Bolton, Jam., Filices Britanniae. Pl. I. II. Leeds
and Huddersfield. 1785. 1790. 4.

XXII Index auctorum.

Bory de St. Vincent, J. B. G. M., Essais sur les
isl. fortunées. Paris. 1803. 4.

Ejusd. Voyage dans les 4 principal. iles des mers
d'Afrique. Vol. 1-3. Paris. 1804. 8.

Breyn., Jac., Exoticarum — plantar. centuria.
Gedani 1678. fol.

Bridel., Sam. El., Muscologia recentiorum etc.
T. I. II. P. 1-3. Gothae et Paris. 1797-1803. 4.

Ejusd. oper. Supplementum s. species muscorum.
P. I. Gothae 1806. 4.

Brückner, Ad. Fr., Diss. inaug. bot. sist. Florae neo-
brandenb. prodrom.. Jenae 1803. 8.

Bulliard Herbar de la France — 106 Cah. Par.
1780. fol.

Buxbaum, Jo. Christ., Plantar. minus cognitar.
Centuriae 1-5. Petrop. 1728-1733. 4.

Cavanilles, Ant. Jos., Descripcion de las plantas
que — demonstró en las lecciones públicas de
1801. 1802. 8.

Crome, Ge. E. Wilh., Samml. deutscher Laub-
moose (exsicc.) Schwerin 1803. — Erste Nach-
lief. Das. 1805. Zweite Nachlief. Das. 1806. 4.

Curtis, W., Flora Londinensis. Vol. 1. 2. Lond.
1777. fol.

Dickson, Jac., Fasciculi 1-4. plantt. cryptogamm.
Britann. Lond. 1785-1801. 4.

Ejusd. Dried Plants (exsicc.)

Index auctorum. XXIII

Dillenii, Jo. Jac., Catalog. plantt. sponte circa
Gissam nascentt. Francof. ad M. 1719. 8.

Ejusd. histor. muscor. Oxon. 1741. 4.

Ehrharti, Frid., Phytophylacium (exsicc.) fol.

Ejusd. Plantae cryptogamae Linn. Dec. 1-32. (ex-
sicc.) Hannov. 1785 - 1793. fol.

Ejusd. Beiträge zur Naturkunde u. s. w. B. I - 7.
Hannov. 1787 - 1792. 8.

Flora danica. Vol. I - VII. Hafn. 1761 - 1799. fol.

Forskäl, P., Flora aegypt. - arabica. Hafn. 1775. 4.

Funck, Heinr. Christ., Cryptogam. Gewächse des
Fichtelgebirgs. H. I - 7. 1801 - 1806. 4. (exsicc.)

Göttingische gelehrte Anzeigen. 8.

Gouan, Ant., Flora monspeliaca. Lugd. 1765. 8.

Gunner, Jo. Ern., Flora norvegica. P. 1. 2. Nidros.
et Hafn. 1766 - 1772. fol.

Halleri, Alb., histor. stirpp. indigenar. Helvetiae.
T. 1 - 3. Bernae 1769. fol.

(Hallische) Allgemeine Literatur - Zeitung. 4.

Hannöverisches Magazin. 4.

Hasselquist, Fr., Iter palaestinum etc. Stockh.
1757. 8.

Hedwig., Jo., Fundam. histor. natur. muscor. fron-
doss. P. I. II. Lips. 1782. 4.

Ejusd. descript. et adunabr. microscop. - analyt.
muscor. frondoss. etc. Vol. I - IV. Lips.
1787 - 1797. fol.

XXIV Index auctorum.

Hedwig, Jo., Sammlung seiner Abhandll. über botan. - ökonom. Gegenstände. B. I. II. Leipz. 1793. 1797. 8.

Ejusd. Theoria generation. et fructificat. plantt. cryptogg. Linnaei retract. et aucta. (Edit. 2.) Lips. 1798. 4.

Ejusd. Spec. muscor. frondosor. Opus posthum. ed. a Fr. Schwaegrichen. Lips. 1801. 4.

Hedwig, R. A., Filicum genn. et species etc. Fasc. 1-4. Lips. 1799 - 1803. fol.

Ejusd. Observv. botann. Lips. 1802. 4.

Hoffmann, Ge. Franz, Deutschlands Flora, oder botan. Taschenb. Th. 1-4. Erlang. 1791-1804. 12.

Ejusd. phytograph. Blätter. St. 1. 2. Gött. 1803. 8.

Hoppe, D. H., botanisches Taschenbuch. 1790-1806. 8.

Ejusd. herbar. viv. plantt. rarior., praesertim alpin. etc. Cent. 1-4. Ratisb. 1798 - 1804. fol. (exsicc.)

Host, Nic. Th., Synops. plantt. in Austria etc. sponte crescentt. Vindob. 1797. 8.

Hudsoni, Guil., Flora anglica. T. 1. 2. Ed. 2. Lond. 1778. 8.

Jacquín, Nic. Jos., Observv. P. 1-4. Vindob. 1764. 8.

Ejusd. Miscellanea austriaca etc. Vol. 1. 2. Vind. 1778 - 1781. 4.

Jacquin, Nic. Jos., Icones plantt. rarior. T. 1-3.

Vindob. 1781-1793. fol.

Ejusd. Collectanea ad Botan. etc. Vol. 1-4. Vind.

1786-1793. — Supplem. 1796. 4.

Ejusd. flora austriaca. Cent. 1-5. Vind. 1773-

1776. fol.

Jussien, A. L., Genera plantt. sec. ordd. naturr.
disposita. Paris. 1789. 8.

König, Charl., et J. Sims Annals of Botany. Vol.

I. II. Lond. 1805. 1806. 8.

Kongelige Vetenskaps Academ. Handlingar. Vol.

1-40. Stockh. 1739-1779. — Nya Handlin-

gar. Ibid. 1780-1806. 8.

Leers., J. D., Flora herbörn. Berol. 1789. 8.

Liljeblad, Sam., Svensk Flora. Upsal. 1798. 8.

Linnaei, Car., Species plantt. Ed. 2. P. I. II.

Holm. 1762. 1763. 8.

Ejusd. Genera plantt. — Ed. 8. Cur. J. C. D. Schre-

ber. Vol. I. II. Francof. ad Moen. 1789-1791. 8.

Ejusd. Flora lappon. Ed. 2. Cur. J. Ed. Smith.

Lond. 1792. 8.

Lobel., Matth., plantt. s. stirpp. icones. T. I. 2.

Antw. 1581. 1591. 4.

Ludwig, Carl, Kryptogam. Gewächse des Riesen-

gebirgs. Erste Centur. Laubmoose. (exsicc.)

Mélanges de Philos. et de Mathemat. de la Société

roy. de Turin. Tur. 1759 sqq. 4.

Mémoires de l'acad. roy. des sciences de Paris.

XXVI Index auctorum.

- Mémoires de la Société des Sciences physiques de
Lausanne. Lausanne 1784. 4.
- Michaux, Andr., Flora boreali-america etc. P.
I. II. Paris. et Argentor. 1803. 8.
- Micheli, P. A., nova plantt. genera etc. Flor.
1729. fol.
- Mohr., D. M. H., Observationes botanicae. Kil.
1803. 8. (Dissert.)
- Müller, O. Fr., Flora Fridrichsdal. Argentor.
1767. 8.
- Neckeri, Nat. Jos., Method. muscor. Mannheim.
1771. 8.
- Neue Leipziger Literaturzeitung. 4.
- Nova acta — academ. — naturae curiosor. No-
rimb. 1757 sqq. 4.
- Plukenet., Leon., Phytographia. P. 1-4. Lond.
1791. 1792. 4.
- Plumier, Charl., Traité des Fongères de l'Améri-
que. Paris. 1705. fol.
- Raji, Jo., Synops. method. stirpp. britannicæ. Lond.
1690. 8.
- Rebentisch, Jo. Frid., Prodrum. Florae neomarch.
Berolin. 1804. 8.
- Reichard, J. J., Flora moeno-francofurt. P. I. II.
Francof. ad M. 1773. 1773. 8.
- Retzii, A. Jo., Observv. botann. Fasc. 1-6. Lips.
1779-1791. fol.

Index auctorum. XXVII

Retzii, A. Jo., Flora scandinav. prodr. Ed. 2.
Lips. 1795. 8.

Roemer, Joh. Jac., Archiv f. d. Botanik. B. 1-3.
Leipz. 1796-1805. 4.

EjUSD. et P. Usteri Magaz. f. d. Botanik. B. 1-4.
Zürich 1787-1790. 8.

Roth., Alb. Guil., Tentam. florae german. T. I. II.
P. 1. 2. III. P. 1. Lips. 1788-1800. 8.

EjUSD. Beyträge zur Botan. Th. 1. 2. Brem. 1782.
1783. 8.

EjUSD. Catalecta botanica. Fasc. I-III. Lips.
1797-1806. 8.

EjUSD. Neue Beyträge zur Botan. Th. 1. Frankf.
am M. 1802. 8.

Rüling, Joh. Phil., Verzeichniss der an und auf
dem Harz wildwachsenden Bäume, Gerträuche
und Kräuter etc. (in Gatterer's Anleit. den
Harz zu bereisen. T. 2. p. 186-247.)

Schkuhr, Christ., Deutschlands kryptogam. Ge-
wächse. H. 1-3. Wittenb. und Leipz. 1804-
1806. 4.

Schleicher, J. C., Catalog. plantt. in Helvetia cis
et transalp. sponte nascentium. Bex. 12.

EjUSD. plantae cryptogamm. Helvetiae (exsicc.)
Centuria 1-5.

Schmidel., Casim. Chph., Dissertatt. botan. ar-
gum. revisae et recusae. Erl. 1783. 4.

XXVIII Index auctorum

- Schmidel., Casim. Chph., Icones plantar. et analyses partium etc. Manip. I. II. Ed. 2. Erl. 1793. — Manip. III. Ibid. 1797. fol.
- Schrader, Henr. Ad., Spicileg. Florae german. P. I. Hannov. 1794. 8.
- EjUSD. Samml. Kryptogam. Gewächse. (exsicc.) Liefer. 1. 2. Gött. 1796. 1797.
- EjUSD. Journal für die Botanik. 1799. I. II. 1800. I. II. 1801. I. Gött. 1799 - 1803. 8.
- EjUSD. Neues Journal für die Botan. B. I. Erf. 1806. 8.
- Schrank, Franz v. Paula, Baiersche Flora. B. I. 2. Münch. 1789. 8.
- Schreber, J. C. D., de Phasco Observv. Lips. 1770. 4.
- EjUSD. Spicileg. Florae lipsicae. Lips. 1771. 8.
- Schultes Reise auf den Glockner. Th. I. 2.
- Schultz., Car. Frid., Prodr. florae stargard. etc. Berol. 1806. 8.
- Schumacher, Christ. Frid., Enumeratio plantt. in Saelland. septentr. et orient. T. I. 2. Hafn. 1801. 1803. 8.
- Scopoli, Jo. A., Flora carniol. T. I. 2. Ed. 2. Vindob. 1772. 8.
- Seguier, Jo. Franc., Plantae Veronenses. Vol. 1-3. Veronae 1745 - 1754. 8.
- Smith., Jac. Ed., Flora britannica. Vol. I - III. Lond. 1800 - 1804. 8.
- EjUSD. et Sowerby English Botany. Lond. 1799 sqq. 8.
- Sprengel, K., Einleit. in das Stud. der kryptogam. Gewächse. Halle 1804. 8.

Index auctorum. XXIX

- Sprengel, K., Tentam. Florae halens. Halae Sax.
1806. 8.
- Sturm., Jac., Deutschlands Flora in Abbildung. n.
d. Natur m. Beschreibb. Abtheil. II. Cryptog.
H. 1-6. Nürnberg. 1793-1803. 12.
- Swartz., Ol., Method. muscor. illustrata. (Dissert.)
Upsal. 1781. 4.
- EjUSD. nova genn. et species plantar. s. Prodro-
mus etc. Holm., Upsal. et Aboae 1788. 8.
- EjUSD. Flora Indiae occident. P. I-III. Erlangae
1797-1806. 8.
- EjUSD. Dispos. systemat. muscor. frondosor. Sue-
ciae. Erlangae 1798. 12.
- EjUSD. Synops. Filicum. Kiliae 1806. 8.
- Thunberg, C. P., Prodr. plantt. capenss. etc. P.
1. 2. Upsal. 1794-1800. 8.
- EjUSD., Mus. naturall. academ. upsal. P. XXII.
(*Cryptogama* continens). Resp. Ge. Wahlen-
berg. Upsal. 1797. 4.
- Timm, Joach. Christ., Florae megapol. (suerin.)
prodrom. Lips. 1788. 8.
- Transactions of the Linnean Society, Vol. I-VII,
Lond. 1791-1804. 4.
- Turneri, Dawson, Spicileg. muscologiae hibernicae.
Yerm. et Lond. 1804. 8.
- EjUSD. et L. W. Dillwyn Botanist's Guide through
England and Wales. Vol. 1. 2. Lond. 1805. 8.
- Usteri, Paul, Annalen der Botanik. St. 1-24.
Zürich 1792-1800. 8.
- Vaillant, Sebast., Botanicon parisiense. Am-
sterd. et Leyde 1727. fol.
- Villars Histoire des plantes de Dauphiné, T. 1-3.
Grenoble 1786, 1787. 8.

xxx Index auctorum.


- Vogler, Jo. Andr., Dissert. de Polypod. montano.
Gissae 1731. 4.
- Wahlenberg, Ge., Flora lapponica. Ined.
- Weber, Fr., botan. Briefe an K. Sprengel. Kiel
1804. 8.
- EjUSD. et D. M. H. Mohr Archiv für die systema-
tische Naturgeschichte. B. 1. St. 1. Leipz.
1804. 8.
- Eorund. Naturhistor. Reise durch einen Theil
Schwedens. Gött. 1804. 8.
- Eorund. Beiträge zur Naturkunde. B. 1. Kiel 1805. 8.
- Weber, Ge. Henr., Spicileg. Florae goetting. etc.
Gothae 1778. 8.
- Weiss., Frid. Guil., plantae cryptogamicae Florae
goetting. Goett. 1770. 8.
- Wibel, A. W. E. C., Primitiae Florae werthhemmen-
sis. Jenae 1799. 8.
- Wiggers, Fr. Henr., (Ge. H. Weber) Primitiae
florae hol-at. Kil. 1780. 8.
- Willdenow, Car. Lud., Florae berolin. prodrom.
Berol. 1787. 8.
- Withering, Will., botan. Arrangement of the ve-
getables naturally growing in great Britain.
Vol. 1-4. Birmingh. 1796. 8.
- Zoega Flora island. in Olafsens Reise durch Island.
T. 2. Copenh. 1776. 4.
-

Explicationes figurarum.

Ratio augmentorum.

Lens simplex o diam. auget	2plo.
— — co — —	6 - ad 8ies.
— microsc. comp. I. —	10ies.
— — — II. —	50 - ad 60ies.
— — — III. —	80 - ad 100ies.

Ultima lens circiter convenit cum Hedwigii Va.



J. R. Lichner del.

Besemann sc.

Explicationes figurarum.

Tab. I.

Characteres ordinum.

- F**ig. 1. Sporang. Polyp. *hyperb.* c. sporis aliquot; ad augm. Ill. Pro charact. ord. *Gyratarum*.
- Fig. 2. Partic. racemi *Osmundae regal.*; nat. magn. Pro charact. gen. *Osmundae*.
- Fig. 3. Sporang. ejusd. Filicis, ad augm. I. Pro charact. ord. *Rimatarum*.
- Fig. 4. Sporang. Lycop. *Selaginis*; ad augm. I. Pro charact. ord. *Valvatarum*.
- Fig. 5. Thalamus *Equis. sylvat.*, perigonis jam evacuatis, ab infer. pag. visus; ad augm. I. Pro charact. ord. *Peltatarum*.
- Fig. 6. Spora c. staminibus (*Hedw.*) ejusd. *Equis.*; et
- Fig. 7. Singulum filorum duorum illorum, basi sporae affixorum, Hedwigio organorum masculinorum.

Hae duae figg., cum 5. charact. gen. *Equis.* illustrantes, ex *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 1. f. 4

xxxiv Explicationes figurarum.

et t. 2. f. 6. mutuatae. Ad augm. suum VI.
Hédw. delineavit.

Fig. 8. Partic. *Pilulariae* c. singula fructificat.;
nat. magn.. Pro charact. ord. *Radicalium*.

Fig. 9. Sporang. junius Jung. *bicuspid.*, perispo-
rangio stylig. adhuc inclusum (adstantibus 2 ge-
nitall. femm. non foecundatis); et

Fig. 10. aliud ejusd. plantae sporang. magis adult.,
etiam perisporangio adhuc obvelatum, stylo
jam deperdito. Genitalia plura femm. et pars
calic. ad basin conspicienda. Ad augm. III. Pro
charact. ord. *Calyptratarum*.



J. R. Linderitz Del.

Besemann Sculp.

Tab. II.

Vetus genus Polypodium;

- Fig. 1. Polyp. *hyperb.* frons; nat. magn.
Fig. 2. Ejusd. pinna dorso visa c. punctis sporangior.; ad augm. oo. Pro charact. gen. *Polypodii*.
Fig. 3. Indus. Aspid. *Lonchit.* umbilicatum, *Rothio* sistens gen. *Polystichum*; ad augm. oo.
Fig. 4. Pinnula Aspid. *cristati* c. indusiis reniformm. *Polystichorum* Roth.; ad augm. o.
Fig. 5. Pinnula Aspid. *font.* c. indusiis linea brevi venae affixis, pro idea *Athyriorum* Roth.; ad augm. l.
Fig. 6. Indus. Asp. *frag.*, pro idea *Cyathea* Roth. (non genuinae); ad augm. II.
Fig. 7. Indus. Asp. *Fil. fem.*, transitum demonstrans ab *Athyr.* Roth. ad *Polyst.* ejusd. (cf. ff. 5. et 4.); ad augm. l.
Figg. 3-7. charact. gen. *Aspidii* illustrant.
-

xxxvi Explicationes figurarum.

Tab. III.

Genera reliqua Gyratarum l. nuda
l. indus. superficialiario instructa.

Fig. 1. Lacinia Grammit. *Ceterach*, dorso visa
cum squamis suis; et

Fig. 2. ead. squamis solis superne, inferne etiam
sporangiiis amotis; utraque ad augm. oo. Pro
character. gen. *Grammit*.





Fig. 3. Pinna Asplen. *Trichom.*, dorso visa; ad
augm. oo. Pro character. gen. *Asplenii*.

Fig. 4. Partic. frond. Scolopendrii officin. a dorso;
ad augm. o. Pro character. gen.

Fig. 5. Pinna Blechni *boreal*. a dorso; ad augm.
o. Pro character. gen.


Fig. 6. Indus. bivalve Hymenoph. *tunbridg.*; ad
augm. oo.; et

Fig. 7. Valvula posterior c. columnula et adhae-
rente adhuc sporang. uno; ad id. augm. Pro
character. gen. *Hymenophylli*.



J. R. Luderitz del.

Besemann Sculp.



J. R. Linder. del.

B. Sc.

Tab. IV.

Genera Gyratarum indus. margin.
instructa — genera Valvatarum.

Fig. 1. Duae pinnae fructiff. Pterid. *crispae* a dorso; ad augm. oo. Pro charact. gen. *Pterid*.

Fig. 2. Pars pinnulae Adianti *Cap.* a dorso; ad augm. oo. Indus. sinistrum arte reclinatum est, ut char. gen. melius pateat.

Fig. 3. Pars media pinnae Onocleae *Struth.* fructif. a dorso cum laciniis adhuc revolutis indusia constituentibus; ad augm. oo.; et

Fig. 4. singula lacinia jamjam evoluta, sporangg. puncta demonstrans; ad augm. l. (Sporangiorum tantum pedicelli l. gyri aliquot residui in punctis.)

Fig. 5. Portio racemi Botrych. *Lunar.*; ad augm. oo. Pro charact. gen.

Fig. 6. Spica integra junior Ophiogl. *vulg.*, part. indus. univers. arte soluta, ut singul. sporang. denudatum conspiciatur; ad augm. oo.; et

Fig. 7. portio spicae maturae, in qua sporangia una cum indus. rumpendi initium faciunt; ad id. augm. Pro char. gen. *Ophioglossi*.

xxxviii Explicationes figurarum.

Tab. V.

R a d i c a l e s.

Fig. 1. Nucula fructificat. *Pilulariae*, medio horizontaliter secta, quo duplex perigon comm. et perigg. 4 propria cum sporis (plurib. medio dissectis) et spermatocystidiis (his saepe ita arcte contiguus, ut singula non distinguenda) observantur; ad augm. I. (Asterisci explicatio in theoret. oper. parte dabitur.);

Fig. 2. Spora ejusd. pl. arillata integra; ad augm. II.;

Fig. 3. Alia spora arillo decorticata, opere vero celluloso lymphæ repleto adhuc obvoluta; ad augm. III.;

Fig. 4. Sporae arillo et opere celluloso denudatae, corculo obpyrif. instructae, (mentientis sporang. operculatum) super. pars (inversa), c. granulosa materie illam constituyente; ad augment. II.

Sporam germinantem vidit *Jussieu*; nec itaque sporang. !

Fig. 5. Nucula fructificat. *Marsileae*, med. horizontaliter secta; ad augm. I.;


Fig. 6. Ead. perpendiculariter secta sec. latitud.; ad augm. oo.; et

Fig. 7. Spora arillata singula; ad augm. II.

Fig. 8. Perigon. duplex femin. *Salviniae* med. perpendiculariter sect.; ad augm. I.; et


Fig. 9. Spora arillata seorsim; ad augm. II.


T.V



T. R. Linder. del.

B. Sc.





J. R. Lüder. del.

B. Sc.

Tab. VI.

Genera Calyptratarum operculatarum l. stomate l. peristomio nullo.

Fig. 1. Sporang. Phasci *curvic.*; ad augm. II. Pro char. gen. *Phasci*.

Fig. 2. Recept. pedicellat. Sphagni *cusp.*, in quo sporang. (operc. decutiens) vaginula adhuc basi cinctum et adstantibus feminis 2 non foecundatis; ad augm. oo.; et

Fig. 3. femina una infoecundata, granulis stigmati suprainpositis; ad augm. III. Pro char. gen. *Sphagni*.

Sporang. in unico musco frond. vere sessile (seta nulla). In unico genere *verus* pedunculus!

Fig. 4. Gymn. *acaule* totum quantum; ad augm. I.

Fig. 5. Ejus recept. c. femm. 2. non foecundd. setaque et sporang. deoperc.; ad augm. II. (Pro char. gen. *Gymnost.*);

Fig. 6.	Fol. ex extimis	} ejusd. musci; ad augm. II.
Fig. 7.	- - - mediis	
Fig. 8.	- - - intimis	

Fig. 9. Super. pars sporang. Schistost. *osmund.* operc. adhuc clauso (ex *Hedw.* striis e centro radiatis - laciniar. jam rudimentis — notato) instructi; ad augm. III. Pro char. gen.

Tab. VII.

Tetraphis, Splachnum, Encalyptra,
Trichostomum, Dicranum.

Fig. 1. Peristom. Tetraph. *pelluc.*; ad augm. oo.
Pro char. gen.

Fig. 2. Perist. $\frac{1}{2}$ Splachni *tenuis*; ad augm. oo.; et

Fig. 3. Calyptra ejusd. musci; ad id. augm. Pro
char. gen. *Splachni*.

Fig. 4. Sporang. Encal. *vulg.* calyptra adhuc
tectum; ad augm. oo. Operculi rostrum tenuis
fili instar per calyptram videndum. Pro char.
gen. *Encal.*, quantum ex calyptra pendet. Cf.
Tab. seq. f. 1.

Fig. 5. Dentes 3 perist. Trichost. *heter.*; ad augm.
l. (Cf. p. 114.);

Fig. 6. Dentes 3 perist. Trichost. *fontinal.*; ad id.
augm.;

Fig. 7. Calyptra ejusd. musci, et

Fig. 8. Trichost. *lanuginosi*, et

Fig. 9. Trichost. *patent.* (*Dicr. Sm.*); omnes ad
augm. oo. — Hae 5 - 9. et Tab. IX. f. 1. pro
char. gen. *Trichost.*


Fig. 10. Dens perist. Dicrani *scop.*; ad augm. l.;

Fig. 11. Calyptra ejusd. musci ad augm. oo.;

Fig. 12. Perist. Dicr. *tort.*, basi annulo adhuc in-
cumbente, et


Fig. 13. idem evolutum, annulo remoto; utrumq.
ag augm. l.;


Fig. 14. Pars perist. Dicr. *latif.*; ad id. augm. —
Hae 10 - 14. pro char. gen. *Dicrani*.



J. R. Linder. del.

B. Sc.





J.R. Luder. del.

B. Sc.

Tab. VIII.

Grimmia, Didymodon, Barbula, Syntrichia, Catharinea, Polytrichum.

Fig. 1. Perist. Grimm. *recurv.*; ad augm. I. Pro char. generum *Grimm.* et *Encal.*, quantum ex perist. pendet.

Fig. 2. Perist. Didymod. *capill.*; ad augm. I. Pro char. gen., quantum pendet ex perist.

Fig. 3. Perist. Barb. *unguicul.*; ad augm. III. Pro char. gen.

Fig. 4. Perist. Syntrich. *subul.* cultello decurtatum; ad augm. III. (cf. pp. 15. 16.); et

Fig. 5. Ejusd. perist. superior pars absq. inferiore; ad id. augm. Pro char. gen. *Syntrich.*

Fig. 6. Perist. c. epiphragm. Cathar. *hertyn.*; ad augm. I. Pro char. gener. *Cathar.* et *Polytr.*, quantum ex perist. pendent.

Fig. 7. Calyptra praeced. musci; ad augm. oo. Pro char. gen. *Cathar.* secundario ex calyptra.

Fig. 8. Calyptra Polytr. *yuccaef.*; ad augm. oo. Pro char. secundario gen. *Polytr.* ex calyptra.

XLII Explicationes figurarum.

Tab. IX.

Orthotrichum, Neckera, Meesia, Diplocomium, Funaria, Bartramia.

Fig. 1. Calyptra Trichost. *sciur.* junior; ad augm. oo. — Cum Tab. VII. ff. 5-9. pro char. gen. *Trichost.*

Fig. 2. Calyptra Orthotr. *diaph.*, ad augm. oo., et c. lacinia ad lat., ex augm. l. Pro char. gen. ex calyptra.

Fig. 3. Peristomia ejusd. musci; ad augm. l. Pro char. *Orthotr.* et *Neckerae* ex perist.

Fig. 3. a. Calyptra Neckerae *uloph.*; ad augm. oo. (cf. pp. 20. 237. 238.)

Fig. 4. Peristomior. Mees. *uligin.* $\frac{1}{4}$; ad augm. III. Pro char. gen. *Meesiae*.


Fig. 5. Peristomior. *Diplocomii* pars; ad augm. III. Pro char. gen.


Fig. 6. Peristomia integra Funar. *hygrom.*, dentibus 2 arte reclinatis, ut inter. perist. laciniae observentur; ad augm. II. Pro char. gen. *Funar.* cum duab. inseqq.

Fig. 7. Singulus dens Funar. *hygr.*; ad augm. II.

Fig. 8. Perist. inter. ejusd. musci $\frac{1}{3}$; ad augm. II. (cf. p. 379.)

Fig. 9. Pars peristomior. Bartram. *Oeder.*; ad augm. III. Pro char. gen.








1




2




6




7



5



4



3

Lindet. del.

B. Sc.

Tab. X.

Leskia, Climacium, Timmia, Hypnum, Fontinalis.

Fig. 1. Dens singulus perist. exter. et pars perist. inter. Lesk. *elong.*; ad augm. III. Pro char. gen. *Leskiae*.

Fig. 2. Pars perist. inter. Climacii *dendr.*; ad augm. III. Pro char. gen.

Fig. 3. Perist. inter. Timm. *austr.* $\frac{1}{4}$; ad augm. III. Pro char. gen. c. duab. inseqq.

Fig. 4. Dens perist. Timm. *austr.*; ad augm. III.

Fig. 5. Perist. inter. Timm. *megap.* $\frac{1}{16}$; ad augm. III.

Fig. 6. Pars perist. inter. Hypni *intermedii*; ad augm. III. Pro char. gen. *Hypni*.

Fig. 7. Peristomia Fontin. *antipyr.*; ad augm. I. Pro char. gen.

Tab. XI.

Diphyscium, Buxbaumia, Andreaea.

Fig. 1. Perist. *Diphyscii*; ad augm. I. Pro char.
gen.

Fig. 2. Peristomia Buxbaum. *aphyllae*; ad augm.
I. Pro char. gen.

Fig. 3. Ramus Andreaeae *alp.*; naturali magn. dia-
metro triplo major.

Fig. 4. Fol. ejusd. speciei; ad augm. III.


Fig. 5. Surculus Andreaeae *rup.*, auct. uti fig. 3.

Fig. 6. Fol. Andr. *rup.*; ad augm. III.

Fig. 7. Surculus Andreaeae *Rothii*, auct. uti ff.
3. et 5.


Fig. 8. Fol. Andr. *Rothii*; ad augm. III.

Fig. 9. Sporang. *Andreaeae*; ad augm. I. Pro
char. gen.



Lüder. del.

B. Sc.



Lüderitz del.

Besemann sculps.

Tab. XII.

Genera Calyptratarum de opercularum.

- Fig. 1. Recept. femin. March. *polym.* infra vis. c. folliculis 10, loculorum vices gerentibus, alternantibus c. radiis; ad augm. oo. Pro char. gen. c. duab. inseqq.
- Fig. 2. Folliculus singul. e priori fig., calices proprios 5, posteriores 4 adhuc clausos, anteriorem quatuor laciniis apertum fovens; ad augm. I.
- Fig. 3. Calix propr. singul. sec. longitud. dissectus, ut supra perisporang. stylic. circa setam residuum conspiciatur. Sporang. ipsum jamjam evacuatum. Ad augm. II.
- Fig. 4. Frons junior Targion. *hypoph.* infra visa parum soluta atque reclinata calicis sinistra valva, ut genitale femin. grossificatum in fundo observetur; ad augm. oo.
- Fig. 5. Genitale femin. grossificatum, adstantibus ad basin aliquot feminis non foecundd. e priori fig. exemptum, ut stylus perisporangii melius conspiciatur; ad augm. I.
- Fig. 6. Portio membranae inter. adnatae valvar. calicis cum (3) glandiformm. corporr., olim a *Spreng. Targioniae* maribus habitis. Sporangii

XLVI Explicationes figurarum.

ipsius aperiendi modus in planta nondum observatus; nec nobis contigit eum videre. Figg. enim has et hujus Tab. plures ex specimin. emollitis construere coacti fuimus; quo forte minus nitidae, vix tamen non verae evasere.

Fig. 7. Sporang. apertum Jung. *bicusp.*; ad augm. l. Pro char. gen.

Fig. 8. Partic. frond. Anthoc. *laev.* c. sporang. jamjam aperto; ad augm. oo. Pro char. gen.

Fig. 9. Portio Blas. *pus.* c. sporang. uno majori jamjam evacuato, altero sporas propellente; ad augm. oo. Pro char. gen.

Fig. 10. Portio Ricc. *glaucae* c. sporangiis 4, stylis suis emergentt. instructis; ad augm. oo.

Fig. 11. Sectio perpendicul. per duo sporangia anteced. fig. ita instituta, ut styli integri remanerent; ad augm. l.

PLANTAE CRYPTOGRAMAE.

(Genitalia feminea singula, seorsim spectata in statu impraegnationis adeo abscondita atque tenera, ut oculos nudos effugiant. *Hedw.*)

Ordo I. Gyratae.

Sporangia (unilocularia) annulo elastico s. gyro (symplokio s. connecticulo *Hedw.*) cincta, irregulariter transversim rumpentia. Tab. I. f. 1.

A. Nudae.

1. **G**rammitis. Sporangia in frondis dorso in lineolis rectis disposita. Tab. III. ff. 1, 2.
2. **P**olypodium. Sporangia in frondis dorso in punctis disposita.

B. Indusiatae (indusiis Willd. [involucris Smith., perisporangiis Hedw.] tectae.)

a. indusio superficiario.

3. *Aspidium*. Sporangia in frondis dorso in punctis disposita. Indusium reniforme, l. peltatum, l. squamiforme. T. II. ff. 3-7.

Sporangiorum maturitate indusium fere semper ad punctum marginale l. centrale usque liberum evadit.

4. *Asplenium*. Sporangia in frondis dorso in lineis disposita. Indusium squamiforme, intus rumpens. T. III. f. 3.

5. *Scolopendrium*. Sporangia in frondis dorso in lineis ad venulas disposita. Indusia superficiaria binas tegentia lineas, mox superum extus, inferum intus, mox hoc extus, illud intus rumpens. T. III. f. 4.

Sporangia in ramis venulae dichotomae intus propullulant, utrumque acervum eyanescente

venula interstinguente. Ex unoquoque venulae ramo indusium oritur, ambos tegens acervos.

6. *Blechnum*. Sporangia in frondis dorso in linea continua, utrinque costae parallela disposita. Indusium intus rumpens. T. III. f. 5.

7. *Hymenophyllum*. Sporangia in frondis margine in punctis subsertis disposita, columnulae (sporangiophoro Bernh.) affixa. Indusium duplex s. bivalve. T. III. ff. 6. 7.

Columnula in hoc genere vix exserta.

b. indusio marginali (e frondis margine inflexo formato) (, intus dehiscente.)

8. *Pteris*. Sporangia in frondis dorso in linea continua ad marginem disposita. T. IV. f. 1.

9. *Adiantum*. Sporangia indusio squamaeformi intus adnata. T. IV. f. 2.

Stipes fuscus characterem praebet naturalem.

Quaedam *Pterides* (exoticae), eodem gaudentes, affines demonstrantur.

10. *Onoclea*. Sporangia in (pinna-
rum, l. pinnularum, l.) laciniarum
revolutarum, et indusia consti-
tutum, dorso ad venas in punctis dis-
posita, tandem totam paginam ob-
tegentia. T. IV. ff. 3. 4.

Cel. *Bernhardi* genere distinguendam nuperrime
jussit *Onocl. sensibilem*, quippe in qua ipse
detexisset intra indusia, e pinnulis retro glo-
bosim contractis formata, alia propria, pro
unoquoque sporangiorum puncto inservien-
tia, quae quidem et nitidissime, pro more,
delineata reddidit in *Diar. bot. Schrad. 1801.*
l. t. 1. ff. 9 et 10. Sed nostra quoque ex
analisi nil aliud putare valemus haec indu-
sia superficialia, propria, nisi „membranas
tenuissimas, nervos sequentes, quarum ope
pinnae fructiferae in globulum contractae
intus in loculos quasi dividuntur.” Cf. *Swartz*
in *Diar. bot. Schrad. l. cit. p. 289.*

Ordo II. Rimatae.

Sporangia (unilocularia), longitudina-
liter striata, uno latere rima verti-
cali hiantia. T. I. f. 3.

In *Dispos. Filic.*, l. saepius c., Cel. *Swartz* primus ab *exannulatis* hucusque nominatis Filicibus quaedam separavit genera, uti naturali quodam caractere, scil. vernatione non circinali, a reliquis vehementer abhorrentia, sub *affinium* nomine ea complectens. Quae quidem genera artificiali caractere, sporangiorum puta natura atque constructione, aequae distantia demonstrata reperis in *Mohr Obs.* Hic insimul genera *exannulata* „capsulis multilocularibus” gaudentia *Swartzii*, sec. sporangii, quasi duplicis l. melius multilocularis, rationem, proprii ordinis plantae vindicatae sunt, eoque modo ex Filicibus, a *Swartzio* egregie pertractatis, quatuor ut stabiliantur ordines artificiales necesse perhibitum est. Sint itaque posthac Filices auctt. annulatae *Gyratae*, exannulatae „capsulis unilocularibus” instructae, exclusis generibus *Swartzii* affinibus, *Rimatae*, haec ipsa affinia genera potius *Valvatae*, exotica tandem genera exannulata „capsulis multilocularibus” *Compositae* l. *Multiloculares*, ut, qui possint, demum artificiali firmaque methodo cryptogamarum stirpium constituantur ordines, vel, si mavis, classes. Cf. quoque *Weber Br.* p. 13 seqq.

11. *Osmunda*. Sporangia in racemo
(, l. dorso frondis,) disposita, pedi-
cellata, nuda. T. I. ff. 2. 3.

Ordo III. Valvatae.

- Sporangia bi- (, l. pluri-,) valvia,
uni- (, l. pluri-,) locularia. T. I.
f. 4.

A. Nudae.

12. *Botrychium*. Sporangia in ra-
cemo disposita, adnata. T. IV. f. 5.
13. *Lycopodium*. Sporangia (sub-
reniformia,) in axillis foliorum, l.
squamarum spicarum solitaria, sub-
sessilia. T. I. f. 4.

Vix apte, prout videtur, pro *Lycopodiorum* spi-
catorum indusiis aliqui sumserunt ipsarum
spicarum squamas, et ita praeter necessita-
tem, et parum natura suadente, genus in
duo divulserunt.

B. Indusiatae.

14. *Ophioglossum*. Sporangia in
spica disposita, disticha. Indusium

universale, supra singula sporangia transversim rumpens. T. IV. ff. 6. 7.

Ordo IV. Peltatae.

Perigonia thalamo peltato inferne affixa. T. I. f. 5.

15. Equisetum. (Sporae?) (staminibus?) 4, geminis coadunatis, basi cinctae. Perigonia interiori latere rima longitudinali hiantia. T. I. ff. 5-7.

„Inflorescentia: clava ovato-oblonga.” Schreb.

Ordo V. Radicales.

Fructus in nuculis, l. sacculis, pone radicem plantae dispositis. T. I. f. 8.

Bene quidem perspicimus, caractere subjuncto *Radicalium* ordinem artificialem in systemate minime probatum esse; sed nos haec vegetabilia, in sua classe, quoad partes fructificantes, prae ceteris eximie cognita, prorsus juste disponendi rationem nullam hucusque inveniisse sincere lubenterque fate-mur. Si ex altera hujus operis particula theoretica puta, sexuales harum stirpium

partes aequae Tibi familiares, ac eas fructus, reddideris, quaeso, sagacior lector, filum ariadneum hoc in labyrintho nobis praebere velis. Nuperrime VV. CC. *Sprengel* et *Smith*, ille *Salviniam*, hic *Isœten* et *Pilulariam* Monoeciae Linnéi classi subungere non prorsus abs re esse putarunt.

A. Hermaphroditae.

16. *Pilularia*. Perigonium commune duplex; propria 4, spermatocystidiis superne, germinibus inferne receptaculo affixis. T. V. ff. 1-4.
17. *Marsilea*. Perigonium (externum, l. commune?) (duplex?); (internum 14-15 locale, l. totidem propria, duplici serie disposita?); germinibus spermatocystidiisque circumpositis parieti exteriori perigonii interni affixis. T. V. ff. 5-7.

B. Monoicae.

18. *Salvinia*. Perigonium duplex; uniloculare, l. germinibus, l. sper-

matocystidiis receptaculo columnari
affixis. T. V. ff. 8. 9.

Ordo VI. Calyptratae.

Sporangium junius perisporangio sty-
ligero (calyptra Hedw.) instructum.
T. I. ff. 9. 10.

A. Operculatae.

a. Astomae (operculo sporangii ori
adnato).

19. Phascum. T. VI. f. 1.

b. stomate instructae.

α. operculo libero.

l. peristomio nullo.

20. Sphagnum. Receptaculum fe-
mineum pedicellatum. Tab. VI. ff.
2. 3.

In distinguendis *Sphagno* generibusque proxi-
mis, inflorescentiam quidem, a *Linneo* ad
dispersenda genera nullius momenti decla-
ratam, attamen ab ipso saepe saepius in
auxilium vocatam, a nobis quoque, licet

aegre, adhibitam esse non possumus, quin fateamur. Conjuxit quidem amiciss. *Rebentisch* in Flora sua, quod scimus primus et unicus, *Gymnostoma* et *Sphagna*. Nos vero, quo minus eum sequeremur, natura ipsa, in tanta stirpium dissimilitudine, qua vix uspiam ulla major, et muscologorum summorum exemplum impediit.

21. *Gymnostomum*. Receptaculum femineum sessile. Operculum deciduum integrum. T. VI. ff. 4. 5.

22. *Schistostega*. Receptaculum femineum sessile. Operculum ab apice fissum in lacinias revolvendoaufuges. T. VI. f. 9.

II. peristomio effigurato.

I. simplici.

23. *Tetraphis*. Dentes 4, integri, liberi, aequidistantes. T. VII. f. 1.

24. *Splachnum*. Dentes 8, geminati (sicci reflexiles). Calyptra mitracformis, laevis. T. VII. f. 2. 3.

Hujus et *Orthotrichorum* quorundam dentes non tam per paria approximati, sed principio adglutinati observantur. Posthac, inprimis si dentes reflectantur, nexus inter gemi-

nos tollitur, et tum primum 16 distinctos reperis. Hac dentium cohaesione et in siccato statu reflexilitate maximopere jam hi musci a *Didymodontibus* peristomio semicompleto gaudentibus, quorum e numero in nostra Flora est *inclinatum*, discrepant, quippe quibus dentes ab initio omnes inter se liberi sunt, et nunquam reflexi. Quare *Splachnorum* et horum *Orthotrichorum* dentes 8 geminati, *Didymodontium* per paria approximati dicuntur. Novus vero illos muscos ab his discernens e calyptra in auxilium vocandus character. Quamquam enim *Splachnorum* non nisi *mnioidis*, *ampullacei* et *angustati* Hedwigius quidem optimus viderit calyptras, nos solummodo *ampullacei*, *tenuis* (v. fig.), *serrati*, *angustati* et *urceolati* α et β , tamen ex sporangii atque operculi figura nullum fere dubium, quin omnibus hujus generis speciebus haec pars eadem gaudens sit forma. Omnino mitraeformis est in speciebus bene investigatis, et recta secedens a sporangio, etsi non semper basi in plures findatur lacinias. (Cf. quoque *Palisot de Beauv. Prodr. de l'Aethéog.*) Similis, non eadem, calyptra, uti omnibus notum, *Orthotrichis* est. *Didymodonta* vero dimidiata gaudet.

25. *Encalypta*. Dentes 16, integri, liberi, aequidistantes. Calyptra campanulata. T. VII. f. 4. et T. VIII. f. 1.
26. *Trichostomum*. Dentes divisi. Calyptra mitraeformis. T. VII. ff. 5-9. et T. IX. f. 1.
27. *Grimmia*. Dentes (8, 1.) 16, integri, liberi, aequidistantes. Calyptra dimidiata, l. mitraeformis. T. VIII. f. 1. et T. VII. ff. 7 et 11.
28. *Didymodon*. Dentes per paria approximati (semper erecti). Calyptra dimidiata. T. VIII. f. 2. et T. VII. f. 11.
29. *Dicranum*. Dentes divisi, l. basi liberi, l. omnes connexi, illorum cruribus strictis, l. subtortis, horum strictis. Calyptra dimidiata. T. VII. ff. 10-14.

Uti hunc in diem usque genera *Trichostomum* et *Dicranum* a muscologis Schreberianae methodo addictis, distincta atque definita sunt, nempe hoc *dentibus* gaudens *bifidis*, *cruribus inflexis*, illud *dentibus bipartitis*, *cruribus erectis*, *filiformibus*, vix ullum

esse facile credimus, qui abneget, partim *Trichostomi* genus stirpes habitu dissimillimas continere, et naturae parum esse conveniens, partim saepe saepius difficillimum dictu esse, num species huic vel illi generi sit adscribenda. Firmos enim, quos verba, quibus haec genera distinguimus, agnoscunt limites, natura ipsa non agnoscit. Quo jam factum est, ut acutissimorum muscologorum hic huic, ille altero stirpem hanc vel illam adnumeraverit generi. Et ipsi olim utrumque vix rite dispescendum credidimus. Respectu vero habitu horum muscorum calyptrarum, bene genera denuo separanda videntur. Gaudent enim *Fissidentium* Hedwigianorum nonnulli, atque *D. ovale* (Fiss. *pulvinato* arctissime junctum) plane eadem calyptra, qua omnia illa *Trichostoma*, quae olim *Bryum hypnoides* Linnéo constituerunt, quaeque hisce quam maxime affine *Trich. fontinaloides*. Dimidiatam contra reperis in omnibus minoris staturae *Trichostomis*. Quis est, qui non intelligat, haec ultima *Dicranis*, illa Schreberiana *Dicrana* majoribus *Trichostomis* habitu quam arctissime esse conjuncta? Et *Fissidentes* illi sexu quoque cum *Trichostomis* satis bene conveniunt. Quibus omnibus commoti, novo caractere genera

stabilienda existimavimus, ut magis artificialia aequae ac naturalia evadant. Non tamen ita sumus occaecati, ut in favorem mutationis, a nobis ipsis excogitatae, rem praetervideamus, facile alias cognoscendam. Formae enim calyptrarum, a nobis hic in auxilium vocatae, ita firmis ipsae non sunt circumscriptae atque segregatae limitibus. *Fiss. sciuroid.* H. et *Dicrani patentis* Smith., cujus calyptram, quamquam stirps non sit germanica, ad comparandum addidimus, calyptrae ad eas plurimorum *Dicranorum* propius accedunt (cfr. figg. nostrr.), et quaedam cognovimus nostra quoque ex methodo *Dicrana*, quorum basi, irregulariter tamen, finditur calyptra. Attamen putamus, formam calyptrae, quam vetustiores botanici *rectam secedentem* nuncupaverunt, satis esse insignem, si cum altera eam comparare velis, quae pluribus competit muscis. Haec oblique sporangio superinsidet, et est, quod dicunt, *subulata, lateraliter fissâ, lamina uno latere patente*. In genere autem hae calyptrarum formae ab ipso sporangio, sit vel aequale, vel cernuum, et ab operculo, sit vel breve et recte, vel longius et oblique rostratum, pendent; quo facile convinceris, totum fructus habitum atque rationem

— eas pedetentim sequi, naturaeque bene convenientia praebere genera. Quod vero intermedia inveniantur in hac quoque parte formae, methodo ei superstructae vitio verti minime potest. In omnibus enim, bene naturam si perspexeris, tales obviae sunt formae partibus. Hiatus certe nullibi, sed enim videre putamus, si pauca tantum cognoverimus hujus vel illius familiae membra. Nonne ita arcte congruant ipsa muscorum peristomia, ut jam hodie vix firmos invenire valeamus limites? Et quid tum, si plures dissitissimarum terrarum inquirendi muscos occasio nobis data fuerit?

30. *Barbula*. Dentes bipartiti, basi connexi, cruribus tortis. (*Calyptra dimidiata*.) T. VIII. f. 3.

Verosimile sibi esse, non plane certum, semper *Hedwigius* summus affirmavit, *Tortularum* et *Barbularum* suarum peristomia ab interna solummodo oriri sibi dicta sporangii membrana (sporangidio *Ehrh.*), et ita cilia eorum sua e norma dixit singulas partes. Quo plurimi muscologorum, verbis optimi magistri nimium forte addicti, hunc in diem usque peristomio simplici gaudentes muscos in tales distinxerunt, quorum externum, et

in tales (nempe laudata duo Hedwigii genera), quorum internum esset orificii munimentum. Cum vero sacculi duo, sporas muscorum continentes, s. duae Hedwigianae sporangii membranae, s. Ehrharti sporangium et sporangidium, superne, „versus operculi confinia” (ut Hedwigianis utamur terminis) arctius collimentur et quasi coalescant: accuratius rem investigantes et nexum tuborum peristomii in *Dicranis*, *Barbularis* et *Syntrichiis* (cfr. figg. nostrae Tab. VII. 12-14. VIII. 3. 4.) cum externo sporangii margine quasi per membranam depressam plane perspicientes, distinctionem illam omittere, et, quod ante nos jam *Rothius*, *Smithius*, *Turnerus* melius duxerunt, vestigia legere maluimus optimi *Schreberi*, dentatum quoque suae *Tortulae* peristomium dicentis. Quod ad ciliorum olim nuncupatorum hujus generis numerum adtinet, bene jam pluribus vicibus *Hedwigijs* admonuit, „cilia esse 16, biseta.” Attamen difficilior rem esse cognoscendam non dissimilavit, et, quod scimus, nullibi accuratiori eam figura illustravit. Convexioribus autem vitris prorsus eadem peristomiorum omnium *Barbularum* et *Dicranorum* nostrorum olim *Trichostomis* adnumerantium, ratio, singulum si excipias mo-

mentum, mox demonstratur. Dentes nimirum bicrani Dicranorum illorum (puta *tortilis*, *pallidi*), a quo eriguntur, inter se plane liberi sunt (vid. fig. nostra Tab. VII. 13.), Barbularum illi in brevissimum connectuntur cylindrum, s. tubum (Tab. nostra VIII. f. 3.). Tortos ambos (licet eos *Dicranorum* minus) reperis. Cum vero contra inter antiqua *Dicrana* quaedam occurrunt species, dentibus inferne non minus connatis, ac ii *Barbularum* sunt (v. Tab. nostra VIII. f. 14.), ambo genera porro non esse secernenda, facile credes. Horum *Dicranorum* autem basi connati dentes cruribus gaudent strictis, nec tortis; et ita, ne a natura bene segregati musci in systemate confundantur, hoc forte statuendum: quibus speciebus peristomium est dentibus, a quo eriguntur, inter se connexis, insimulque cruribus tortis, hae *Barbulis* adnumerandae, quibus dentes sunt basi liberi l. connati cruribusque strictis, hae *Dicrana*, aequo vero modo etiam illae, quibus crura quidem dentium plus minusve torta, ipsi vero dentes, a quo eriguntur, inter se liberi. Arduum est, limites praescribere corporum naturalium gregibus, cum horum nullos natura, bene intellecta, agnoscit.

31. *Syntrichia*. Dentes supra medium (membrana) connexi, torti, apice divisi. T. VIII. ff. 4. 5.

Genus, quod nunc vidimus, bene distinctum a *Barbula* videtur. Sed nulla iusta characteris hucusque data est figura, quamquam *S. subulatae* ipse Hedwigius, *S. ruralis* Sturmii et Sprengelii (Einl. t. VI. f. 54.) et ejus var., olim putatae novae speciei, *norvagicae*, nostrum alter (in Arch. I. t. 5. f. 1. c.) dederunt peristomii icones. *Barb. agraria* Hedw., quam hujus generis esse *Bridelii* declaravit, genuina nobis *Barbula* visa. *B. muralis* dentes quidem habet paulo altius connexos; attamen nec ea, nec alia species hucusque transitum a *Barbulis* nostris ad *Syntrichias*, pro quibus vero laudatas binas species solummodo agnoscimus, nobis patefecit.

32. *Catharinaea*. Dentes epiphragma prehendentes. Calyptra paraphysiphora (sursum pilosa), l. nuda *). T. VIII. ff. 6. 7.

*) In nova, ab amiciss. *Wahlenberg* detecta Lapponica specie, secund. ipsissimum auctorem paraphysibus plane destituta calyptra.

33. *Polytrichum*. Dentes epiphra-
gma prehendentes. Calyptra para-
physibus abruptis et ei adglutinatis
vestita (deorsum pilosa). T. VIII.
ff. 6. 8.

Paraphyses quidem in hujus generis speciebus,
uti in plurimis muscis, e floris feminei re-
ceptaculo oriuntur, nec ex ipso perisporangio
styligero (calyptra et vaginula Hedw.), quod
in *Orthotrichis* plurimis, Ehrhartianis *Catha-
rineis* et quibusdam Hedwigii *Pterigynan-
dris* solummodo hucusque observatum est.
Cum vero in *Polytrichis* nostris ita densa
vigent grege circum genitale femineum, et
glutine quodam illis proprio apice ei sese
adglutinant, quo, avulsae a sede sua natu-
rali, sub forma velaminis residuae adhuc re-
periuntur in eecta cum sporangio calyptra:
peculiari hac nota bene distinctum hocce ge-
nus reddunt.

Orthotricha anomalum — *cupulatum*.

2. duplici.

* dentibus rectis.

34. *Orthotrichum*. Calyptra mi-
traeformis, carinata. T. IX. ff. 2. 3.

Insigni hocce genus exemplo, ut calyptrae muscorum ad stabilienda genera in auxilium saepe vocandae, primaria nota a peristomiis desumta non sufficiente. Variabilissimum enim certe interius peristomium in *Orthotrichis*, nec nisi e calyptra naturalissimum genus non turbatum servandum. In *Orthotr.* quidem *crispo* hucdum dicto et quibusdam exoticis muscis, chaotico *Neckerae* generi hucusque adscriptis, et procul dubio etiam a Cel. *Belvisio* cum *Orthotrichis* nostris confusis, similis exstat calyptra, eximie autem diversa, *sulcata* nempe, et sulcis inferne divisa, laciniis retro canaliculatis s. dorsatis cum in *Orthotrichis* omnibus genuinis *carinata*, e carinis inferne divisa, laciniis ab exterioriore facie canaliculatis. Cf. *Mohr* in *Annals of Bot.* Vol. II.

35. *Neckera*. Cilia distincta, libera, aequidistantia. Calyptra dimidiata, l. mitracformis sulcata. Tab. IX. f. 3 et 3 a. et Tab. VII. f. 11. (vel melius — remotis tamen paraphysibus — Tab. VIII. f. 7.)

Tab. IX. f. 3 a. anomalam Neck. *ulophyllae* calyptram, scil. mitracformem sulcatam representat.

36. *Leskia*. Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis aequalibus, integris. T. X. f. 1.
37. *Climacium*. Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis divisis, cruribus per trabes apiceque connexis. T. X. f. 2.
38. *Timmia*. Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis divisis, cruribus apice solummodo connexis. T. X. ff. 3-5.
39. *Bartramia*. Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis divisis, cruribus liberis. T. IX. f. 9.
40. *Hypnum*. Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis inaequalibus. T. X. f. 6.
41. *Diplocomium*. Cilia distincta, per paria approximata. T. IX. f. 5.
42. *Meesia*. Cilia distincta, opere reticuloso connexa. T. IX. f. 4.
43. *Fontinalis*. Peristomium interius conus reticulatus. Tab. X. f. 7.

44. *Diphyscium*. Peristomium interius conus membranaceus, plicatus. T. XI. f. 1.

** dentibus obliquis.

45. *Funaria*. T. IX. ff. 6-8.

3. triplici.

46. *Buxbaumia*. T. XI. f. 2.

β . operculo (dentium apicibus) adnato.

47. *Andreaea*. T. XI. f. 9.

B. Deoperculatae.

a. receptaculo fructus communi instructae.

48. *Marchantia*. T. XII. ff. 1-3.

Receptaculum fructus commune varie formatum, subintegrum radiatumve.

b. receptaculo fructus communi nullo.

49. *Targionia*. Calix 2-valvis. Sporangium apice dehiscens? (denti. 4, s. pluribus?) T. XII. ff. 4-6.

Fructus sub apice frondis, solitarius, deorsum spectans.

50. *Jungermannia*. Sporangium
4-valve. T. XII. f. 7.

Ex anomalia sporangium interdum 8-valve.

51. *Anthoceros*. Sporangium se-
mibivalve, columella instructum.
T. XII. f. 8.

52. *Blasia*. Sporangium frondi im-
mersum, tubo extrorsum coronatum
apice hiant. T. XII. f. 9.

Corollam, quae *perisporangium styligerum*,
quod *Muscis* in genere characterem adsigna-
vimus, huic quidem generi ill. *Schreberus* de-
negat; vidit autem hanc partem Cel. *Hedwi-*
gius, in *Theor. gen. et fruct.* ed. 2. p. 193.
habens: „de extremitate” — venulae —
„tantillum protuberat” — in juniore stirpe —
„exilissima particula cum calyptraeformi fu-
sco stylisco (v. T. XXX. f. 6.), ab omnibus
disquisitoribus praeterviso, cum admodum
fugax sit ista particula.” Itaque in *Speccc.*
muscc. p. 343. et ipse acutissimus vir suis
muscis Hepaticis Blasiam jam adnumerat,
hocce (quantum ex fructu pendet) caracte-
re: „*Perigonium* nullum (nisi cuticulam di-
cas). *Calyptra* brevis integra elevata cum
sporangio cordato-acuminato, univalvi, per

apicem maturitate pervium emittente *sporas* nudas."

53. *Riccia*. Sporangium frondi immersum, stylo emergente coronatum. T. XII. ff. 10. 11.

Uti *Blasiae*, sic etiam *Ricciae* generi *corollam* s. *perisporangium styligerum* Ill. de Schreber in edit. *Genn. plantt.* denegat, monens p. 750, haecce quidem genera, quamquam characteristico muscorum hepaticorum signo, scil. dicto organo careant, ob communem tamen habitum ad hunc ordinem referenda esse. Etiam summus *Hedwigius* post *Schmidium* in fructificationem *Ricciae* inquirens, *perisporangium* illud *styligerum* non invenit, adeoque in *Specc. muscc.* p. 343. a muscis suis exclusit atque inter *Algas* (proximo *Endocarpo* loco) remanere jussit. Est quidem genus affine *Endocarpo*, multo vero magis cum Hepaticis reliquis connexum. *Stylo* enim revera gaudet, quod vix dubitandum, ejusdem ac in omnibus muscis naturae (cf. *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 31. f. 6.) et quis tum in tanta partium exiguitate affirmet, ut non eodem utatur hicce stylus, quo semper, origine, scil. e *perisporangio*? Cujus decernendum datum erit scalpello suspensi simaeque manui, num in frondium substantia singulo l. duobus (quorum alterum *perisporangium* esset) tegmentis recondita sint semina in hacce stirpe? Naturali suo loco itaque *Ricciam* reliquimus, licet artificiali muscorum deoperculatorum character eam revera gaudere non approbatum sit, tamen (ex stylo) verosimile videatur.

PLANTAE CRYPTOGRAMAE.

O. I. Gyratae.

A. Nudae.

- I. *Grammitis Swartz.* Genn. et
specc. Fil. in Diar. bot. Schrad.
1800. 2. p. 17.

Sporangia in frondis dorso in lineolis rectis
disposita.

1. *Gr. Ceterach Sw.*, frondibus
pinnatifidis; laciniis alternis, confluen-
tibus, rotundatis, subtus squamosis.
Plum. t. B. f. 3. *Sturm.* 5. *Engl.*
Bot. t. 1244. *Bolt.* t. 12. *Bull.* t.
383. (in Tab. nostra III. ff. 1. 2. laci-
niae fructiff. ab infer. pag. visae.)

Asplen. L., *Sw.* l. c., *Scolopendr.* Roth. et
Smith., *Vittaria Bernh.*

In fissuris rupium in subalpinis. 24.

Bene jam monet Cel. Swartz. in Diar. bot. Schrad. 1801. p. 283.: „indusio *Aspleniis* proprio carent fructificationes. — Pro indusiis squamulae inserviunt;” et jam ipse recte nunc Filicem *Grammitidi* adscripsit.

*2. *Gr. leptophylla* Sw., frondibus subbipinnatis, pinnulis obovatis, incisis, cum rachi glaberrimis. Schk. t. 26. (*Polypod.*). Swartz *Syn. Fil.* t. 1. f. 6.

Polypod. L.

Ex *Asciburgo* (et *Helvetia*) se specimina accepisse per litt. nos edocuit amiciss. Schkuhr. Ipsi germanica specimina nondum vidimus. 24.

Simillima huic *Gramm. cheilanthesoides* Sw. ex ins. *Maurit.*, pubescentia imprimis insignis.

2. *Polypodium* Roth. Fl. germ. III. 1. p. 40.

Sporangia in frondis dorso in punctis disposita.

* fronde pinnatifida.

1. *P. vulgare* L., laciniis linear-oblongis, obtusis, subserratis; radice squamata. Fl. Dan. t. 1060.

Schk. t. 11 et 17. *Bolt.* t. 18. *Engl.*

Bot. t. 1149. *Bull.* t. 191.

In sylvis. Aestate. 4.

Polyp. cambricum L. (*Schk.* t. 11. *Bolt.* 2. t. 5. a.), in Germania, quod scimus, hucusque non repertum (memorabilissimum tamen habemus specimen ab amiciss. *Wredow* e *duc. megap.* collectum, fructificans totum, sed evidentissime inter vulgatissimam formam et *P. cambricum* anglicum intermedium), hujus monstrum, fide *Smith.* — *Indasium* obsoletum, huic speciei tributum a *Cel. Hoffmann* in sua *Flora* nullum sane existit. — *Cel. Schkuhrus* in litt. ex individuis pensylvanicis nullo modo diversum censet *Pol. virginianum* L., nec ex specimine, quod ipsi ex *Am. bor.* accepimus, multum dissentire valemus.

** fronde bipinnatifida l. bipinnata.

*2. *P. hyperboreum* Sw., frondibus subbipinnatifidis, subtus hirtis; pinnis cuneatis, 3-5 lobatis, lobis crenulatis. *Bolt.* t. 42. *nostra* T. II. ff. 1. 2. et I. f. 1.

Acrostichum alpinum Bolt., *Liljebl. Fl.*, *Acrost. hyperbor.* *Liljebl.* in *Act. Holm.*, *Polyp. arvonium* *With.*

In alpp. *Carinth.* L. B. a *Wulfen.* ex *Asci-*
burgio accep. Schkuhr. 24. (Pr. *Barèges Gall.*
Flügge. *Stromeyer.* Nec non in *Helvetia*, fide
Schkuhr. in litt.)

3. *P. ilvense* Roth., frondibus
bipinnatifidis; pinnis oblongis, obtusis,
subtus hirtis, laciniis ovalis, integris;
sporangiorum punctis minutis, margi-
nalibus. *Fl. dan.* t. 391. *Schk.* t. 19.
Sturm. 6.

Roth. Catall. II. p. 140. n. 4., *Acrost. L.*, Po-
lyp. *Marantae Hoffm.*, excl. synonym.

In rupibus German. austral. 24.

4. *P. phegopteris* L., frondibus
bipinnatifidis; pinnarum infimo pari
deflexo, superiorum laciniis primis
rachi rhombeo - adnatis. *Fl. dan.* t.
1241. *Schk.* t. 20. et 20 b. („*Pol.*
hexagonopterum Michaux.?“) *Bolt.*
t. 20.

In sylvis. Aestate. 24.

Quod in hoc Polypodio et sequente Cel. *Roth.*
vidisse sibi persuasit indusium, certe nullum exsi-
stit. Monet in litt. Cel. *Schkuhr.*, Polypod. etiam
hexagonopteri americana exempla nec ullo modo

ei diversa videri ab Europaea stirpe. Utrumque tamen Swartzius sejunxit.

*** fronde supradecomposita.

5. *P. Dryopteris* L., foliolis ternis, bipinnatis L. *Schk.* t. 25. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 28. *Engl. Bot.* t. 616.

In sylvis. Aestate. 4.

Polypod. *robertianum* Hoffm. in Add. ad Flor. germ. notabilior hujus varietas hirsutiuscula, odore fragranti, in nemorosis montosis hinc inde occurrens, v. gr. pr. *Goetting.* ad m. *die Bruck.* — Pol. *Dryopteris* Dicks. Dr. Pl. (*Bolt.* t. 1.) a vulgari *Dryopteride* diversum censetur a *Smith.*, cui Pol. *calcareum* audit. Sec. criticum in *Gött. gel. Anz.* (*Schrad.*?) forte quoque German. indigena. Ex mente Swartz. *P. Dryopt.* „fr. patulo-deflexa, rad. filif.“, *P. calcar.* „fr. erecta rigidula, soris confluentibus“ dignoscitur. Nobis quoque reapse ambae stirpes diversae videntur.

In Alpp. *Styriae*, *Carniol.*, *Tyrolenss.*, sec. Hall. A. Lit. Zeit. 1804. No. 369., nuperrime verum *Acrost. Marantae* L. (*Schk.* t. 4. *Sturm.* 6.), quod *Bernhardius* male conjungendum censuit

cum Grammit. *Ceterach*, lectum esse dicitur. Sed totum genus hac ex auctoritate nostris inserere licitum non putavimus. Character vero generis in sequenti nostri opelli parte melius dilucidandus in sporangiis consistit in frondis dorso solitariis, sed ita numerosis, ut totam paginam obtegant. Species gaudet fronde subbipinnata, pinnulis coadunatis, basi subdentatis, dorso numerosissimis squamis paleaceis vestitis.

B. Indusiatae.

a. indusio superficiario.

3. *Aspidium* Swartz. l. c. p. 29.
(*Tectaria* Cavan., *Athyrium*, *Polystichum* et *Cyathea* Roth. Fl.)

Sporangia in frondis dorso in punctis disposita.

Indusium reniforme, l. peltatum, l. squamiforme.

* fronde pinnata.

1. *A. Lonchitis* Sw., pinnis lunulatis, ciliato-serratis; stipite strigoso Sw. *Fl. dan.* t. 497. *Schk.* t. 29. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 19. (in Tab. nostr. II. f. 3. indusium)

Polypod. L.

In sylvis montosis subalpinis German. infer.
Aestate. 24.

2. *A. Oreopteris* Sw., pinnis lanceolatis, pinnatifidis; laciniis obtusiusculis, integris; sporangiorum punctis submarginalibus, distinctis. *Fl. dan.* t. 1121. *Hedw. Theor.* Ed. 2. t. 6. *Schk.* t. 35. 36. *Bolt.* t. 22. (Pol. *Thelypt.*) *Engl. Bot.* t. 1019.

Polypod. Ehrh. *Beytr.*, *montanum* Vogler *Diss.*, *limbospermum* Bell., *pteroides* Vill., *Thelypteris* Wigg. *hols.*, Hedw. l. c.

In nemorosis montosis. Aestate. 24.

** fronde 2 - 3pinnata.

† indus. subrenif. l. peltato, puncto affixo.

3. *A. Thelypteris* Sw., pinnis subpinnatis; pinnulis l. laciniis lanceolatis, integris, fructiferis margine revolutis; sporangiorum punctis confluentibus. *Fl. dan.* t. 760. *Schk.* t. 52. *Schmid. Ic.* t. 11 et 13. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 43. 44. (Acrost. *Thelypt.*) *Engl. Bot.* t. 1018.

Polypod. L.

In humidis nemorosis. Aestate. 24.

Frustula ex Am. bor. accepta procul omni dubio nostrae speciei *Schkuhrus* misit. An itaque *Nephrod. thelypteroid.* Mich. (*Aspid.* Sw.) species non distincta? Nec ipse vidit Swartzius.

4. *A. cristatum* Sw., fronde lineari-lanceolata; pinnis subpinnatis, ovato-oblongis; pinnulis ovatis, obtusis, incis, denticulato-serrulatis; stipite paleaceo. *Act. Holm.* 1787. t. 9. *Schk.* t. 37. (in *Tab. nostra* II. f. 4. pinnula.)

Polypod. L., Afzel. in *Act. Holm.* l. c., *P. Calipteris* Ehrh.

Rarius in Germaniae, inprimis Saxon. infer. et super. nemorosis montosis. Aestate. 24. (rarissimum quoque *Upsaliae*.)

Cum sequente *Bernhardius* conjunxit, vix apte.

5. *A. Filix mas* Sw., fronde oblonga; pinnis pinnatis, lanceolato-oblongis; pinnulis oblongis, crenatis, apice serratis; stipite paleaceo. *Lobel. Ic.* p. 812. *Schk.* t. 44. *Bolt.* t. 24. *Bull.* t. 183.

Polypod. L.

Ubique in sylvis, per totum fere annum. 24.

In montosis, v. gr. in m. *Weissner* Hass. formam aliquantulum diversam induit; tum ne cum priori confundas cave.

6. *A. rigidum* Sw., pinnis bipinnatifidis, ovato-lanceolatis; laciniis oblongis, obtusis, apice (2-3) dentatis; stipite strigoso. *Schk.* t. 38.

Polyp. Hoffm. in Fl., *P. Heliopteris* Borckh., *Polystich. strigosum* Roth.

In German. infer. subalpinis. 4.

Habitus mollis; frondes flaccidae. Et hoc, uti proxime insequens, cum antecedente iungendum censuit *Bernhardius*; prout videtur contra naturae nutum.

7. *A. spinulosum* Sw., fronde tripinnata; pinnulis l. laciniis oblongis, acutis; mucronato-serratis; stipite paleaceo. *Müll. Fridrichsd.* t. 2. f. 2. *Fl. dan.* t. 707 et 759 (*P. Dryopt.*). *Schk.* t. 48. 45. (*Asp. erosum*) et 51. (*Asp. depastum*). *Bolt.* t. 23.

Polypod. Retz., *cristat.* auctt. (*Polyst. spinosum* Roth., *Aspid. spinulos.* Smith.), *dilatatum* (*Polyst. multiflor.* Roth., *Asp. dilatat.* Smith.) et *tanacetifol.*

fol. Hoffm. Fl., aristatum Vill. et Bell., Nephrod. cristatum Mich. bor. am?

In sylvis ubique. 24.

Forte Schkuhrii duas species t. 45 et 51. cum *Aspid. Fil. mari* conjungere malueris. Auctor in litt. nuperrime in eo persistit, ut utraque species distincta sit. Insimul frustula benigne communicavit. Ex his, primo quibus notis alterum harum Filicum ab altera distinguat, plane non videmus; secundo, si etiam in ambiguo remaneat, an utraque ad *A. spinul.* l. ad *A. Fil. mar.* referenda, proprias tamen species censere nequimus. Nonne etiam *Bernhardius* in *Schrad. Journ.* 1799. l. *Aspidia Fil. marem et spinulosum*, una cum *cristato* et *rigido*, in unicam speciem conjungenda autumaverit? Ex quo affinitas pateat inter *Fil. mar.* et *spinulosum*. — Neque cum *Swartzio* nostro in *Add. ad Synops. Fil.* denuo *Aspid. spinulosum* in duas species distinguente consentire hucusque valemus. Forte postera dies certiora dabit.

8. *A. aculeatum Sw.*, fronde bipinnata; pinnulis lunulatis, mucronato-dentatis; stipite strigoso. *Pluk ph. t. 180. ff. 1. 3. Bolt. t. 26. Schk. t. 39.*

Polypod. L., setiferum Forsk.

In montosis nemorosis. Per aestatem. 24.

Varietatem declaravit *Bernhardius Asp. Lonchitidis*; vix apte. Satis distinctum non censem *A. lobatum* anglicum (*Schk. t. 40.*).

†† indusio laterali, squamaeformi, lineola affixo.

*9. *A. fontanum* Sw., fronde bipinnata; pinnulis cuneatis, incisiss, mucronato-dentatis. *Pluk. ph. t. 89. f. 3. Barrel. t. 432. f. 1. Schk. t. 53. (in Tab. nostra II. f. 5. pinnula mutica.)*

Polypod. Leers Herborn., non L., teste Smith. Asplen. An. de cienc. nat. T. 5., Athyr. fontan. et Halleri Roth. (ex herb.), Fil. dent. pum. Dillen. Giss. p. 104. Append. p. 50.?

Pr. *Marburg. cattic.* lecta specimina vidimus ab amiciss. D. *Wibel*, e quibus nullum porro dubium, quin sit nostrae Florae indigena aequae rara alias ac pulchra Filix, de qua propriam cf. fig. 24.

10. *A. fragile* Sw., pinnis bipinnatifidis; pinnulis ovatis, incisiss; lacinulis obovatis, dentatis. *Fl dan. t. 401. Schk. tt. 54. 55. 56. Bolt. t. 27. et 45. (Pol. rhaetic.) (in Tab. nostra II. f. 6. indusium.)*

Polypod. L., anthriscifolium (et var. angust.), cynapifol., tenue, fumarioid. et pedicularifol. (rhae-

tic. quorund. Germann. et Helvett.) Hoffm., *Cyathe* Smith., *regia*, *anthriscif.*, *cynapifol.* Roth. Flor.

In sylvis, ad vall. lapidd.; ubique. 24.

Quo inductus errore nescimus *Smithius* hanc speciem confuderit cum exoticis *Cyatheis*; id quod effecit, ut nostri harum plane perversam acquirerent ideam. Pol. *dentatum* Dicks. Fasc. 3. t. 7. f. 1. Smithio et Swartz. convenn. a nostro diversum. Ipsi Filicem nondum vidimus.

11. *A. alpinum* Sw., decompositum; foliolis tripinnatis pinnisque remotis; pinnulis cuneato-obovatis, incisis; laciniulis obtusis, subbifidis Sw. *Jacq. ic. rar. Segui. Veron. Suppl.* t. 1. f. 3., male ab Hoffmanno ad suum *Polyp. fumarioid.* cit. *Schk.* t. 62.

Polyp. Wulf. ap. Jacq., *crispum* Gouan., *Cyathe* Roth.

In German. austral. alpp. 24.

Similia plane eadem putare in hisce admodum proclivis *Bernhardius* et hanc pulcherrimam speciem varietatis ad instar subjunxit proxime antecedenti. Nec *Schkuhrius* per litt. nuperrime datas huic opinioni contrarius.

12. *A. Filix femina* Sw., pinnis bipinnatifidis; pinnulis lanceolatis; la-

cinulis acutis, apice bi-tridentatis; sporangiorum punctis ovalibus. *Pluk. phyt.* t. 180. f. 4. *Müll. Fridrichsd.* t. 2. ff. 3. 4. (haec male ab Hoffmanno cit. ad suum *Pol. dilatatum.*) *Schk.* t. 58. 59. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 26. (in Tab. nostra II. f. 7. indusium ab *Athyriorum* Roth. indusii forma ad eam *Polystichorum* hujus auctoris vergens.)

Polyp. L., molle Schreb. (*Athyr. Roth.*), *dentatum* (*Athyr. ovatum* Roth.), *incisum* (*Athyr. Fil. fem. Roth.*), *trifidum* Hoffm. (huic proxime accedit, tamen Swartzio diversum: *Nephrod asplenoides* Michaux. bor. am.), *ovato-crenatum* Hoffm. in *Mag. f. d. Bot.*, *crenatum* (*Aspid. alpestre* Hopp.) et *spinulosum* Schrk., *Athyr. trifidum* et *rhaeticum* (*Pol. Fil. fem. Hoffm.* debilis, pallidior frons, statura minori) Roth.

In sylvis; ubique, ad autumnum usque. 24.

Mire Indens species, quae varie botanicos vexavit. A. Bernhardio, ob puncta sporangiorum ovalia, Asplenii generi subjuncta, sub triviali *cyathoidis* nomine; et sane haud inepte Michauxius quoque monet, suum *Nephrod. asplenoides* l. c. transitum monstrare ad *Asplenium*. Sed egregie Bernardius synonyma coordinavit, non nisi in his errore ductus, quod *Polypp. mollia* Schreb. et

Ehrh. diversa putaret ultimumque *dentato* Hoffm. adjunxerit, cum e speciminibus certissime *molliæ* Schreb., Ehrh. et Hoffm. plane eadem sint. — *Aspid. rhaetici* Sw. genuini, obscuræ adhuc nobis speciei, primaria differentia, qua ab *Aspid. Fil. fem.* distinguatur, in indusiis non, ut in ulima Filice, laciniatis, sed integerrimis et subreniformibus, consistere videtur. Schkubrianum *A. rhaeticum* t. 60. in *Salisb., Carinth. (Helvet., Gallia prope Grenoble)* lectum, senili fructificationis statu ab amiciss. viro nobiscum communicatum, ut indusiorum formam observare nequeamus, an genuinum sit discernere non possumus. Cf. *Swartz. Syn. Fil. p. 59.* Noluimus itaque dubia, forte refutanda, nostro operi inserere.

13. *A. montanum* Sw., fronde supradecomposita; foliolis ternis, 3pinatifidis; lacinulis subfalcatis, obtusis, apice dentatis. *Pluk. ph. t. 89. f. 4. Schk. t. 63.*

Polypod. Allion., myrrhidifolium Haenke ap. Jacq., *Cyathea* Smith. et Germanicor.

In sylvaticis subalpinis German. meridion. 24. (*Helvet. Schleich., Norvag. Web. pat.*)

Frondis forma et divisione primaria quodammodo simile *Polyp. Dryopter.*, quocum comparatum ea quidem se habet ratione, qua *Aspid. aculeatum*

ad Aspid. *Lonchit.*, l. *A. alpin.* ad *fragile.* Caeterum mollis, flaccida.

Hujus l. antecedentis generis dubia: Polypod. *asplenoides* Scop. Carn. Ed. 2, T. II. t. 62. (hocce tamen amiciss. *Schkuhrus* [per litt.] Gramm. *Ceterach* Var. suspicatur,) et Polyp. *austriacum* Jacq. Obs. bot. P. I. p. 45., quod ultimum *Schkuhrus* suum Asp. *depastum* putat, dissentiente *Swartzio* nostro.

4. *Asplenium* L.

Sporangia in frondis dorso in lineis disposita.

Indusium squamaeforme, intus rumpens.

* fronde divisa.

1. *A. septentrionale* Hoffm., stipitibus nudis, glabris, superne bipartitis; foliolis linearibus, apice laciniatis Sw. *Fl. dan.* t. 60. *Sturm.* 5. *Bolt.* t. 8. *Engl. Bot.* t. 1017. *Schk.* t. 65.

Acrostich. L., *Scolopendr.* Roth., *Pteris*, autumnante Smith. olim.

In fissuris rupium, per totam fere German. 2.

Ad varia varie a botanicis relata Filix genera;
attamen verum *Asplenium*.

** fronde pinnata.

2. *A. viride* Huds., pinnis rhom-
beo-subrotundis, serratis; stipite viri-
di. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 14. *Schk.* t. 73.

In fissur. rup. Saepius occurrit in German. au-
stral. 4.

3. *A. trichomanoides* L., pin-
nis subrotundis, crenulatis; stipite fusco.
Fl. dan. t. 119. *Bolt.* t. 13. *Engl. Bot.*
t. 576. *Bull.* t. 185. (in Tab. nostra
III. f. 3. pinna.)

A. Trichomanes Mich. bor. am. ? Frustula enim
ex Am. bor. accepta, quae *Schkuhrius* communi-
cavit, absque dubio nostrae Filicis. Tamen inter
dubias Michauxianam Swartzius refert. Sane nec
descriptio aliena.

In rupib., muris. Vulgarius in septentr. Ger-
man. 4.

*** fronde bipinnatifida et bipinnata.

4. *A. Adiantum nigrum* L.,
fronde subtripinnata; pinnulis ovato-

lanceolatis, inciso-serratis. *Fl. dan.*
t. 250. *Sturm.* 5. *Bolt.* t. 17.

Asplen. *lanceolatum* Hoffm. Fl. mera et levis-
simae notae hujus var. Anglica autem species,
Aspl. *lanceolatum* Huds. — Engl. Bot. t. 240. —
distinctissima, ita fere sese habens ad Aspl. *Ad.*
nigr., uti Aspid. *fontan.* ad Asp. *frag.* Haec, quod
scimus, nondum apud nos lecta.

In fiss. rup.; haud ita vulgare. 4.

5. A. *Ruta muraria* L., fronde
alternatim decomposita; pinnulis cu-
neato-rhomboideis, subtrilobatis, cre-
nulatis. *Fl. dan.* t. 190. *Bolt.* t. 16.
Engl. Bot. t. 150. *Bull.* t. 195.

In muris, rupibus. 4.

A Cel. *Roth.*, cum insequenti, *Scolopendrii* genere
subjunctum, certe non apte. Bene monet Cel.
Hoffmann in Add. ad Fl. frondibus et foliis multo
angustioribus hocce ludere, quo in statu veremur,
ne a botanicorum pluribus cum sequenti sit con-
fusum; et fere absque dubio huc pertinet A. *ger-*
manicum Wigg. hols.

6. A. *Breynii* Retz., fronde alter-
natim subdecomposita; pinnulis cunei-
formibus, apice incisis. *Breyn. Cent.*

I. t. 97. *Jacq. Misc.* 2. t. 5. f. 2.
(*Asplen. alternifol.* Wulf.) *Sturm.* 5.

Retz. Observ. bott. I., *germanicum* Weiss.,
Hoffm., Scolopendr. Roth.

In rupibus, muris, 24. (Certe nunc apud *Goetting.* non amplius observatum.)

Inter utramque speciem 5 et 6. intermediam,
nisi priori nimis affinem, *Rutam murariam* *magellanicam* ex herb. *Commerçon.* ab amiciss. *R. A. Hedwig* accepimus.

5. *Scolopendrium* *Smith.* in *Mém.*
de l'acad. roy. des scienc. de Turin.

Vol. 5. p. 410. t. 9. f. 2.

Sporangia in frondis dorso in lineis ad venulas disposita. *Indusia* superficialia binas tegentia lineas,
mox superum extus, inferum intus, mox hoc
extus, illud intus rumpens.

1. *Sc. officinarum* Sw., frondibus cordato - lingulatis, subintegris.
Plum. fil. 34. t. A. f. 4. *Bolt.* t. 11.
Engl. Bot. t. 1150. (*Sc. vulgare*).
Schk. t. 83. (in *Tab. nostra* III. f. 4. fructus.)

Asplen. Scolopendr. L., *Scolop. Phyllitis* Roth.
β. crispum, marginibus undulatis, saepe erosis.

V. daedaleum, fronde apice divisa, subpalmata.
Schk. t. 83. b.

In nemorosis montosis. Autumno. 2.

Frons saepe sesquipedalis.

6. *Blechnum* L.

Sporangia in frondis dorso in linea continua,
utrinque costae parallela, disposita. *Indu-*
sium intus rumpens.

1. *Bl. boreale* Smith., frondibus
pinnatifidis; sterilium laciniis oblon-
go-, fertilium lineari-acuminatis, al-
ternis, falcatis *Fl. dan.* t. 99. *Hedw.*
Theor. Ed. 2. t. 5. *Bolt.* t. 6. *Engl.*
Bot. t. 1159. (in Tab. nostra III. f. 5.
lacinia fructifera.)

Osmunda Spicant L., *Acrostich.*, *Onoclea*, *As-*
plen., *Struthiopteris* alior.

Ludit fronde subdivisa.

In sylvaticis, ad rupes, per totam fere German.
Vere. 2.

Blechn. onocleoides Sw. indicum, praeter statu-
ram majorem differt frondium sterilium laciniis
ovato-lanceolatis, terminali subhastata,
elongata, fertilium pinnis suboppositis, basi non
confluentibus. — Generis character in frondibus

non adeo vetustis sporangiisque minns maturis solummodo cognoscendus; cf. ic. nostr.

7. *Hymenophyllum* Smith. l. c.
p. 418. t. 9. f. 8.

Sporangia in frondis margine in punctis subsertis disposita, columulae (sporangio-phoro Bernh.) affixa. *Indusium* duplex, l. bivalve.

1. *H. tunbridgense* Sw., fronde subbipinnata; pinnis decurrentibus, pinnulisque serratis; sporangiorum punctis supraaxillaribus, solitariis. *Fl. dan.* t. 954. *Bolt.* t. 31. *Engl. Bot.* t. 162. *Hedw. fil.* III. t. 1. (in Tab. nostra III. ff. 6. 7. fructus.)

Trichomanes L.

In *Carniae* palustribus pr. *Artegnam*, alibique. *Host. Syn.* Aestate. 24. (attamen germanica nondum vidimus specimina.)

Sec. *Smith.* *Trich. pyxidiferum* Anglor. hujus var. (vel ex *Engl. bot.* t. 1417. propria species: *Hymen. alatum*), et minime verum Linnéanum.

b. indusio marginali, intus dehiscente.

8. *Pteris* L.

Sporangia in frondis dorso in linea continua
ad marginem disposita.

1. *Pt. aquilina* L., fronde supra-
decomposita; foliolis pinnatis; pinnis
lanceolatis, repandis, infimis pinnatifidi-
dis, superioribus minoribus. *Blackw.*
t. 325. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 10. *Bull.*
t. 207.

Fere ubique in sylvis, primo gelu autumnali
obiens. 24.

Quae a quibusdam memorabatur auctoribus mon-
strositas, lineolis atris in frondis dorso notata, frons
fungulis parasiticis, forte *Sphaeriis* infestata jam
ab Rothio nostro autumabatur. *Sphaeriam Pteridis*
ante multum temporis amiciss. *Wahlenberg* lineo-
las has jam denominavit, primus vero descripsit
conjunctiss. *Rebentisch* in Fl. Neom. p. 324. n.
1091., sub eodem nomine justamque addidit habi-
tualem figuram T. I. 3.

2. *Pt. crispa* Sw., fronde supra-
decomposita; foliolis bipinnatis; pin-
nulis sterilibus subrotundis, incisis,
fertilibus oblongo-linearibus, integris.

Fl. dan. t. 496. *Sturm.* 1. (solummodo fertil. fr.) *Bolt.* t. 7. *Engl. Bot.* t. 1160. (in Tab. nostra IV. f. 1. pinnae fructiferae.)

Osmunda L., *Onoclea* alior.

In German. austral. sylvis. Vere et aestate. 24. *Pter. heterophyllae* L. quodammodo similis, sed multum diversa.

9. *Adiantum* L.

Sporangia indusio squamaeformi intus adnata.

1. *A. Capillus* L., fronde decomposita; pinnulis cuneato-rotundatis, lobatis; lobis fructiferis. *Wulf. in Jacq. miscc. austr.* 2. t. 7. *Bolt.* t. 29. *Bull.* t. 247. (in Tab. nostra IV. f. 2. lobi fructiferi.)

In *Littorali*, *Forojulio* ad cisternas; in rupibus humidis. Aestate. 24. *Host. Syn.* (Specimen vidimus.)

10. *Onoclea* L.

Sporangia in (pinnarum, l. pinnularum, l.) laciniarum revolutarum, et *indusia* constiruentium, dorso ad venas in punctis transversim parallelis (et saepe continuam lineam efformantibus) disposita, tandem totam paginam tegentia.

1. *O. struthiopteris* Hoffm., pinnis pinnatifidis, fertilium laciniis revolutis. *Fl. dan.* t. 169. (in Tab. nostra IV. ff. 3. 4. fructus.)

Osmunda L.

Var.: frondibus superne fructiferis, inferne sterilibus.

In subalpinis, ad ripas fluviorum. Aestate. 24. (in Hercyn. inter *Andreasberg* et *Lauterberg* satis frequens.)

Steriles frondes admodum similes iis *Aspid.* *Fil. mar.*; at laciniarum marginibus subintegerrimis. Caeterum omnes erectae, verticillatae, ut infundibulum sistant, altioris staturae, laetiusque virides. In medio tandem fructiferae reperiuntur frondes.

O. II. Rimatae.

II. *Osmunda* L.

Sporangia in racemo (, l. dorso frondis,) disposita, pedicellata, nuda.

1. *O. regalis* L., frondibus omnibus fructiferis, bipinnatis; racemo terminali, supradecomposito. *Fl. dan.* t. 217. *Sturm.* 6. *Bolt.* t. 5. *Engl. Bot.* t. 209. (in *Tab. nostra* I. ff. 2. 3. fructus.)

n humidis, nemorosis. Jun. Jul. 24.

O. III. Valvatae.

A. Nudae.

12. *Botrychium Swartz.* l. c. p. 110. (*Osmunda* Bernh.)

Sporangia in racemo disposita, adnata.

B. *Lunaria* Sw., fronde subsolitaria, pinnata, bi-, tripinnata. (in *Tab. nostra* IV. f. 5. racemi pars.)

α. fronde solitaria, pinnata; pinnis lunatis, crenatis. *N. A. N. C.* l. t. 2. ff. 1. 8. 9. *Fl.*

dan. t. 18. fig. infer. sin. Sturm. 1. Bolt. t. 4.
Engl. Bot. t. 318.

Osmunda Lunaria α . L.

In montosis, aridis. Jun. 24.

Ludit „frondibus spicisque multiplicatis” (Smith.).

N. A. N. C. l. c. ff. 2. 10. 11. 14. ?

Osmunda Lunar. β . L.

β . (*matricariaefolium* Retz. Prodr.), frondibus subbinis, subtripinnatis; pinnularum laciniis rotundatis. Breyn. Cent. t. 95. N. A. N. C. l. c. ff. 3-6. Fl. dan. t. 18. fig. super. Sturm. 6.

Osm. bavaria Schmid. in Hopp. Taschenb. 1803., O. *Matricariae* Schrank. ?

In sylvarum apricis (pr. Weltenburg, Keistorf et Pointen Bavar. Schmid.) Jun. — Sept. 24.

γ . (*rutaceum* Retz. Pr.), frondibus subsolitariis, subbipinnatis; pinnulis l. laciniis sublinearibus, crenato-subincisis. Breyn. Cent. t. 94. (et 93. ?) N. A. N. C. l. c. ff. 12. 13. Fl. dan. t. 18. fig. infer. dextra.

Osm. Lunar. γ . L., *ramosa* quorund. ?

In paludosis, umbrosis (v. gr. pr. Berol.) 24.

Adnotaverat quidem am. veneratiss. Willdenow (Praef. ad Reber. Prodr. p. IX.), huic et Ophiogl. vulgato omnino esse vernationem circinnalem; qua

quidem a *Lycopodiis* caeterisque distare haec genera valvatis Filicibus. Sed optime infanti specimen transmissio nobis demonstravit Cel. *Swartz*, hujus juniorem plantam in vetusto quidem absconditam inveniri caule, laciniasque frondis esse complicatas, minime vero reapse circinales, quod ex situ esse nequeant. De *Ophioglosso* quoque *Jussaeus* (Genn. p. 15.) perhibet: „folium est radicale, non convolutum.” Valvatarum ergo ordo aequae naturalis ac artificialis, vix dirimendus. — Aliis tres a nobis speciei enumeratae, atque figuris anxius comparatis et citatis, prout speramus, dilucidatae varietates, totidem distinctae videbuntur, et jam visae sunt, stirpes. Ipsi *Oederum*, qui (Fl. dan. l. c.) omnes promiscue crescentes invenit, sequi et varietatum, licet notabiliorum, ad instar eas enumerare voluimus. *Swartzius* alteram et tertiam (*Breyn.* t. 94 et 95.) sub Botrych. rutaceo conjunxit, distinctumque hoc a vulgari pronuntiavit. Cur vero Fl. dan. omnino non, N. A. N. C. tantum ff. 3 — 6, nec 12. 13. ad suum B. rutaceum allegaverit, non capimus. Citat vero una cum *Lunar.* γ. L. et ejusdem β., quae sec. *Retz.* solummodo „spica gemina”, sec. *Smith.*, qui, uti *Retz.* nullam ad eam laudat figuram, „frondibus, spicisque multiplicatis” differre dicitur, quamque itaque frequentissimum vulgari var. usum non possumus quin habeamus. Caeterum sec. *Smith.* *Breyn.*

t. 94. Linnéi γ ., sed Breyn. t. 93., quam ipse Linnéus ad suam γ . citavit, non multum discrepantem putamus. Rothius vero errat, si ad hanc Linnéi γ . Fl. dan. fig. suprem. pertinere putat, nam haec Fl. dan. fig. cum Breyn. t. 95. [et N. A. N. C. l. c. ff. 3 — 6. et Sturm 6.] plane convenit, et jam ipse Linnéus Fl. dan. fig. 3. ad γ . posuit. Rothii autem olim *ramosa* dicta species si Berolinensis sit a Willdenovio lecta illa stirps, ad nostram γ ., cujus specimen Willdenovius ipse suppeditavit, referenda. Quid vero N. A. N. C. l. c. fig. 7., quid Botryp. *lunarioides* Mich. bor. am. cujus cum nostra γ . quadrat, descriptio? — Botrych. *virginianum* Sw., quod semel plus incisis, caeterum simillimis cum nostra β . gaudet frondibus, his semper pluribus et habitu multo teneriore imprimis dignoscitur. An cum eo idem sit Botryp. *virginicus* Mich. bor. am., cum auctor Moris. III. s. 14. t. 4. f. 5. allegat?

13. *Lycopodium* L.

Sporangia (subreniformia,) in axillis foliorum, & squamarum spicarum solitaria, subsessilia.

• sporangg. reniff., bivalvv., in axillis foliorum undique sessilibus (*Selago* Dillen., *Huperzia* Bernh., *Plananthus* Pal. Beauv.).

1. L. *Selago* L., foliis sparsis, 8fa-

riis, lanceolato-subulatis, lenissime denticulatis; caule dichotomo, erecto, fastigiato. *Dillen.* t. 56. f. 1. *Fl. dan.* t. 104. *Sturm.* 5. *Engl. Bot.* t. 233. (in Tab. nostra I. f. 4. sporang.)

In subalpinis, humidiusculis. Aestate. 24.

Folia nuda quidem oculó integerrima, interprete Cel. Smith., sed convexioribus vitris lenissime denticulata l. crenulata; cf. *Roth. Fl. et Sturm.*

** spicis terminalibus fructiferis.

† sporangg. reniff. bivalvv., aliis nullis (*Lepidotis* Pal. Beauv.).

2. *L. inundatum* L., foliis sparsis, integerrimis, muticis, subincurvis; spicis solitariis sessilibus. *Dillen.* t. 62. f. 7. *Fl. dan.* t. 336. *Sturm.* 5. *Engl. Bot.* t. 239.

In ericetis; turfosis inundatis. Aestate. 24.

3. *L. alpinum* L., foliis 4fariis imbricatis, acutis; caule repente; surculis erectis, dichotomis, fastigiatis; spicis sessilibus, teretibus. *Dillen.* t. 58. f. 2. *Linn. Fl. Lapp.* Ed. 2. t. 11. f. 6. *Fl. dan.* t. 79. *Sturm.* 5. *Engl. Bot.* t. 234.

In subalpinis. Jul. — Oct. 24.

Forte ex lapsu memoriae in quoque *Bructerum*, nostro superbientem, *L. complan.* locum natalem adsignavit sagaciss. Spicil. Fl. Goett. auctor. Recentiorum enim nulli, nec ipsi, praeter *L. alpin.* quid in Bructero reperierunt. In aliis Hercyniae montt. *L. complan.* copiosissimum.

4. *L. annotinum* L., foliis sparsis, 5fariis, patentibus, serrulatis, muticis; surculis annotino-articulatis; spicis teretibus, sessilibus. *Dillen.* t. 63. f. 9. *Fl. dan.* t. 127. *Sturm.* 5.

In sylvis montosis. Aestate. 24.

5. *L. clavatum* L., foliis sparsis, subsecundis, serrulatis, piliferis; spicis teretibus, pedunculatis, geminis. *Dillen.* t. 58. f. 1. *Fl. dan.* t. 126. *Sturm.* 5. (minus bona). *Engl. Bot.* t. 224.

In ericetis, montosis. Aestate. 24.

Caules flagelliformes.

6. *L. complanatum* L., surculo compresso; foliis in anteriori pagina 3fariis, connatis; squamis minimis, remotis, uniseriatis in dorso; spicis

geminatis; pedunculatis. *Dillen* t. 59. f. 3. *Fl. dan.* t. 73. *Sturm.* 5. (ab anter. solummodo pagina picta.)

In sylvis montosis, ericetis. Jul. Aug. 24.

Arctissime quidem cum *L. alpino* congruens, quo ut utrumque idem putarent quidam seducti. Bene Cel. *Michaux* in *Fl. bor. amer.* admonet: „ramuli saepe caeteris complanatis intermixti occurrunt foliis 4fariam imbricatis.” *Fl. dan.* fig. conveniente *Swartz.*, hujus loci, nec te in errorem inducat *Rothius* (*Fl. germ.* T. III. P. I. p. 19. obs. 1.), ut cum americano *Lycopod.* *Dillen.* t. 60. confundas.

†† sporangg. superiorr. reniff., bivalvv., inferr. sub 4 cocc., bivalvv., valvulis trilobis) *Selaginella* Pal. Beauv.).

7. *L. selaginoides* L., foliis sparsis, lanceolatis, ciliatis, patentibus; spicis solitariis, sessilibus. *Dillen.* t. 68. f. 1. *Fl. dan.* t. 70. *Sturm.* 5. *Engl. Bot.* t. 1148.

In ericetis, pascuis muscosis alpinis. Aug. 24.

Quod olim in *Beytr.* I. p. 91. pr. *Vegesack* se legisse perhibuit Cel. *Roth.* *L. selaginoid.*, fide ipsius herb., et in *Fl. germ.* T. III. P. I. p. 15.

ipso jam adnotante, pumila L. *Selaginis* stirps.
Verum L. *selaginoid.* vix nisi in austral. German.
obvium. — E fig. *Sturm.* folia ne putes nervo
instructa, quae, bene Cel. *Smith.* adnotante, plane
enervia.

††† sporangg. superr. reniff., 2valvv., aliis subro-
tundis, pauciorr., rarius 3coccis, ad basin ejusd.
spicae (*Stachygyn.* et *Diplostach.* Pal.
Beauv.).

8. L. *helveticum* L., foliis 2fa-
riis, patulis, superficialibus distichis,
remotiusculis; surculis repentibus, di-
chotomis; spicis bifidis, pedunculatis.
Dillen. t. 64. f. 2. *Jacq. austr.* 2. t.
196. *Sturm.* 5.

L. *radicans* Schrk., Hoffm.

In alpp. German. austral. Jul. Aug. 24.

Ab Hallero, Rothio, Hoffm. a Lycop. *denticu-
lato* L. (*Dillen.* t. 66. f. 1. A.), in Germania, quod
scimus, nondum reperto, sed e *Pyrenaeis*, infer.
Ital., *Lusitan.* nobis viso, vix ac ne vix quidem
distinctum censebatur. In Lycop. *denticul.* autem
spicae geminatae, sessiles, quae in nostro longe
pedunculatae. Tum folia quidem omnia, margina-
lia aequae ac superficialia in utraque specie denti-
culata l. potius serrulata, figura autem et accumu-

latione maximopere discrepantia. In *Lycop. helvet.* enim marginalia ovata, obtusa, superficialia ovato-lanceolata, aequae obtusa; in *Lycopod. denticulato* illa quidem non minus ovata et obtusa, sed insigniter obliqua, et multo ampliora, superficialia ex ovato admodum conspicue acuminata. Caeterum haec superficialia folia in *L. denticul.* multo densius congesta, et ita imbricata, quae in germanica stirpe sunt remota, disticha. — Cel. *Swartz* dubitanter olim *L. radicans* Schrk. ad *L. denticul.* retulit; sed revera est nostrae plantae synonymum.

B. Indusiatae.

14. *Ophioglossum* L.

Sporangia in spica disposita, disticha. *Indusium* universale, supra singula sporangia transversim rumpens.

1. *O. vulgatum*, fronde ovata L.
Plum. t. 36. B. f. 5. *Fl. dan.* t. 147.
Sturm. 1. *Bolt.* t. 3. *Engl. Bot.* t. 108. (in Tab. nostra IV. ff. 6. 7. fructus.)

In pascuis irriguis. Vere. 24.

„Variat rarius spica 2fida, aut gemina,” Smith.
— an etiam in German.?

O. IV. Peltatae.

15. *Equisetum* L.

(*Sporae*?) (staminibus?) 4, geminis coadunatis, basi cinctae. *Perigonium* interiori latere rima longitudinali hiantia.

• vaginis irregularibus.

1. *E. sylvaticum* L., ramis compositis, arcuato-deflexis, scabris. Smith. *Fl. dan.* t. 1182. *Hedw. Theor.* t. 1. (junius). *Bolt.* t. 32. 33. (in Tab. nostra I. ff. 5-7. partt. fructiff. analysis.)

Eq. capillare Hoffm. Fl. hujus sterile specimen.

In nemorosis. Vere. 24.

In monographica dispositione *Equiseti*, ab am. *Brückner* in Fl. Neobrandenb. Prodr. sistita, hujus speciei vaginae 2-4 fidae determinantur. Dentium vero horum latiorum singulus in angustiores plurimos saepe saepius finditur. Qua de causa, et simili dentium numeri variatione in fere omnibus observata speciebus, in hisce discernendis hanc eundem numerum adhibere noluimus.

2. *E. arvense* L., ramis patentidivergentibus; vaginis late fissis, dentibus lanceolatis. *Bolt.* t. 34.

Scapus fructiferus plerumque distinctus. Rarius frondes inveniuntur, amento terminatae, quae *Eq. pratense* Ehrh., Hoffm. (Phyt. Bl. t. 2.), apud *Stiege Thuring.* et *Kil. Hols.* ab am. *Mauch.* observatum. *Eq. pratense* Roth., in sylvis pr. *Erlang.* lectum, absque fere dubio sterilis *Eq. arvensis* frons altioris staturae.


In arvis. Primo vere. 24.

3. *E. fluviatile* L., ramis patentibus; vaginis anguste multifidis, dentibus lanceolato-subulatis. *Bolt.* t. 36. 37.

Eq. fluviat. Wigg. hols., fide auct., *E. Telmateja* Ehrh., *eburneum* Schreb., Roth.

In nemorosis humidis. Vere. 24. (rarius fructiferum.)

Optima fide Cel. Smith. in Fl. brit. *Eq. Telmateja* Ehrh. Linnéi genuinum *fluviatile*. — Cum antecedente specie arctius nobis conjunctum videtur, quam cum *Eq. limoso*; quo commoti hic inseruimus, lubenter scilicet secuti amiciss. *Brücknerum*, qui l. c. satis, prout videtur, apte quae hucusque sunt enumerata *Equiseta* vaginis irregularibus conjunxit, insequentia vaginis regularibus seposuit.



•• vaginis regularibus.

4. *E. palustre* L., ramis erectis; vaginarum dentibus lanceolatis; amento oblongo. *Fl. Dan.* t. 1183. *Bolt.* t. 35.

Variat ramis amentiferis (*Eq. polystachium* Raj. *Syn.* ed. 3. t. 5. f. 3., *nodosum* Schrank.)

In paludosis. Aestate. 24.

Huj. non censere nequimus levissimi momenti varietatem *Eq. ramosum* Schleich. *Cent.* 2. n. 1., in fissuris rupium calidiorum et glareosis *Vallesiae* ab auctore lectum. Pedem et dimidium altum, admodum gracile, ramis inferioribus pedalibus (sterilibus tamen). Caetera, amentum vaginaeque, prorsus eadem.

5. *E. limosum* L., caule nudiusculo; ramis erectis; vaginarum dentibus subulatis; amento ovato. *Fl. dan.* t. 1184. (*E. fluviat.*) *Bolt.* t. 38. *Engl. Bot.* t. 929.

Eqq. limosum et *fluviat.* auctt., *E. Heleocharis* Ehrh., *polymorphum* Schrank., *Brückner* n. 684. 685.

In udis, ad fossa. Aestate. 24.

Recentiores erraverunt, *Eq. limosum* ramiferum putantes Linnæi *fluviatile*. Nebulam amovit Smi-

thius, bene de nostro admonens: „videtur species a *fluviatili* distinctissima.”

6. *E. hyemale* L., caule nudo; vaginis truncatis, crenatis, amentum cingente dentata. *Bolt.* t. 39. *Engl. Bot.* t. 915.

In uliginosis. Aestate. 4.

7. *E. variegatum* Schleich., caule nudo; vaginarum dentibus lanceolato-subulatis.

Schleich. Cat., *tenue* Hopp., *arenarium* al.

In paludosis, pr. *Baadam.* Gmel. — *Diar. bot.* Schrad. 1800. 2. p. 436., in *comit. catimeliboc.* Berckh. in *Roem. Arch.* 1. (*Eq. hyem. var.*) 4.

Nova et pulcherrima species, *Eq. scirpoides* Michx. bor. am. p. 281., in *Uplandia* Suec. quoque obvia (*Eq. reptans* Wahl. mst., collatis Michauxianis et Wahlenbergg. speciminibus) nec minus apud nos nunc quoque lecta dicitur in *Alpp. Tyroll.* (Hall. A. Lit. Zeit. 1804. N 369.) Cum vero haec exemplaria nondum vidimus, speciem uti germanicam recensere nequivimus. Caeterum — cauliculis secundariis e primario reptante confertim erectis, simplicibus, gracillimis; vaginis 3dentatis — statim di-
gnoscentia.

O. V. Radicales.

A. Hermaphroditae.

16. *Pilularia* L.

Perigonium commune duplex; propria 4, spermatocystidiis superne, germinibus inferne receptaculo affixis.

1. *P. globulifera* L. *Vaill.* t. 15. f. 6. *Dillen.* t. 79. *Act. Gall.* (B. Juss.) 1739. t. 11. *Fl. dan.* t. 223. *Sturm.* 1. *Bolt.* t. 40. *Engl. Bot.* t. 521. *Bull.* t. 375. *Tab. nostra* I. f. 8. V. ff. 1-4.

Caulis repens, ramosus. Folia fasciculata, alterna, subulata, simplicia, erecta. Fructificationum nuculae in gremio foliorum solitariae. Vernatio circinalis.

17. *Marsilea* L.

Perigonium (externum, l. commune?) (duplex?); (internum 14-15 locale, l. totidem propria, duplici serie disposita?); germinibus spermatocystidiisque circumpositis parieti exteriori perigonii interni affixis.

1. *M. quadrifolia* L. *Act. Gall.*

(B. Juss. *Lemma*) 1740. t. 15. *Sturm.* 1.
(in nostra Tab. V. ff. 5 - 7. fructificat.
nuculae analysis.)

(M. M. *quadrif.* et *minuta* α . β . L., quas ad-
nuente B. Jussiaeo sejungendas censere plane ne-
quimus; cf. *Web. Br.* p. 63.)

In stagnantibus paludosis German. austral. Aesta-
te. 24.

Caulis repens, ramosus. Folia quaterna, petio-
lata. Fructificationum nuculae subaggregatae, pe-
dicellatae, e petiolo inferne orientes. Frons cir-
cinalis.

B. Monoicae.

18. *Salvinia* Mich.

Perigonium duplex, uniloculare, l. germinibus, l.
spermatibus receptaculo columnari affixis.

1. *S. natans* Schreb. *Mich.* t. 58.
Act. Gall. (Guettard. *Marsilea*) 1762.
t. 29. *Sturm.* 1. (in nostra Tab. V.
ff. 8. 9. nuculae femineae analysis.)

Marsilea L.

In aquis stagnantibus. Aestate. 24.

Natans, ramosa. Folia opposita, ovalia. Fructi-
ficationum sacculi inter radices glomerati, foemi-
neus supremus, caeteri masculi.

Isoëtes lacustris L. Florae germanicae civibus quidem adnumerata est. Sed cum *Holsatia* nostra certus locus natalis rari hujus vegetabilis unicus sit laudata, specimina vero in patria provincia lecta videre nobis non contigerit, temere plantam denno uti indigenam introducere nostrum non censuimus. Caeterum omnia omnium terrarum specimina, quotquot *Isoëtis* lustravimus, unius ejusdemque speciei ut putemus necesse est; et gaudemus, consentaneum hac de re ex litt. videre am. sagaciss. *Wahlenberg*, plantarum omnium, et cryptogamarum imprimis, scrutatorem, sincerissima fide dignissimum. Cf. quoque *Web. Br.* p. 62. 63.

O. VI. Calyptratae.

A. Operculatae.

a. Astomae.

19. *Phascum* Schreb. Obs. de Phasco.

(*Sporangium* clausum, operculo adnato.)

* foliis integerrimis,

1. *Ph. axillare* Dicks., foliis lanceolatis, patentibus, nervo evanescente.

Dicks. t. 1. f. 3. Hedw. Stirpp. I. t. 34. (Ph. nitidum).

In glareosis (v. c. pr. *Lips.*, in duc. *Brunsv.* Schrad. *Diar.* 1799. 2. p. 55., in *Siles. Ludw.*, et abili). Vere. 24.

Stirps minuta, glaucescens, solitarie degens. Setae ex innovatione caulis interdum axillares; haud raro gemellae. Nomen antiquius Dicksonianum bene restituerunt *Turner, Smith.*

2. *Ph. subulatum* L., foliis inferioribus lanceolatis, patentibus superioribus lanceolato-subulatis, erectis. *Dillen. t. 32. f. 10. Hedw. Stirpp. I. t. 35. Sturm. 6. Fl. dan. t. 249. fig. infer. sin.*

In nemorosis umbrosis. Vere. 24.

Stirps elatior, laete virens, gregatim crescens. *Ph. strictum* Dicks., ex fig. Dicks. (t. 10. f. 1.) huic foliorum forma, directione, quodammodo accedit, statura minima, foliis serrulatis, alia ut taceamus, satis superque diversum.

3. *Ph. crispum* Hedw., foliis lanceolatis; perigonialibus femineis lanceolato-longe acuminatis, siccitate tortilibus. *Hedw. Stirpp. I. t. 9.*

Ph. crisp. Hedw. et Swartz., *crisp.* et *multicapsulare* (*crisp.* Engl. bot. t. 618., *sphaerocarpon* Abbot. bedf.) Smith., fide Turn., *cuspidatum* Schum. Sæll., fide herb..

In terra pingui. Aestate. 4.

Bene monente *Hedw.* in hac specie lineola operculum distinguens ab ipso sporangio satis conspicua, quamquam deciduum nunquam observatum operculum. Cf. *Hedw.* l. c. f. 15.)

4. *Ph. curvicollum* Ehrh., foliis ovato-lanceolatis, perigonialibus femineis extimis lanceolato-acuminatis; seta incurva; sporangio subpendulo. *Hedw. Stirpp.* I. t. 11. (in Tab. nostra VI. f. 1. sporang.)

Ehrh. Beytr. 4. p. 44.

In aggeribus. Vere. ☉?

Gregatim deget, sporangiis fuscis, numerosissimis, seta incurva e foliis exsertis, laetum praebens aspectum. *Ph. rectum* With. (*curvicollum* Engl. Bot. t. 330.), fide speciminum a Turnero missorum, foliis late ovato-breviter acuminatis, seta longiori, sed non, uti Smith. et Turner perhibent, foliis muticis, seta recta, parumper differt.

5. *Ph. bryoides* Dicks., caule subdiviso; foliis ovato-apiculatis, erectis;

seta elongata, recta; sporangio exserto. *Dicks.* t. 10. f. 3.

Phasc. elongatum Schultz. starg.

In arvis pr. *Hanover*. D. *Lammersdorf*. Cf. *Web.* in *Web.* et *Mohr.* Arch. I. p. 124. (Ipse postea per litt. nos edocuit amici s. *Lammersd.*, non in ericetis hanc speciem provenire); in *duc. Megap. Blandow*, *Schultz.* Vere. 24.

Statura inter affines maxima. „Facies *Gymn. trunc.*, l. *Encal.*” (Grimm.) „*lanceolatae*, sed capsula latior, nunquam dehiscens” *Smith.* *Ph. bryoides* *Schleich.* Cent. 2. n. 4. revera idem est. Pro more suo nomen mutavit *Bridelius* in corruptum illud *Ph. gymnostoid.* loco *gymnostomoid.*

6. *Ph. piliferum* *Schreb.*, caule subsimplici; foliis oblongis, piliferis, erectis; seta incurva; sporangio immerso, subgloboso. *Schreb. de Phasco* t. 1. ff. 6–10.

In muris argillosis, fossis arenoso-lutosis. Vere. 24.

„Folia in hac una hucdum cognita specie piloscano, e ductulorum fasciculo summitatem excedente terminata.” *Hedw.* Tamen haec nervi supra folii paginam prolongatio minime semper exsucca et ita albescens pilus facta est. Setae curvationem nec *Schreberus*, nec post eum auctores hucusque

observasse videntur. Revera tamen adest, quamquam, ita brevi seta, non nisi omnibus demtis perigonalibus foliis sit conspicienda, nec ex ea, quod in *Ph. curvic.* observatur, sporangium e foliis emergere valeat. Hac vero setae curvatione in numerosissimis cum dilectiss. *R. A. Hedwig Lipsiae* lectis *Ph. pilif.* speciminibus jam observata, valde veremur, ut *Ph. curvisetum* Dicks. t. 10. f. 4. a nostra specie vere differat. Ipsi enim Angli stirpem, quam multis allatis ex notis, *Ph. curvicollo* forte magis affinem suspicatus esses, maxime convenientem cum *Ph. cuspid.* pronuntiarunt, et ab eo primum a Dicksono separatam esse perhibuerunt. Genuinum quidem *Ph. curvis.* nondum vidimus, sed sedulo comparatis Schleicheri *Ph. curvis.* Cent. 3. n. 4. speciminibus cum nostris *Ph. pilif.* et cum icone illius Dicksoniana verbisque de eo a Smithio, Turnero, Dicksono prolatis, vix alias hucusque distinctum esse *Ph. curviset.* a *Ph. pilif.* nobis fere persuasum habemus, quam foliorum apiculo non albescente setaque non recta, sed incurva. Cum autem primus character et in nostro musco non adeo constans, alter plane non reperiatur, vix quid restat, ex quo utramque porro distinguere liceat speciem. Sed optima nova nota, seta illa incurva, posthac a *Ph. cuspid. piliferum* erit dignoscendum, ut non valeat, quod ad illum adnotavit amiciss. Turner: „Foliorum apices semper acutissimi,

non raro aristati, fierine ergo potest, ut in *Ph. pilif.* transeat?"

7. *Ph. elatum* Brid., caule subdiviso; foliis oblongis, longius apiculatis, erecto-patentibus; seta brevissima, incurva; sporangio elliptico, nutante.

Bridel. in *Diar. bot. Schrad.* 1800. I. p. 269., *Ph. grandiusculum* Suppl., in *Muscol. sub Ph. pilif.*

„In limosis et inundatis, Gothae, Mart." *Brid.* 24? Maximum sui generis.

8. *Ph. cuspidatum* Schreb., foliis inferioribus ovato-acuminatis, erecto-patentibus, superioribus ovato-oblongo-acuminatis, erectis, conniventibus. *Dillen.* t. 32. f. 11. *Schreb. de Phasco* t. 1. ff. 1-5. *Sturn.* 6. *Fl. dan.* t. 249. fig. infer. dextra.

Ph. acaulon α. L., *cuspidat.* Hedw., Ehrh. Decc., Dicks., Turn., Smith.

β. *maximum*, statura proceriore; caule subdiviso; foliis summis elongatis, non conniventibus.

Ph. maximum Wibel. werthh., *Schreberianum* Dicks., Turn., Smith., excl. synonym. Schreb. pro hac var. Cf. *Web.* in *Web. et Mohr. Arch.* I. p. 123.

In solo lutoso. Vere. 24. — β . pr. Hanov.
Lammersd., Werthheim. Wibel.

Nobis Schreberiana, Ehrhartiana, Hedwigiana
hujus stirpis specimina cum anglicis conferentibus,
nullum dubium, quin vulgaris forma, s. Ph. *acaulon* α . L., etiam Schreberi Ph. *cuspidatum* sit. Ph.
Schreberianum Anglor. apud nos multo rarius var.
 α . vulgarissima. Certo certius uterque muscus
unam constituit speciem.

9. Ph. *muticum* Schreb., foliis
late ovato-brevissime acuminatis, om-
nibus conniventibus. *Dillen.* t. 32. f. 12.
Schreb. de Phasco t. 1. ff. 11 - 14.

Ph. *acaulon* β . L.

In luto, ad aggeres. Vere. ☉?

Tota planta foliis suis arcte imbricatis omnibus-
que conniventibus, ita ut sporangium plane occul-
tent, bulbilli ovati formam exhibet, nec ut Ph.
cuspid. caespitose, sed solitarie vitam deget.

† 10. Ph. *carniolicum* Web. et
Mohr., foliis oblongo-acuminatis, ner-
vo evanescente, inferioribus patenti-
bus, superioribus erectis; sporangio
ovali.

In Carniolia. *Wagner.* (Commun. Flörke.) ☉?

Stirps valde minuta, solitaria, sparsa, foliis sic-
citate crispabilibus.

† 11. Ph. Flörkeanum Web. et Mohr., foliis ovato-acuminatis, nervo excedente, inferioribus patentibus, superioribus erecto-patentibus; sporangio ovato.

Pr. *Jenam*, prout videtur in solo lutoso, detexit am. *Flörke*. ☉?

Stirps cum Ph. *cohaerenti* americano et Ph. *serrato* sui generis minima.

•• foliis serrulatis.

12. Ph. patens Hedw., foliis lanceolatis, uninerviis, inferioribus recurvis, superioribus suberectis. *Hedw. Stirpp.* l. t. 10.

In limosis, udis (pr. *Lips.* Hedw., in duc. *Oldenb.* Trentepohl.) Aestate. 24.

An ab hoc differat Ph. *recurvifolium* Dicks. t. 10. f. 2. ipsi Angli dubii. *Smith.* var. censet, *Turner* speciem distinctam; attamen vix nisi foliis satis conspicue angustioribus interpretes *Dicksoniani* suum muscum differre non possunt, quin fateantur. Hoc Ph. *recurvifol.* Cel. *Bridel.* in *Suppl. germanicis* (speciatim *thuringiacis*) quidem adnumerat quoque speciebus; sed num Anglorum specimina cum suis comparaverit, facile dubitandum; et

tum vix quid certi determinandum. Vexatam itaque stirpem nostris inserere non est quod eligimus. — *Ph. patens* inter species germanicas ab antiquo cognitas forte rarissimum. —

13. *Ph. serratum* Schreb., foliis ovato-lanceolatis, enerviis, erectiusculis. *Schreb. de Phasco* t. 2.

Variat statura majore, stolonibus reptantibus (*Ph. stoloniferum* Dicks. t. 7. f. 2.). Hanc var. se apud *Gotham* legisse nobis olim dixit Cel. Bridel.

Ph. serratum et *Ph. velutinum* (*serratum* Dicks. t. 1. f. 1.. *confervoid.* Brid.) Hoffm.

In terra argillosa. Vere. ☉?

Filis byssoideis, ramosis, articulatis, Hedwigio cotyledonibus (in *Ph. cohaerenti* quoque obviis) haec stirps pone radicem stipata observatur (*Schreb. l. c. p. IX.*, Dicks. l. c.). His filis l. adentibus, l. absentibus, male Hoffmannus et Bridelius speciem in duas distinctas dispescuerunt. — Conveniente ipso Dicksono, Turnerus tandem *Ph. stoloniferum* uti variet. ad Schreberianum muscum reduxit. Folia in hac una totius generis specie absque ullo nervi vestigio. „Caeterum etiam nudo oculo haec species, si aetate provector est, facile ab aliis distinguitur, oculosque colore capsularum intense purpureo allicit.” *Web. Spicil.*

b. stomate instructae.

α. operculo libero.

I. peristomio nullo.

20. *Sphagnum* L.

Receptaculum femineum pedicellatum.

1. *Sph. obtusifolium* Ehrh.; ramulis turgidis; foliis late ovatis, muticis. *Dillen.* t. 32. f. 1. *Schmid. Ic.* t. 58. f. V. *Hedw. Fund.* I. t. 1. f. 1. II. t. 3. f. 9. *Theor.* Ed. 2. t. 14. ff. 1-4, t. 15. ff. 1. 2. *Abhandl.* I. T. 1. f. 7. *Fl. dan.* t. 474.

Ehrh. Decc., palustre α. L., *cymbifolium* Ehrh. *Han. Mag., latifolium* Hedw., *vulgare* Mich. bor. am., *condensatum* Schleich. Cent. 2. n. 5.

Variat omnibus partibus minor, tenerior (*Sph. tenellum* Pers.; cf. Hoffm. Fl. p. 22., Brid. Musc. II. p. 24., male enim in *Emend.* distinctam speciem profert.).

In paludosis, turfosis. Aestate. 24. (Var. *tenella* in *Hercyn.* Pers.)

Omni fere totius terrae plaga densis gregibus provenit. E. Cap. b. *spei* ill. Thunberg reportavit; et vix *Sphh. magellan.* Brid., *cymbifol.* borbon.

Belv. (*patens* Brid.), *oblong.* Belv. (forte idem cum *crassiseto* Brid.), *compact.*, *ericetor.* et *condensat.* Brid. nisi meras hujus varr. censemus. Ex omni enim plaga non solum apud ipsum Cel. Bridel, sed apud plurimos muscologos visa Sphagna omnia ad unam alteramve germanicarum nostrarum specierum referenda nobis videbantur. — „Stirps interdum rubicunda.” Smith.

2. *Sph. squarrosus* Pers., ramulis gracilescens, elongatis; foliis late ovato-acuminatis, acuminibus squarroso-recurvis. *Web. et Mohr. It. suec. t. 2. f. 1. a. b.*

Pers. communicat. cum amicis.

In aquosis, v. c. *Hercyn.*, pr. *Mund. Hanov.*, *Brem.*, *Kil. Hols.*, in duc. *Megap.* Aestate. 24.

Caulis, ut in antecedente saepissime divisus. — Stirps habitu (ex foliorum acuminibus recurvis squarroso), nec non caractere facillime dignoscenda. Nunquam quoque in *Suecia* et *Hercynia* nobis eam legentibus vel levissimus ad ullam aliam hujus generis speciem transitus patefactus est.

3. *Sph. acutifolium* Ehrh., ramulis filiformibus; foliis ovato-lanceolatis, strictis. *Dillen. t. 32. f. 2. A.* *Schmid. Ic. t. 58. f. VI.* male ab *Hoffm.*

et Bridel. II. cc. ad Sph. *obtusifol.* *tennell.*, ab Roth. in Fl. ad Sph. *cuspid.* relata. *Hedw. Fund.* I. t. 3. ff. 13-15.

Ehrh. Decc., *palustre* *β. L.*, *capillifolium* *Ehrh.* *Han. Mag.*, *intermedium* *Hoffm.*, *alpinum* *Rüling.* (*Bruct.*), forte et *Schrk.* (cf. *Brid. Musc.* I. p. 28., in *Diar. bot. Schrad.* 1800. I. p. 270.), *gracile* *Mich. bor. am.*

In ericetis ndis. Aestate. 4.

In hoc et sequenti seta elongata, caulis subsimplex, cum in duobus antecedentibus hic subdivisus, illa fere nulla, l. in Sph. *squarroso* interdum brevius subexserta. Etiam hoc in plurimis et dissitissimis terrae regionibus provenit; ut vix ac ne vix quidem Sph. *pentastichon* *Brid.* s. *recurvum* *Belv.* et *subulatum* *Brid.* distincta putemus.

4. Sph. *cuspidatum* *Ehrh.*, foliis laxis, lanceolato-subulatis. *Dillen.* t. 32. f. 2. B. (in Tab. nostra VI. f. 2. fructus cum receptaculo.)

Ehrh. Decc.

„In aquosis fluitare solet, canibus ad pedalem et amplius longitudinem extensis. Aestate.” *Hoffm.* 4.

Non parum anxii sumus de specifica hujus musci differentia, negata a *Dillenio* *Hedwigioque*, nec,

uti cum iis commorantes comperimus, satis probata Swartzio et Wahlbergio, viris omnibus acutissimis, de his rebus optimi iudicii. Attamen distinctissimam nostram stirpem declararunt Ehrh., Hoffm., Roth., Schrad., Bridel. et nuperrime egregius Fl. britan. auctor, Cel. Smith. Haesitantem nihilominus vidimus amiciss. Turnerum, et sane ipsi haesitamus. Saepe saepius enim in Hercyniae Bructero et in Holsatia nostra ad margines fossarum et fodinarum turfosarum ipsissimum vidimus florens Sph. *acutifolium*, in ipsa aqua, haud pedis spatio ab eo sejunctum Sph. sic dictum *cuspid.* Habitus diversitas foliorumque distincta forma, nec non longior l. brevior seta in utroque ne a locorum natalium dissimilitudine originem ducant, quis nobis testis? Monitos ergo velimus lectores de planta ulteriori dignissima indagatione, nec quidquam temere in tanta rei ambiguitate ex tripode asseramus. Priores tres quidem bene distinctas putamus species, nec possumus e partibus stare amiciss. D. Trevirani jun., qui Bremae omnes observans Sphagni formas, unam eandemque has omnes censeat speciem. Caeterum quae margine undulata observavere Sph. *cuspidati* folia VV. CC. Smith. et Roth., ea videre nobis hucusque non contigit.

21. *Gymnostomum* Schreb. (*Pot-
tia* [*Gymnost.* Hedw. *]) et *Hedwigia*
[*Anictangium* Hedw. **)] Ehrh.)

Receptaculum femineum sessile. *Operculum*
deciduum integrum.

* seta foliis perichaetialibus subae-
quali l. breviori.

† foliis epilosis.

1. *G. aquaticum* Hoffm., caulibus
decumbentibus; foliis e latiori basi
sublineari-lanceolato-acuminatis, ho-
momallis; sporangio elliptico, opercu-
lo incurvo. *Dillen.* t. 43. f. 70. *Hedw.*
Stirpp. III. t. 11. (*Anict.*)

Fontinal. *capillac.* Scop. carn. ?, *Hypnum nigri-
cans* Vill. A.

In rivulis alpinis Germ. austral. Aestate. 24.

Habitu simillima stirps *Trich. fontinaloidi*, ut
caute sit distinguenda. Peristomium non inqui-
renti *Trichostomum* differt magis patenti-ramosiu-
sculum, foliis brevioribus, undique vergentibus, pa-

*) Dioicum.

**) Monoicum.

tentibus, ovato-lanceolatis, sporangio vix exserto, ovato, operculo rectiusculo. Caeterum, monente Brid. in Diar. bot. Schrad. 1800. I. p. 271., *Gymn. aquaticum* „planta” est „dioica, in genere” (Hedwigiano) „monoico, individuis masculis longe magis quam feminea ramosis.”

2. *G. lapponicum* Hedw., caulibus erectis; foliis elongate lanceolatis, siccitate tortilibus; sporangio subturbinato-cyathiformi, sulcato, subexserto. *Hedw. Stirpp.* III. t. 5. A.

Anictang. Hedw. l. c. p. 39. ed. germ. (Hedwigia).

In rupium fissuris. *Hercyn.* Ehrh., Schrad., *Siles.* (miss. ab amiciss. Starkio), *Alpp. Germ. infer.* Schwaegrich. Aestate. 24.

† 3. *G. caespitium* Web. et Mohr., caulibus erectis; foliis lanceolato-subulatis, canaliculatis, siccitate strictis; sporangio cyathiformi, lacvi, immerso.

Anictang. Schwaegrich. in litt. ad amiciss. *Mertens.*

In rupibus alpp. *Styriae.* Schwaegrich. 24.

Minuta stirps, caespitosim crescens.

†† foliis piliferis.

4. *G. Hedwigia* Schrank., foliis subhomomallis, ovato-acuminatis, nerviis, acumine diaphano, serrulato, perichaetialibus femineis ciliatis, ciliis ramosis, integerrimis, diaphanis; sporangio immerso. *Dillen.* t. 32. f. 5. *Hedw. Stirpp.* I. t. 40. (*Anict. ciliatum* [*Hedwigia*]).

Bryum apocarpum B. L., *Fontinalis albicans* Web. patr., *Phascum piliferum* With.!

In saxis. Vere. 24.

Anict. filiforme in rupibus *Carolinae* et *Canadae* lectum a Cel. *Michaux* (bor. am. II. p. 287.), sec. exempla, quae auctor ipse cum amiciss. *Willdenovio* olim communicavit, cum *Europaea* stirpe plane convenire videtur. Minime enim foliorum caulis acumen concolor, sed ut in nostro diaphanum. Folia perichaetialia sporangium caeteraque plane eadem. Sed calyptram, quam non vidimus, sagaciss. auctor „subvillosam” [*paraphysiphoram*] dicit. An lusus naturae? Uterque muscus vix diversus. Synonymum *Withering.* nostrae plantae memorabile. Adduximus optima Cel. *Smithii* fide. *G. Hedwigia* inter enumeratas sui generis germanicas species unicum, quod foliis gaudet nerviis.

† 5. *G. decipiens* Web. et Mohr., foliis oblongis, piliferis, integerrimis; sporangio ovali, subexserto, operculo conico.

G. pulvinat. Schwaegrich. miss.

In saxis pr. *Herbipolin.* Schwaegrich. 24.
(Eundem muscum ad fontem *Vaucluse Galliae* lect. mis. Bridel.)

Caespitosim crescit.

† 6. *G. acaule* Flörk., foliis inferioribus ovatis, superioribus oblongis, omnibus piliferis, integerrimis; sporangio subgloboso, immerso, operculo convexo-rostellato, rostello recto. Tab. nostra VI. ff. 4-8.

Gymn. nanum amiciss. Bernh. mst., quantum ex specim. misso videre nobis licuit, *subsessile*.
Brid. Suppl.

In terra pr. *Jenam.* Flörke, pr. *Erfurt.* Bernh. ☉?

Solitarie deget, sui generis minimum, phascodeum.

7. *G. pulvinatum* Hoffm., foliis inferioribus muticis, superioribus femineis oblongo-ovatis, piliferis, integerrimis; sporangio subgloboso, im-

merso, operculo convexo, mutico.
Hedw. Specc. t. 3.

Hoffm. in Add. ad Fl.

„In rupestribus. (Gött.) [pr. Reinhaus.] „autumno, vere. Bryo *pulvin.*” [*Trich.*] „caespitulis, *apoc.*” [*Grimm.*] „capsulis simile.)” *Hoffm. 24.*

Male olim pro *Trichost. pulvin.* Roth., pro *Grimm. apocarpa* Bridel. habuerunt. Distinctissima cum duabus antecedentibus species, quae vero nunc Göttingae rarissime lecta.

•• seta e foliis perichaetialibus
emersa.

† foliis integerrimis.

8. *G. ovatum* Hedw., foliis obovatis, piliferis. *Hedw. Stirpp. I. t. 6.*

Pottia cavifolia Ehrh.

In muris argillaceis, agris limosis. Vere. ☉?

Sporangium ovale, operculum convexo-rostellatum, rostello incurvo. — Foliorum nervo in pilum canum, longitudine fere folii, desinente, seta breviori, attamen satis superque folia excedente cum speciebus subdivisionis superioris congruit; immo foliis perichaetialibus femineis, pilo serrulatis, quibusdam everviis affinitatem habet, cum *G. Hedwigia*. — A quibusdam veteribus Floristis commix-

tum cum insequente. Sed ne confundas cum Grimm. *lanceolata* cave, quacum, uti cum aliis consortio gaudet speciebus. Huj. l. ex descript. et cit. Vaill. (t. 26. f. 2.) esse videtur Gymn. *pulvinatum* An. de Cienc. nat. No. 14. p. 171.

9. *G. truncatum* Hedw., foliis oblongis, apiculatis, patentibus, planiusculis; sporangii ore amplo, operculo oblique rostrato. *Hedw. Stirpp.* I. t. 5. *Sturm.* 2.

Bryum truncatulum L.

Variat caule per innovationem diviso.

α . *majus*, caespitosum, sporangio cyathiformi *Dillen.* t. 45. f. 7. A-E. („capsulis operculo abscedente longioribus et angustioribus [ovatis]”). *Turn. hib.* t. 1. ff. a-c. (Gymn. *intermedium*).

Pottia eustoma α . *major*; pyxidio ovali Ehrh. *Beytr.* I. p. 188.

„In sepibus.” Ehrh. *Vere.* 24.

β . *minus*, solitarium, sporangio turbinato. *Dillen.* I. c. F-K. („capsulis operculo abscedente brevioribus et crassioribus, quasi operculum dimidiam capsulae partem secum duxisset”). *Turn.* I. c. ff. d-f. (Gymn. *truncatulum*).

Pottia eustoma β . *minor*; pyxidio subgloboso Ehrh. I. c.

„In agris.” Ehrh. Vere. 24.

Jam ab antiquo in *Raji Syn.* distinctos muscos *Dillen.* l. c. A - E. (*Raj.* p. 93. n. 8.), ab Ehrhar-
to nostro pro more optime, singulo fere verbo,
delineatos, amiciss. quidem *Turner*, et post eum
Smith nuperrime denuo species diversas protule-
runt; attamen scrupulosissimus quidem *Turn.* dif-
fidentissime ipse se ita egisse fatetur. Muscos,
nobis ipsis saepe saepius obvios, certe distinguere
licet in loco natali, sed num uti varietates, l. pro-
prias species, vix dicemus. Quibus rebus ita se
habentibus, characteribusque a minoris momenti
diversis notis depromtis, dum ipsi Angli, l. alii,
iteratis specificam differentiam extra dubitationem
ponant observationibus, *Dillenii*, *Hedwigii*, *Ehr-*
harti auctoritatibus obtemperare, ambosque mus-
cos, varietatum lege, conjungere nobis, specierum
forte minus justo cupidis, liceat velimus. Caete-
rum amiciss. *Turner* e *Dillenii* verbis figurisque
var. nostram α . minoris, illam β . majoris exhi-
bentibus staturae, errore captus est, ut G. suo
interm. *Dillenii* adscriberet figuras F - K.; suae
truncatulae speciei figg. A - E. *Smithius*, quae e
Dillenii particularibus descriptionibus, a nobis re-
expres is, jam esset restituenda res, eam multo
certius adhuc ex herb. *Dillen.* restituit, optimeque
G. *intermedium* „magnitudine variare” (nos majus
hoc, minus illud solummodo diximus ob synonyma

Ehrhartiana) admonuit. Sed minus bene idem accuratissimus auctor Hedwigii *Gymn. truncatum* ad nostram β ., Ehrharti vero Decc. (n. 14.) solummodo ad nostram α . allegasse videtur. E partibus stare ipsi debemus Turneri, qui Hedwigianas figuras, demta 12ma, *G. intermedi* esse censet. Vix enim nobis dubium, Hedwigii Ehrhartique muscos plane esse eosdem. — Caeterum a *G. trunc.* nullo modo specie discernere possumus *G. rufescens* Schultz. starg. Solummodo pumila est stirps, cujus sane folia, sporangium et operculum plane eadem vidimus in auct. specim. Locus quoque natalis convenit.

10. *G. curvirostrum* Hedw., caule ramoso; foliis subulatis, canaliculatis, muticis, patentiusculis; sporangio aequali, cyathiformi, operculi rostello longo, incurvo. *Dillen.* t. 47. f. 36. (*Bryum aestivum* L. verum) fide *Smith.* ex *herb. Dillen. Hedw. Stirpp.* II. t. 24. *Sturm.* 6.

Bryum verticillatum Dicks. H. Sicc. (fide *Smith.*), *stelligerum* ej. Fasc. (*Gymn. Brid.*, Schrad. in *Diar.* 1799. 2. p. 55., *Smith.*)

In rup. gypsaceis, v. c. *Hercyn.*, *alpp. Salisbb.* (Flörke) et *Styriacor.* (Schwaegrich.) Vere. 24.

Pace virorum acutissimorum, qui ex observatione in natali loco contrarium statuere, vix inter *G. G. curvirostrum* et *stellig.* tanti momenti discrimen hucusque invenire potuimus, ut ea separatas species proponere valuerimus. *Swartzium* itaque secuti sumus, qui utramque stirpem in *Diar. bot. Schrad. 1800. 2. p. 171.* plane eandem declaravit. Non distinctum nunc quoque putamus muscum suecicum, ad *m. Omberg* olim lectum, cujus mentionem injecimus in *It. Snec. p. 95.* Sed minime hujus loci *Bryum fasciculatum* Dicks., quod *Grimmia* est, a *Gr. verticillata* Anglor. (*fragili* Web. in Web. et Mohr. *Arch. I. p. 129. t. 4. f. 4.* [Weiss. *gypsacea* Schleich. *Cent. 2. n. 11.!*] ? [asseverante *R. A. Hedw.* in litt.], *Br. Dillen. t. 47. f. 35., verticillato* L.) distincta, sec. *Turn.* in praef. ad *Musc. hib. p. VIII.* (cf. *Swartz* in *Diar. bot. Schrad. 1800. 2. p. 172.*). Et minime denique nostra planta peristomio gaudet dentato, uti amiciss. *Turner* statuere inductus est, qui eandem ipsam eam prouuntiavit cum ipsissima *Grimm. verticillata* dicta. *Schwaegrichenii* specimina hoc comprobasse dicuntur; sed nobis, sexcenta musci omni aetate et omni sporangii ratione constituta specimina perquirentibus, vix ulla res certior, quam specifica, immo et generica *Gr. verticillatae* et nostri *Gymnostomi* differentia.

11. *G. microstomum* Hedw., caule simplicissimo; foliis e latiori basi lanceolatis, planiusculis, muticis, siccitate crispabilibus; sporangio obliquo, ore contracto, operculo conico-rostellato, rostello incurvo. *Hedw. Stirpp.* III. t. 3o. B. *Specc.* t. 3. ff. 8-11. (*G. rutilans.*)

In arenosis, sabulosis, rupium fissuris. Vere. 24.

Nec vel varietatis lege Hedwigii *GG. microst.* et *rutil.* distincta putare valemus. — Quo commotus monoicis speciebus *Roth* nostram adjunxit, plane nescimus.

12. *G. trichodes* Web. fil., caule subnullo; foliis e latiori basi subulato-setaceis, siccitate strictis; sporangio aequali, ore amplo, operculo convexo-rostellato, rostello obliquo *Web. et Mohr. Arch.* I. t. 4. f. 1. a-d.

In granitide irrorato ad *Rehberger Graben Hercyn.* Omni anni tempore. — In *Bohemia.* 24?

Ne cum minuta quadam *Grimm.* pusillam hanc speciem confundas cave. Sec. criticum in *N. Leipz. Lit. Zeit.* 1804. St. 118., qui alterum suppeditavit locum natalem, planta monoica? Analysin partium genitalium tradidit, et seta quoque tortili nostrum

ab insequenti specie differre bene adnotavit. Amiciss. R. A. Hedwig, se nostram stirpem in Helvetia lectam, sub nomine *Gymn. Davalliani* a Cel. Smith acceptam possidere, per litt. nos edocuit.

13. *G. tenue* Schrad., foliis oblongis, concavis, obtusiusculis; sporangio aequali, elliptico, ore contractiusculo, operculo conico. *Hedw. Specc. t. 4. ff. 1-4.*

Schrad. Samml. I. n. 31.

In saxis arenariis pr. *Goetting.* olim legit Cel. Schrader. Nunc in unico hucusque per German. noto loco natali *) plane deperditum. 24?

Caulis simplicissimus, fere nullus, folia apice recurva, fere linguaeformia. Arte solventes operculum, annulum s. fimbriam, cujus nec Hedw. nec Schrad. mentionem fecerunt, observavimus atque in originalibus exemplis ac in iis a *Schleichero* pr. *Lausann.* lectis (Crr. *Helvv. Cent. 4. n. 1.*) quae omnino hujus loci esse videntur, licet statura pau-

*) Se olim hoc idem circa *Hafniam* legisse putavit Cel. *Schumacher*, specimenque benevole dedit. In *Flora Saell.* enumeratum non vidimus; bene. In stirpe enim *Hafniensi* caulem *innovatione* divisum, folia acuminata, stricta reperimus. Muscus caeterum nobis dubius.

lo altior, folia laetius viridia, paulisper longiora, apice vix recurva. Caetera omnia conveniunt.

†† foliis serrulatis.

14. *G. Heimii* Hedw., foliis oblongo-acuminatis, apice serrulatis; sporangio oblongo, ore subcontracto, operculo incurve rostrato. *Hedw. Stirpp. I. t. 30.*

In arenosis. Vere. 24?

Cum *Gymn. truncato* vix incautius agens nostrum confundes. Simillimum vero ei, in German. hucusque tamen vix lectum *), *G. obtus.* H., licet hoc recentiores pra primis a *G. trunc.* distinguendum exhibuerunt. Sic ex *Turn.* in *musc. lib.* (cf. figuras t. I. sub g-i adjectas) „statura altiore, foliis oblongo-lanceolatis, concavis, erectis (nec ovato-lanceolatis, planis, patentibus, apiculatis), capss. apice constrictis (nec ore dilatatis l. subae-

*) In *Diar. bot. Schrad. 1800. II. p. 172.* Cel. Swartz, se *G. obtus.* in *Siles.* lectum, a Willdenovio accepisse quidem perhibet; nec non Bridelius stirpem a *Selig.* inventum esse in *Suppl.* refert. Cum vero ab amicis Silesiacis praeter *G. fascicul.* nil ipsi receperimus, alteram speciem uti German. indigenam enumerare hucusque haesitavimus.

qualibus), operculi nostro recto (nec obliquo), breviori, hoc *G. obtusum*" (in *Suec.* nunc quoque lectum ex epp. Swartz.) „a *GG. trunc.* et *interm.* dignoscitur." Addit Turner: „folia, quae Dicksonus denticulata dixit" (cf. Hedw. Specc. p. 35.) „in exempll. nostris sunt integerrima," et „a *Gymn. Heimii*, quocum *Bridelii* conjungendum putat, foliorum colore et forma toto caelo differt." Nobis ipse Turner nec non Swartz *G. obtus.* miserunt, nec possumus, quin ex hisce specim. speciem omnino proximam *G. Heimii* pronuntiemus. Revera enim etiam in *G. obtuso* folia apice serrulata vidimus formaque longe distantia a *G. trunc.*, bene autem convenientia cum *G. Heim.* Num ex operculo plus minusve in utraque stirpe recte l. incurve rostrato vera differentia enucleanda? — *Gymn. obtus.* Schum. Sæll. demum minime verum, quippe cui folia longius apiculata, operculi rostrum longum, incurvum, ex *herb. Schum.*

15. *G. pyriforme* Willd., foliis ovato-acuminatis, serrulatis; sporangio obovato-subpyriformi, erecto, operculo convexo-rostrato, rostro recto. *Dillen.* t. 44. f. 6.

Willd. berol., *Bryum* L.

In pratis humidis, ad latera fossarum, caespitosim. Vere. 24.

Folia minime integerrima, uti Rothius perhibet in sua Flora, sed omnino serrulata, bene conveniente Cel. Smith.

16. *G. fasciculare* Hedw., foliis oblongo-acuminatis, serratis; sporangio pyriformi, suberecto, operculo convexo-mammillato. *Hedw. Spec.* t. 4. ff. 5 - 9.

Bryum Dicks. (*Gymn.* Turn. et Smith.)?

Ad latera viarum, fossarum, sparsum, solitarium. Vere. 2.

Certo certius in errore sunt Angli, *G. fasciculare* Hedw. a vulgari *pyriformi* non diversum putantes. Stirpes, si quae ullae, distinctissimae! Forte vero Anglorum *Gymn.* 1. *Br. fascicul.* distincti quid? Certe *Br. Aegypti* l. *Hyssopus Salomonis* Hasselq., a Smithio ex herb. Linn. ad suum *G. fascicul.* citatum, minime cum nostro quadrat. Folia Hasselquistiano musco vix unquam serrulata, sed plane integerrima nobis visa. Cf. It. Suec. p. 147. — *G. turbinatum* Mich. bor. am. II. p. 286., quod foliis et operculo *G. fascic.* plane convenit, statura majori, sporangio exacte turbinato differre videtur.

Gymn. aestivum Hedw. neque *Bryum aestivum* L., neque *Dillen.* t. 47. f. 36. (*Gymn. curviro-*

strum) esse, in Fl. brit. Cel. *Smith* nos edocuit, sub nomine *Gymn. luteoli* Hedwigianam stirpem nunc enumerans. Ab illa quoque alienissimum *Br. aestivum* Schreb. lips., quod *Dier. varii* var. habemus; v. infra. *Bryum aestivum* Weiss. goett., sec. exemplaria in loco a Cl. auctore designato pone *Adelipsen* collecta (cf. Roth. Fl. Ill. 1. p. 253.). *Bryum strictum* Hoffm. (Dill. t. 49. f. 52.) absque dubio putandum. Denique quoque Cel. *Host* in Syn. *Gymn. aestivum* iniecit in *alpp. judenburgg.* turfosis lectum. Hujus quidem steriles habemus surculos, quos vero genuini *G. aestivi* Hedw. s. *G. luteoli* Anglor. sec. exempla angl., vix censere possumus. Hedwigianus muscus cum omnibus itaque orbatu sit synonymis, Hostianus autem nobis dubius, *G. luteolum* *Smith.* inter germanicas enumerare species eo minus nobis licitum putavimus, cum nec ita bona hujus musci in Herb. possideamus specimina, quibus de generico ejusdem character ex autopsia prorsus certi quid colligere valuerimus. De reliquo eadem species *Gymn. compactum* *Schleich. Cent. 2. n. 7.*, cujus quidem in omnibus missis speciminibus nec ultimum peristomii reperimus vestigium, sed et operculum nullum.

Gymnost. tetragonum *Brid. Suppl. p. 270.* plane nos fugit. Habet vero de eo insequentia auctor: „*G.*, trunco brevissimo, simplicissimo, foliis

oblongo-lanceolatis carinatis perichaetialibus longissime apiculatis, calyptra superne pyramidato-tetragona inferne angustata limbo circulari, capsulae ovatae operculo conico obtuso. — Prope Gotham in septem Stagnorum vicinia in arvis Mense Octobri 1805 primus legi; inde amicus *Plaubel* in tota suburbica regione abunde reperit. Autumno capsulae juniores nondum decalyptratae. Vere procul dubio maturae evacuantur. 24. — Radices longae, fibrosae subsimplices. Truncus omnium minimus, simplicissimus. Folia conferta 6-10 oblongo-lanceolata carinata, ductulorum fasciculo valido rubescente in apiculum plus minus longum exeunte instructa, exteriora minora breviora brevius cuspidata, interiora perichaetialia terminalia longissime apiculata, omnia e fusco triste viridia. Pedunculus terminalis, solitarius, erectus, linearis, bilinearis, rarius longior, junior pallidus, inde rubellus, imo saturate coloratum vidi. Calyptra erecta alba superne exacte pyramidato-tetragona apiculo fuscello terminata, inferne angustata limbo exacte circulari, quatuor lineolis nigris angulorum continuationibus exarata, albo-pellucida. Capsula, immaturam tantum vidi, ovata. Operculum conicum obtusum. — Species elegantissima, calyptra structura singulari ab omnibus muscis recedens, certe autem ad hocce genus pertinens e *Plaubelii* observationibus." — Nonne calyptra eadem, quae

in juniore *Funaria* et in *Gymn. pyrif.*, fascicul.
et aliis obvia?

22. *Schistostega* Mohr. Obs.
p. 26.

Receptaculum femineum sessile. *Operculum* ab
apice fissum in lacinias revolvendo-aufuges.

1. *Sch. osmundacea* Web. et
Mohr. *Hedw. Stirpp.* I. t. 29. (*Gym-*
nost. pennatum) (in Tab. nostra VI.
f. 9. *operculum*).

Mnium Dicks., *Gymn.* Hoffm., *Dicksonia pusil-*
la Ehrh. Decc.

In viis cavis region. montos. *Hercyn.*, *M. pinif.*
Francon. (Funk), *Siles.* Majo. Junio. ♂.

Caules fertiles foliis lanceolatis, frondes steriles
pinnatifidae, laciniiis in his, foliis in illis enervibus.
Planta dioica.

II. peristomio effigurato.

1. simplici.

23. *Tetraphis* Hedw.

Dentes 4, integri, liberi, aequidistantes.

1. *T. pellucida* Hedw., foliis ovato-lanceolatis, laxis; sporangio subcylindrico; operculo conico. *Dillen.* t. 31. f. 2. *Schmid. Ic.* t. 3. *Hedw. Fund.* II. t. 7. f. 32. (sporang.) *Specc.* t. 7. f. 1. a-f. *Sturm.* 2. (in Tab. nostra VII. f. 1. peristom.)

Mnium L., Br. *diaphanum* Web. patr., Georgia
Mnemosynum Ehrh..

In umbrosis, ad radd. arbor. Vere. 24.

Caulis simplex, nisi de basi innovetur. „Folia 3faria” (Ehrh.), inferiora ovata, „intima perigonialia feminea fere linearia” (Hedw.), omnia uninervia, nervo valido excedente, integerrima. Setae rarius gemellae (Schmid. l. c. ff. 7. 8. et 8*). Calyptra mitraeformis, carinata, basi laciniata. Planta plerumque dioica, masculis capitaliformibus. „Truncus varius habitu et functione; nimirum terminatus 1) glomerulo pulverulento in pe-

stunculo, maximam partem aphylo *). 2) similifere e corpusculis pedicellatis filisque succulentis brevibus, exilibus, foliolis rotundatis cincto, incrementibus subinde in 3) cyathos Halleri sustentatos pedunculis foliosis. 4) flore mere masculo, capitato, fovente spermatocystidia 4-6 filaque succulenta, vel etiam hermaphrodito. 5) flore femineo, demum frugifero. 6) huic similis, genitalibus femineis instructus, simulque masculos flores aut cyathos eferens. Iste praeprimis Januario aut Febr. reperiendus." (Hedw.) Verus flos masculus, nimirum capitatus, praeter egregium Hedwigium in hunc usque diem omnes fugiisse videtur, et eximios, botanicos. Masculos enim omnes, quot versavimus, stirpi disciformes adscribunt, et ita cya-

*) Hunc glomerulum egregie optimus *Schmidelius* hisce exponit atque dilucidat: „non raro adeo copiosus granulorum, quae cyathis continentur, proventus existit, ut ultra limites calicis propullulent et externam quoque illius faciem involvendo abscondant: quod tunc potissimum evenire consuevit, si calix ignobilior multitudinem non capit, l. si grana ipsa excuti incipiant; dimittantur enim successu temporis sponte ac per ambientia loca sparguntur. Id tempus eamque conditionem ante oculos habuisse videtur *Dillenius*, quando de calicibus silet, de capitulis vero pulverulentis loquitur et figuras concinnat." Dictus glomerulus itaque a cyathis Halleri non vere differt.

thos Hallerianos cum veris maribus ut confuderint credibile est. Bene vero jam in *Fund. hist. nat. musc.* II. p. 87. ambos distinxit Hedwig. Et quomodo Cel. *Smith*, qui Hedwigii analysin in *Spec. Musc.* traditam cognovit, et de „floribus quandoque hermaphroditicis” secundum eam verba fecit, denuo inciderit in erroneam verustiorum ideam, dicens „masculus in caule elatiori, teneriori, disciformis, bracteis late ovatis cinctus,” vix ipsi capimus. Ex his vero falsis masculis, s. cyathis Halleri, si eam acquirant formam, qualem *Dillenius* reddidit (cf. not. anteced.), *Tetraphidis* surculi, iis terminati, masculinis primo et fugitivo intuitu similes evadunt Hypni *androgyni*, accuratius indaganti toto coelo diversissimis, nempe genuinis maribus pedicellatis. In H. *androg.* quoque folia exacte lanceolata, apice serrulata, nervo sub apicem evanescente. — In Am. bor. stirpem observavit Cel. *Michaux*, nec muscus pensylvanicus, quem apud *Willdenovium* vidimus, diversus nobis videbatur. Cum 6 dentt. ludentem vidit *Bridel*.

2. *T. ovata* Funck., foliis ovatis, concavis, imbricatis; sporangio ovato; operculo conico-acuminato. *Hedw. fil. Obs.* I. t. 1. (*T. rigida*). *Spreng. Einl.* t. 6. f. 52. *Sturm.* 6.

Funck in *Hoppe Taschenb.* 1802., Br. *Brownian*.

Dicks. Fasc. IV., fide Turn. in Ann. of Bot. II. p. 197., et collatis a nobis ipsis specim.

In granit. nudo, in summo *m. pinif. Francon.* cacum. *Funck. Gött.*, pr. Reinhausen. *Schrader* (ante multos abhinc annos). 2?

Caulis exiguus, simplicissimus. Folia quaedam nervo tenero, paucissimis vasis longitudinalibus in fasciculum medio collectis, instructa, alia enervia, minime, uti habet Hedwigius, omnia nervo carentia, ita ut *Sturmi* figurae D. justissimae dicendae, caeterum apice interdum suberoso-denticulata. Genitalia mascula hucusque non inventa, procul dubio in distincta planta vigentia. Halleri cyathis, quod scimus, nostra destituta. Sed dentes peristomii, uti in vulgari specie, quod dicunt, pyramidati; nec calyptra, qualem *Sturmius* delineavit, dimidiata est, sed ei in *pellucida* stirpe similis, scilicet mitraeformis longitudinaliter carinata, basi fissa in lacinias 8. E partibus fructus itaque novus hic muscus ab altero ab antiquo noto minime genere discrepat.

24. *Splachnum* L. *)

Dentes 8, geminati. *Calyptra* mitraeformis laevis.
(Apophysis insignis, colorata.)

* foliis serrulatis.

1. *Spl. angustum* Sw., foliis anguste spathulato-acuminatis, perichaetialibus setam adaequantibus, exceptis infimis, omnibus serrulatis.

Hedw. Stirpp. II. t. 12.

Linn. fil. et Swartz. meth. musc.

In *Silesia*. Ludw. Aestate. 24.

Unciale, biunciale, setis brevissimis statim diagnoscendum. Caeterum apophysis obconica, sporangium truncato-conicum, l. subcylindraceum, angustius illa, ut in speciebus nostris 2. 3. 8. 9. *Spl. setaceum* Mich. bor. am. vix ac ne vix quidem ex descript. differre videtur **). Pro dissimilimo *Spl. brewer.* H. nostrum ded. *Schleicher* in Cent. IV. n. 3.

*) Species omnes nostrae, nec minus exterae, nervo singulo gaudent, qui vix in *Spl. Frölich.* et *Spl. lingul.* D. non totam folii paginam percurrit

**) Quo sese habeat modo ad hocce *Splachn. caulescens* Dicks. in *A. S. L.* III. p. 239. t. 20.

2. *Spl. serratum* Hedw., foliis spathulato-acuminatis; seta longiuscula; apophysi obconica; columella sporangio brevior? *Hedw. Specc.* t. 8. ff. 1-3.

Splachn. helveticum Schleich. Cent. 2. n. 9.

In subalpin. *Austr.* (*Schneeberg*, Fröl.), Schwägr., *Siles.*, Ludw. Aestate. 24.

Ab hoc distinguendum *Spl. magellanicum* Brid., differens statura duplo altiore, setis saepe geminis, ternis ex uno perichaetio, duplo altioribus, praecipuis vero foliis lanceolatis.

3. *Spl. tenue* Dicks., foliis obovato-acuminatis; seta longiuscula; apophysi obconica; columella exserta. *Dicks.* t. 4. f. 2. *Web.* in *Web. et Mohr. Archiv.* t. 4. f. 3. a-d. (in Tab. nostra VII. ff. 2. 3. perist. dimid. et cal.)

f. 2. (*Phasc. Linn.*, *Dill.* t. 85. f. 15.), pessime a Dicksono certe delineatum, dicere nequimus. Ex statura setaque foliis perichaetialibus aequae breviori convenire videtur. Sed folia ferè setacea, incurva, nec serrulata, Dicksonus exhibet. De ambigua stirpe autoptae microscopici decernant.

Splachn. ligulatum Hoffm. Fl., excl. synonym.
Spl. Frölich. Hedw., *attenuatum* Brid., *ovatum*,
Schleich. Cat. plantt. helvv. (et ita absque fere ullo
dubio *flagellare* Brid. Suppl., descr. quadrante, nec
Ludw. quidquam praeter *Spl. tenue*, sub quo *Siles.*
Bridel. non allegat, mittente), *tenue* ejusd. Cent.
2. n. 8.

In *Bruct. min. Pers.*, *Siles. Ludw. Jun.* —
Aug. 24.

A *Spl. serrato* non nisi foliis latioribus, tamen
sec. *Web.* l. c. etiam columella, multum differt, nec
sec. *Wahlenberg*, qui et hoc in *Wernland.* legit,
specie. Tamen constans nobis hucusque videba-
tur. Exempla a *Ludwigio* data in muscc. exsicc.
Cent. 1. singularis quodammodo faciei; tamen ge-
nuina. Sunt haec procul dubio *Spl. flagell.* Brid.
Caeterum specimm. a *Dicksono* cum nostris com-
paravimus.

4. *Spl. ampullaceum* L., foliis
spathulato-acuminatis, exceptis infi-
mis, serrulatis; seta longa; apophysi
obampullaeformi, pellucida, purpura-
scente. *Dill.* t. 44. f. 3. *Hedw. Stirpp.*
II. t. 14. *Dicks.* t. 10. f. 11. (*Spl.*
Turnerianum, certo certius non nisi
var., convenientibus quoque VV. Cell.
Swartz. et *Turn.*)

Splachn. longisetum Schrk. (*bavaric.* Brid.)?
Certe descriptio convenit, et pr. *Hal.* lecta exempla
(v. Schrad. Journ. 1800. I. p. 288.), nobis com-
municata, omnino hujus loci sunt!

In turfosis; hinc inde per totam German.
Aestate. 24.

** foliis integerrimis.

5. *Spl. vasculosum* L., foliis
subrhombicis, muticis; seta longa; apo-
physi subglobosa, colorata. *Hedw.*
Stirpp. II. t. 15.

In paludosis *Lerchenfeld* infra *Bruct.* Ehrh., in
Austr. Host. Syn. (nondum specimina hujus Ho-
stiani vidimus). Aestate. 24.

Cum *Spl. rugoso*, *angustato* et *urceolato* Ger-
manicorum forte rarissimum; et, Sueciam si exci-
pias, vix quoque hucusque extra German. lectum.
Nervus non, uti vult Hedwig, infra apicem eva-
nidus.

6. *Spl. sphaericum* Sw., foliis
spathulato-acuminatis; seta longa;
apophysi globosa, viridi. *Hedw.* *Stirpp.*
II. t. 16.

Linn. fil. et *Swartz.* meth. musc.

In *Hercynia* Ehrh. Aestate. 24.

β. gracile, statura, seta duplo brevior. *Dill.*
t. 44. f. 4., fide Turn. (alias ad *Spl. ovatum* Dicks,
citata). *Dicks.* t. 10. f. 5. (*Spl. gracile*.)

Splachn. sphaeric. Schumacher, Sæll.

Copiosius in German. subalp., *Bruct.* (D. Lam-
mersd.), *Carniol. Styr.* (Schwaegr.), *Siles.* (Starke.
Ludw.). Aestate. 24.

Essentialibus omnibus cum var. α . convenit,
Turnerumque et, ni fallimur, etiam Wahlenberg.
convenientes habemus de identitate specifica. Fo-
lia eadem ac in *Spl. ovato*, nec, quod habet Tur-
ner, „obsolete serrata.”

7. *Spl. rugosum* Dicks., foliis
obovato-breviter acuminatis; seta per-
quam brevi; apophysi globosa. *Dicks.*
t. 10. f. 7.

In duc. oldenb. turf. semel paucissima speci-
mina ante 20 jam annos b. Trentepohl legit.
Aestate. 24.

Spl. ovato Dicks., quod quasi medium hoc inter
et *Spl. gracile*, perquam certe affine, suadente
Turnero vix specie distinguendum. Differre nobis
videtur foliis non spathulato-, sed obovato- et bre-
vius (quod jam recte Smith adnotaverat, non tam
acuminata, sed simpliciter acuta hujus dicens fo-
lia) acuminatis, seta duplo breviori; apophysi glo-
bosa, nec obconica; habitu. Ita Dicksonum Smi-

thiumque secuti sumus, non tamen vel hoc ineptum censentes, ut forte ambae species, *Spl. ovato* et *Spl. rugos.*, pygmaeae essent *Spl. gracilis* formae. Bene enim sane monet Turner: „*Splachnorum* species fere singulae in diversis aetatis gradibus tantum immutantur, ut, ne in errorem inducatur, iterum atque iterum praemonendus est tyro.” — *Spl. pusillum* Pal. de Beauv., cujus patria ignoratur, ex phrasi, nimium brevi, nostro l. *Spl. ovato* proximum accedere videtur.

8. *Spl. urceolatum* Hedw., foliis lanceolato - obovato - acuminatis; seta longiuscula; apophysi obconica. *Hedw. Stirpp.* II. t. 13.

Spl. bryoides Zoega island.

Specimina ab amm. Flörke et Willden. habemus, qui specialiozem locum natalem non suppeditarunt. Aestate. 24.

Nisi sagacissimorum virorum auctoritati obtemperantes, cum in loco suo natali ambos stirpes nondum legerimus, hoc (cujus originalia groenlandica, uti ipse Hedwig., et nos ab Ill. de Schreber accepimus exempla, plurima praeterea alia in *Lappon.* a sagaciss. Wahlenberg collecta) a proxime insequente sejungimus. Foliis supra medium parumper dilatatis unice differre videtur, et itaque tali fere sese habere modo ad *Spl. mnioide.*, quali

tenue ad serrat., ovat. ad rugos. Nervus in utraque planta et acumen folii ad finem usque percurrit, nec in *Spl. mnioidi*, uti Hedwigius voluisse videtur, sub hocce acumen evanescit.

β. minus, seta duplo minore.

In alpp. Germ. infer. Schwaegr., qui pro *Spl. urceolato* benigne misit. Aestate. 24.

Hujus praeprimis habitus diversa nobis persuadet *Spl. urceol.* et *mnioid.* Distinctam olim speciem in colloquiis *Swartz* nobis suspicabatur; sed essentialia, foliorum formam, omnibus numeris convenientia observamus; nec species *Splachnorum*, forte justo nimis jam numerosas, dubiis adaugere cupimus.

9. *Spl. mnioides Sw.*, foliis lanceolato-longe acuminatis; seta longiuscula; apophysi obconica. *Hedw. Stirpp. II. t. 11.*

Linn. fil et Swartz. meth. musc.

In subalp *Siles* Krug, Starke, Ludw. — *Austr.* Host, al. Aestate. 24.

Splachn. piliferum Roth. Fl., excl. Synon. *Spl. urceol.* Hedw., a rev. Trentepohl lectum in *duc. oldenb.* nullis essentialibus ab hoc nobis recedere videtur, et vix nisi caulibus elongatioribus differt; cf. *Web* in *Web.* et *Mohr Arch.* p. 127. Male cum *Spl. urceol.* denuo Bridel. conjungit in *Suppl.*

Phasc. pedunculatum, quod ab Hudsono Linnéani assumserunt, ad hoc olim relatum, a Smithio in Fl. brit. Spl. ovato Dicks. adscribitur una cum *Dillen.* t. 44. f. 4. Cum vero hoc ultimum Turnerus Spl. grac. restituerit, forte et illud huc transferendum, scil. verosimiliter pendens a Dilleniano synonymo. Aequè Fl. dan. t. 192. a nostro Smith removit et transtulit ad Spl. urceolatum. — Denique nostro simillimum Spl. brewerianum Hedw. (*fastigiatum* Anglor. et Sw., *Dill.* t. 44. f. 5.), vix extra Angl. et Suec. hucdum lectum, unice, quantum videmus ex anglicis speciminibus, foliis superiore parte margine inflexis praeter staturam differens, nec, quod Hedwigius voluit, nervo infra apicem evanido, sed omnino acumen percurrente, instructum.

10. Spl. Frölichianum Hedw., foliis ovatis, apice rotundatis, nervo vix infra apicem evanido; seta longiuscula; sporangio obliquo; apophysi minus evidentiori, angustiori. *Hedw. Stirpp.* III. t. 40. *Dicks.* t. 4. f. 6. (*Bryum reticulatum*, *Splachn.* Smith. Fl., praeter necessitatem, uti videtur *Smithio* de identitate dubitante.)

Splachn. punctatum Frölich. prius in mspto. (ex herb. Schreb.), *reticulatum* Sw. Suec, fide

herb. Swartz. et ipso comparante cum nobis sua ac Hedwigiana specimina concedente! *Bryum Griffithianum* Dicks. t. 10. f. 10. (*Gymn. Smith. Fl.*)? — in litt. enim haecce tradidit amiciss. Swartz: „*Gymn. Griffith.* ist gewiss kein *Gymnostomum*, aber, ohne Zweifel, das *Spl. Frölich. H.*, obschon Smith es davon trennen will.“ —

„Alpestr. in fiss. rup. tyrol., carinth., Styr. pr. Neomontum *auf der Schneekuppe.* Primus invenit Frölich.“ *Hedw.* Dein a Schwaegr. lectum (nec non a Schleichero in *Helvet.* — Cent. 3. n. 7. —). Sero aestate. 24.

Claudat agmen species a caeterarum habitu quodammodo recedens, foliis quoque quam maxime insignis, ut vix alia ei similis esse videatur, nisi *Spl. lingulatum* Dicks. t. 10. f. 6., quod ne confundas cave cum *Spl. ligulato* Hoffm.

Nobis prorsus dubium *Splachn. austriacum* Brid. in *Diat. Schrad.* 1800. l. p. 288. An forte *Splachn. sphaericum* β . gracile? Quae ab eo auctor profert, l. prorsus nil characteristici continent (uti dicta de sporangio, apophysi et operculo, quorum primum vix in ulla specie, praeter *Frölich.*, revera apophysi amplius, ultimum in omnibus idem), l. talia sunt, quae ambigere faciunt et seducunt.

Nec stirpem videre nobis contigit. Omissa quoque a Bridel, in Suppl.

Aequae nos fugit Spl. *refractum* Brid. Suppl., in alpp. austr. lect. a *Schwaegr.* Num Spl. *serrati* l. *tenuis* var., foliorum serraturis praetervisis?

25. *Encalypta* Schreb.

Dentes 16, integri, liberi, aequidistantes. *Calyptra* campanulata (laxa, sporangium totum obvelans).

1. *E. vulgaris* Hedw., foliis spatulato-acuminatis; sporangio laevi; calyptra ore amplo, sublacero. *Dillen.* t. 45. f. 8. *Hedw. Stirpp.* I. t. 18. *Sturm.* 3. (folii fig. mala.) (in Tab. nostra VII. f. 4. sporang. c. cal.).

Bryum extincitorium x. L., *Encal.* Sw.

In terra, muris. Vere. 24.

Caulis in hac brevissimus, simpliciusculus. Statura sui generis minima. Monente Hedwigio dentes peristomii cum operculo et calyptra plerumque aufuges, sporangii os nudum relinquentes. Calyptrae os integerrimum vix dici potest, sed saepe saepius lacerum. Ex calyptra cum hac, ex sporangio (non sulcato) cum hac et sequente convenit nova helvetica species *E. affinis* amiciss. R.

A. Hedw. in nostris *Beytr.* I. p. 121. t. IV., distinctissima foliis ovato-lanceoll., longe apiculatis, caeterisque notis. An cum hac ipsa eadem *Enc. alpina* Engl. Bot. t. 1419., cujus vel fig. nondum vidimus?

2. *E. ciliata* Hedw., foliis spatulato-acuminatis; sporangio laevi; calyptrae ore dentato. *Dillen.* t. 45. f. 9. *Hedw. Stirpp.* I. t. 19.

Bryum extingtor. β . L., *Leersia fimbriata* Brid.

In rup., sepibus reg. mont. Aestate. 4.

Caulis innovatione divisus. — Haec in septentrionalibus, insequens species in australioribus Europae terris magis frequens videtur. Attamen e Pyrenaeis copiosissima hujus quoque accepimus specimina.

3. *E. streptocarpa* Hedw., foliis oblongo-lanceolatis; sporangio spiraliter sulcato; calyptra ore constricto, lacero. *Dillen.* t. 43. f. 71. (confirm. *Smith.* ex herb. *Dill.*) *steril.* *Hedw. Specc.* t. 10. ff. 10-15. *Sturm.* 3. (*E. ciliata.*).

Br. contortum Wulf. ap. Jacq., excl. *Syn. Dill.*, *ciliare* Dicks., excell. omn. *Synn.*, fide *Turn.* ap. *Smith.*, *E. grandis* Hedw. prius cum amicis.

In mur. mont. reg. Aestate. 24.

Caulis cum innovationibus suis saepe digitalis. Ante 30, et quod excedit, annos in Helv. legit *Web. p.*, ao. 1780 circiter in m. *die Bruck* pr. Goett. D. *Lammersd.*, et certe antiquorum botanicorum multi, sec. Smith. ipse *Haller.* (Hist. v. 3. t. 45. f. 3.) hancce cum antecedente confuderunt. In Suec. nunc quoque haec lecta ad urb. *Salam.*

26. *Trichostomum Hedw.* *)

Dentes divisi. *Calyptra* mitraeformis.

- *) Genus, uti nunc restitutum est, in tota muscologia naturalis inorum, generatim (species nostrae 3-8) *Bryum hypnoides* L. et antiquorum auctt. complectens, maribus plerumque axillaribus (*Trichost.* Hedw.), interdum terminalibus (*Trichost.*, *Dicr.* H.) in diversa stirpe — interdum denique axillaribus in eodem individuo (*Fissid.* H.) gaudens. Omnibus, quas novimus, speciebus folia uninervia, nervo vix in ulla non excurrente. Vix itaque amiciss. nostrum *Turnerum* intelligimus, in *Musc. hib.* haec habentem: „in plerisque muscis, et praesertim in *Hypnis*, foliorum nervum ad species rite discriminandas plurimum conferre expertus scio: eadem tamen nota in *T. heterost.*, *lanug.*, *eric.*, *fascic.*, *canesc.* et *microc.*, ne-tiquam valet; haec enim omnia striis duabus parallelis, nervi lati concoloris speciem praebentibus, percurruntur, sed ut sint vere uninervia metuo; cum striis quoque aliis saepe

* foliis albido-acuminatis *).

1. *Tr. pulvinatum* Web. et Mohr., pulvinatum, erectum, foliis undique erecto-patentibus, ovato-lanceolatis, acumine piliformi, longissimo; sporangio e seta arcuata immerso. *Dillen.* t. 50. f. 65. *Hedw. Specc.* t. 40. ff. 1-3. (*Fissid.*).

notentur, et hae duae plerumque in *T. canesc.*, et interdum in aliis interruptae occurrant. Hedwigii auctoritate obtemperans uninervia in praesenti dixi, sed ut alii Botanici ad rem accurate investigandam propellantur spero." Dictarum specierum folia plica in adversa pagina utrinque pone marginem quidem gaudent, margine enim reflexa sunt; sed vix hasce plicas Turneri duas strias esse censemus. In foliis non bene emollitis nervi ipsius margines s. latera sub microscopio saepe formam striarum duarum induunt. Forte hoc phaenomenon, mox error opticus agnotum, Cel. *Turnerum* fefellit.

*) Divisio specierum in eas foliis albido-acuminatis, et in eas foliis muticis gaudentes *naturalis* non habenda; satis tamen constans character esse videtur, ut haud inepte *artificialiter* genus divelatur. Omnibus hisce speciebus majoribus augmentis apex exsuccus s. albidus serrulatus observatur, plus minus in diversis speciebus.

Bryum L., *Afzelia* Ehrh. Decc., *Leersia* Hedw.
Fund. II. p. 88., *Dicr.* Schreberianorum.

In tectis, mur., lapid. vulg.; vere. 24.

β. *alpestre*, nigricans, seta brevior, subarcuata; operculi rostro brevi, recto; dentibus subintegris.

Grimm. *alpestris* Schleich. Cent. 2. n. 13. (in monte *Sylvio* ad rupes a Schleichero lecta) et *Dicr. piliferum* ej. l. c. 4. n. 12. (in calidiorr. *Vallesiae* ad saxa inventum — foliis parumper latioribus, caeteris omnibus convenientibus.)

In subalp., in rup. (in summo *Bruct.* ipsi legimus.

In deoperculatis seta recta, sporangium itaque erectum evadit, et tum quasdam varr. cantius ut distinguas ab insequenti necesse est. Folia non, quod Hedwig habet, e nervo solummodo pilifera, sed, ut in caeteris omnibus hujus subdivisionis speciebus, acumen, piliforme quidem, ex nervo et folii pagina formatur, eo modo, quo, quod infra adnotabimus, sese habet res in Grimm. *plagiop.* Dentes peristomii in hoc et sequente saepe saepius subintegri, rarius 3fidi, fissuris fere semper apice tantum, et aegrius, conspiciendis, quo factum est, ut *Afzeliis* suis (*Grimmiis* Schreberianis) Ehrhartus, ipse olim Hedwig et qui eum secuti sunt, *Leersiis* s. *Encalyptis* plantam adnumeraverint, et Schleicherus tandem hoc, nos ipsi inse-

quens male in duas species distinxerimus. Arcta autem exinde probatur *Trichostomi* generis ex hisce duabus speciebus et *Grimmiae* affinitas, imprimis si cum nostri peristomium conferas *Grimm. plagiop.* (v. infra sub hac specie); ut bene hoc respectu sub insequenti musco *Turnerus* admo- neat, eum *Grimm. cribr.* tantum referre, ut ne cum ea commisceatur cavendum sit. — *Fissid. pulvin. β. afric.* Hedw. Specc. t. 40. ff. 4-6., e cap. b. spei a Thunbergio allatum, praeter paululum minorem staturam imprimis operculo convexo, mutico, a vulgationi forma differentem, et nos ab ipso Ill. Thunberg accepimus; sed sane non nisi varietatis lege discernendus videtur, imprimis cum Europaeus nunc quoque probatus sit. Est enim *Fiss. pulvin. β. african.* Schleich. Cent. 2. n. 28., in calidiorr. Vallesiae ad rupes a Schleichero lectus, *revera* eadem stirps, eodem gaudens operculo. Quod scimus in German. haecce mutica var. nondum lecta. — Calyptra *Trich. pulvin.* subfida, ut male in *Dicrani* sui genere *Pal. de Beauv.* muscum reliquerit.

2. *Tr. ovatum* Pal. de Beauv., pulvinatum, erectum, foliis undique subpatentibus, lanceolatis, acumine breviusculo; seta recta. *Hedw. Stirpp.*

III. t. 34. A. (*Dicr.*). *Web. et Mohr.*
It. Suec. t. 2. f. 4. (*Grimm. ovata*).

In rupibus subalpestrium. Vere, aestate. 2l.

Postquam comperimus et hanc speciem, uti antecedentem, dentibus integris ludere, nullo modo Grimm. olim nostram *ovata*m distinctam porro putamus. Eundem naturae lusum in salisbb. ab am. Flörke communicatis exemplis observavimus. Calyptra in hoc subfida. Huic affine, sec. specimina omnino tamen diversum visum, *Dicr. ellipticum* Turn. musc. t. 6. f. 2., scil. „statura multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepans” Turn. Cum insequenti forte Dillenius hancce stirpem commiscuit. Adnotat enim Turner: „huc, nisi fallor, Dillenii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.” — Recte habente critico in Hall. A. L. Zeit. 1805. Nov. (*Link?*) cum nostro idem (ex specim., quae Swartz. misit, origin.) *Dicr. durum* An. de Cienc. n. 14. p. 177. Certe et l. c. p. 178. descriptum *Dicr. saxatile* Trichostomi nostri generis. — Egregio quoque exemplo *Trich. ovatum*, quam vili habeat natura sexus in muscis rationem. Utitur enim hocce, Hedwigio teste, maribus dioicis terminalibus, quam maxime affine *Tr. pulv.* iisdem axillaribus monoicis, *Trr. microc.* vero et plurima reliqua iis tandem l. axillaribus l. terminalibus dioicis.

3. *Tr. microcarpum* Hedw.;
laxe pulvinatum, caulibus adscenden-
tibus, ramosioribus; foliis erecto-pa-
tentibus, subhomomallis, lanceolato-
subulatis, acumine breviusculo; seta
recta; sporangio obovato. *Dillen.* t.
47. f. 29. (excl. var. *atra*; v. sub an-
tecedente adnotata). *Hedw. Specc.*
t. 23.

Bryum hypnoid. J. L., *Dicr. microc.* Schrad.
Samul.

In saxis alpestrum. Aestate. 24.

Sporangia pro ratione minuta, in caespitibus
crebra. Calyptra sub5fida. Caespites amoene l.
saturate l. subnigricanti-virides. Quid sibi vellet
Bridel, nostram *Tr. lanuginoso* simile dicens non
intelligimus. *Smith* quidem et alii, immo ipse
noster Hedwig, huic et quibusdam aliis folii api-
cem integerrimum adscribunt; summis tamen aug-
mentis omnibus certe hujus subdivisionis specie-
bus foliorum apex revera serrulatus.

4. *Tr. heterostichum* Hedw.,
caulibus adscendentibus, ramosis, fo-
liis subpatentibus, homomallis, lan-
ceolatis, acumine longiusculo; seta re-

cta; sporangio elliptico. *Dillen*, t. 47.
f. 27. A. F. G. (hde *Turn.*). *Hedw.*
Stirpp. II. t. 25. (in Tab. nostra VII.
f. 5. peristomii pars.).

In saxis, ericetis subalpestrium. Aestate. 24.

Caespites ex acuminibus foliorum longioribus
canescentes. Calyptra sub5fida. — Quos s. Hed-
wig in hac stirpe figura (l. c. f. 13.), non verbis
(p. 87. ed. germ.) exhibuit peristomii dentes ad
ipsissimum originem usque partitos, si adessent,
Didymodontem eam declararent. Sed revera sunt
bina crura ad sedecimam circiter longitudinis suae
partem basi conjuncta, et in omnibus conveniunt
hujus speciei dentes cum iis reliquorum *Trichostst.*
Uno quoque margine, averso scilicet, versus api-
cem quasi serrulata crura Hedw. depinxit. Sed
hic summus vir faciem, quam lineae transversales
siccis dant cruribus quasi *nodulosam* male intelle-
xit, hasque ipsas lineas, quod pluribus vicibus ei
accidisse scimus, omisit. Caeterum hocce singu-
lare: dentis singuli crura non aequae lata; nempe
duo angustiora dentium 1 et 2, dentium 2 et 3 duo
latiora sibi contigua, quod sane curiosum videtur.
Cf. de his omnibus fig. nostr. laud.

5. *Tr. lanuginosum* Hedw., cau-
libus decumbentibus, ramosissimis, fo-
liis subulatis, subfalcatis, homomallis,

acumine longiusculo; seta recta; sporangio subovali, minuto. *Dillen* t. 47. f. 32. *Hedw. Stirpp.* III. t. 2. (in Tab. nostra VII f. 8. cal.)

Bryum hypnoides α. L., *Trich. serratum* Ehrh. Decc., *ramigerum* Timm. megap., *hypnoides* Willd. berol.

In subalpestribus. Aestate. 24.

Calyptra 5-7fida. Foliorum apex diaphanus dentato-serratus. In hac specie tribusque insequentibus peristomii dentes, qui in nostris 1-3 et infra 9. 10 et 12., minus longi minusque profunde partiti, etiam aliquantulum medio inflexi inveniuntur, longiores, erectiores, strictiores evadere incipiunt. Operculum tum aequae longius esse debet, et fere in hisce speciebus deoperculatum sporangium longitudine adaequat. Admodum affinis species certe putandum *Trich. canadense* Mich. bor. am., quod apice foliorum minus evidenter serrato differre et magis respondere *Dillen* t. 47. f. 28. dicitur, tamen *Tr. fasciculare* ob diaphanum foliorum apicem esse nequit. Quod reapse distinctum sit, dubitamus, inprimis quia variis extra Europ. terris nostram speciem quoque degere pro certo habemus. Possidemus enim *Trich. hypnoides* Thunb. Cap. et specimina e *Chili*, quae, quamquam, inprimis ultima, foliis densioribus, vix homomallis,

sed undique fere subpatentibus, parumper differre videantur, pro distinctis tamen speciebus, cum omnibus numeris figura et serraturis folia conveniant, agnoscere nequimus.

6. *Tr. canescens* Timm., caulibus erectiusculis, ramosis; foliis patentibus, subrecurvis, subhomomallis, lanceolato-subulatis, acumine brevi; seta recta, longa; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47. f. 27. B-E. (fide *Turn.*). *Hedw. Stirpp.* III. t. 3.

Timm. megap.

In montos. apricis, arenosis. Aestate. 24.

Calyptra 5-7fida. — Ipse summ. noster Hedw. in errorem induxisse videtur recentiores quosdam botanicos, huic verbis (non figuris) nervum deneigans, pro eo strias duas superne divergentes adscribens. Sic forte factum est, ut Cel. Smith prorsus enervia huic tribueret folia, hisque ipsissimis a congeneribus omnibus nostram speciem „certo certius dignoscendam” pronuntiaret, insimulque vero, num omnia Dillenii t. 47. f. 27. specimina huc pertineant, cum non in omnibus enervia observaret folia, dubium injiceret. De Dillenii figg. edocuit nos Turnerus. Nervus vero omnino huic speciei, uti reliquis omnibus, competit, nec defi-

ciens sane impedimento est, quin insequentes duae cum nostro conjungantur.

7. *Tr. ericoides* Schrad., caulibus erectis, ramosis; ramis subpinna-
tis; ramulis brevibus; foliis patentibus, subrecurvis, subhomomallis, lanceolato-subulatis, acumine brevi; seta recta, longa; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47. f. 31.

Schrad. Spicil., *Bryum hypnoid.* γ. L., *Trich. elongatum* Ehrh. Decc.

In ericetis subalpestrium; prima aestate. 24.

Calyptra 7-8fida. — „Ad *Trich. canescens* retulit, uti varietatem, hocce Hedwigius in manuscripti vetustiore parte, antequam Schraderi *Spicilegium* evulgatum erat.” *Schwaegr.* in Hedw. *Specc.* sub *Trich. canesc.* Sane nec nullis essentialibus nobis differre videtur, unice ramositate, quod in differentiis ambarum specierum indicavimus; et aegre tantum in numero nostrarum, uti speciem relinquimus.

•• foliis muticis.

8. *Tr. fasciculare* Schrad., caulibus suberectis, ramosis; ramis sub-

pinnatis; ramulis brevibus; foliis patentibus, subrecurvis, subhomomallis, lanceolato-subulatis; seta longa; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47. f. 28.

Schrad. Spicil., Bryum hypnoides β . L., *lutescens* Dicks.

In saxis montosarum. Aestate. 24.

Calyptra 5-7fida. — Ne falsis differentiis praestigias faciamus tironibus, jam hujus nostri diagnosis, stirpem solummodo foliis non albido-acuminatis a praecedente differre, indicat. Turneri optima sane addamus monita: „Dillenii, Schraderique summae auctoritati obtemperans, *T. ericoides*” (cujus folia amicus noster aequae mutica censet, qualia in originalibus speciminibus Schraderi certe nunquam sunt) „et *fasciculare* disjunxi. Fateor tamen me discrimen nullum, quod ad species duas rite constituendas sufficiat, adhuc reperisse. Folia apice incana dixit Schraderus” (in *Tr. eric.*), „sin ita sit, quomodo” hoc „a *Tr. canescente*, quocum Hedwigius conjungendum censuit, distinguatur, nescio. Haec tria forsitan in unam speciem rectius resolverentur, et inde errori, ut ait Bridellius, inextricabili, ambagibusque vix resolvendis terminus tandem imponeretur.” Et porro: „folia apice incana” *T. canescens* „a *T. fasciculari*, quod forma, habitu, colore maxime refert, distinguunt. Pierine

potest ut hoc in illud transeat?" Sane, qui species certe 6 et 7., forte et 8., in unam conjungit, non multum, nostro ex judicio, peccabit.

9. *Tr. aciculare* Pal. de Beauv., caulibus adscendentibus, ramosis; foliis patentibus, strictis, lenissime subhomomallis, lanceolatis, obtusiusculis, subintegerrimis; seta breviuscula; sporangio obovato-elliptico. *Dillen.* t. 46. f. 25. et, fide *Turn.* et *Smith.*, etiam 26. (*Trich. aquaticum* Brid. cum primariis certe omnibus synom., — „vix nisi caulibus fluitantibus, coloreque atro differens" *Smith.*). *Hedw. Stirpp.* III. t. 33. (*Dicran.*).

Bryum L.

In rivulis subalpestrium ad lapides. Vere. 24.

Folia inferiora subnigricantia. Calyptra glabra. Dentes ad basin fere usque bipartiti, cruribus longis subinflexis, ut jam *Turner* admonuerit, stirpem „inter *Dicrana* et *Trichostoma* ambigere fere" videri, et ipse Schrader quoque, muscum proximum esse *Trichost. microcarpo* observaverit. Var. *Dillen.* t. 47. f. 26., nisi fallamur, etiam e *Germania* possidemus; tamen Bridelii Isenacensem, hercynicam stirpem eandem esse non pro certe affirmabimus.

III. t. 34. A. (*Dicr.*). *Web. et Mohr.*
It. Suec. t. 2. f. 4. (*Grimm. ovata*).

In rupibus subalpestrium. Vere, aestate. 2l.

Postquam comperimus et hanc speciem, uti antecedentem, dentibus integris ludere, nullo modo Grimm. olim nostram *ovatam* distinctam porro putamus. Eundem naturae lusum in salisbb. ab am. Flörke communicatis exemplis observavimus. Calyptra in hoc subafida. Huic affine, sec. specimina omnino tamen diversum visum, *Dicr. ellipticum* Turn. musc. t. 6. f. 2., scil. „statura multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepans” Turn. Cum insequenti forte Dillenius hancce stirpem commiscuit. Adnotat enim Turner: „huc, nisi fallor, Dillenii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.” — Recte habente critico in Hall. A. L. Zeit. 1805. Nov. (*Link?*) cum nostro idem (ex specim., quae Swartz. misit, origin.) *Dicr. durum* An. de Cienc. n. 14. p. 177. Certe et l. c. p. 178. descriptum *Dicr. saxatile* Trichostomi nostri generis. — Egregio quoque exemplo *Trich. ovatum*, quam vili habeat natura sexus in muscis rationem. Utitur enim hocce, Hedwigio teste, maribus dioicis terminalibus, quam maxime affine *Tr. pulv.* iisdem axillaribus monoicis, *Trr. micr.* vero et plurima reliqua iis tandem l. axillaribus l. terminalibus dioicis.

3. *Tr. microcarpum* Hedw.;
laxe pulvinatum, caulibus adscenden-
tibus, ramosioribus; foliis erecto-pa-
tentibus, subhomomallis, lanceolato-
subulatis, acumine breviusculo; seta
recta; sporangio obovato. *Dillen.* t.
47. f. 29. (excl. var. *atra*; v. sub an-
tecedente adnotata). *Hedw. Specc.*
t. 23.

Bryum hypnoid. J. L., *Dicr. microc.* Schrad.
Samul.

In saxis alpestrium. Aestate. 24.

Sporangia pro ratione minuta, in caespitibus
crebra. Calyptra subfida. Caespites amoene l.
saturate l. subnigricanti-virides. Quid sibi vellet
Bridel, nostram *Tr. lanuginosum* simile dicens non
intelligimus. *Smith* quidem et alii, immo ipse
noster *Hedwig*, huic et quibusdam aliis folii api-
cem integerrimum adscribunt; summis tamen aug-
mentis omnibus certe hujus subdivisionis specie-
bus foliorum apex revera serrulatus.

4. *Tr. heterostichum* Hedw.,
caulibus adscendentibus, ramosis, fo-
liis subpatentibus, homomallis, lan-
ceolatis, acumine longiusculo; seta re-

III. t. 34. A. (*Dicr.*). *Web. et Mohr.*
It. Suec. t. 2. f. 4. (*Grimm. ovata*).

In rupibus subalpestrium. Vere, aestate. 2l.

Postquam comperimus et hanc speciem, uti antecedentem, dentibus integris ludere, nullo modo *Grimm.* olim nostram *ovatam* distinctam porro putamus. Eundem naturae lusum in salisbb. ab am. Flörke communicatis exemplis observavimus. Calyptra in hoc subafida. Huic affine, sec. specimina omnino tamen diversum visum, *Dicr. ellipticum* Turn. musc. t. 6. f. 2., scil. „statura multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepans” Turn. Cum insequenti forte Dillenius hancce stirpem commiscuit. Adnotat enim Turner: „huc, nisi fallor, Dillenii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.” — Recte habente critico in Hall. A. L. Zeit. 1805. Nov. (*Link?*) cum nostro idem (ex specim., quae Swartz. misit, origin.) *Dicr. durum* An. de Cienc. n. 14. p. 177. Certe et l. c. p. 178. descriptum *Dicr. saxatile* Trichostomi nostri generis. — Egregio quoque exemplo Trich. *ovatum*, quam vili habeat natura sexus in muscis rationem. Utitur enim hocce, Hedwigio teste, maribus dioicis terminalibus, quam maxime affine Tr. *pulv.* iisdem axillaribus monoicis, Tr. *microc.* vero et plurima reliqua iis tandem l. axillaribus l. terminalibus dioicis.

3. *Tr. microcarpum* Hedw.;
laxe pulvinatum, caulibus adscenden-
tibus, ramosioribus; foliis erecto-pa-
tentibus, subhomomallis, lanceolato-
subulatis, acumine breviusculo; seta
recta; sporangio obovato. *Dillen.* t.
47. f. 29. (excl. var. *atra*; v. sub an-
tecedente adnotata). *Hedw. Specc.*
t. 23.

Bryum hypnoid. J. L., *Dicr. microc.* Schrad.
Samul.

In saxis alpestrum. Aestate. 24.

Sporangia pro ratione minuta, in caespitibus
crebra. Calyptra sub5fida. Caespites amoene l.
saturate l. subnigricanti-virides. Quid sibi vellet
Bridel, nostram *Tr. lanuginoso* simile dicens non
intelligimus. *Smith* quidem et alii, immo ipse
noster Hedwig, huic et quibusdam aliis folii api-
cem integerrimum adscribunt; summis tamen aug-
mentis omnibus certe hujus subdivisionis specie-
bus foliorum apex revera serrulatus.

4. *Tr. heterostichum* Hedw.,
caulibus adscendentibus, ramosis, fo-
liis subpatentibus, homomallis, lan-
ceolatis, acumine longiusculo; seta re-

III. t. 34. A. (*Dicr.*). *Web. et Mohr.*
It. Suec. t. 2. f. 4. (*Grimm. ovata*).

In rupibus subalpestrium. Vere, aestate. 2l.

Postquam comperimus et hanc speciem, uti antecedentem, dentibus integris ludere, nullo modo Grimm. olim nostram *ovatam* distinctam porro putamus. Eundem naturae lusum in salisbb. ab am. Flörke communicatis exemplis observavimus. Calyptra in hoc subafida. Huic affine, sec. specimina omnino tamen diversum visum, *Dicr. ellipticum* Turn. musc. t. 6. f. 2., scil. „statura multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepans” Turn. Cum insequenti forte Dillenius hancce stirpem commiscuit. Adnotat enim Turner: „huc, nisi fallor, Dillenii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.” — Recte habente critico in Hall. A. L. Zeit. 1805. Nov. (*Link?*) cum nostro idem (ex specim., quae Swartz. misit, origin.) *Dicr. durum* An. de Cienc. n. 14. p. 177. Certe et l. c. p. 178. descriptum *Dicr. saxatile* Trichostomi nostri generis. — Egregio quoque exemplo *Trich. ovatum*, quam vili habeat natura sexus in muscis rationem. Utitur enim hocce, Hedwigio teste, maribus dioicis terminalibus, quam maxime affine *Tr. pulv.* iisdem axillaribus monoicis, *Trr. micr.* vero et plurima reliqua iis tandem l. axillaribus l. terminalibus dioicis.

3. *Tr. microcarpum* Hedw.;
laxe pulvinatum, caulibus adscenden-
tibus, ramosioribus; foliis erecto-pa-
tentibus, subhomomallis, lanceolato-
subulatis, acumine breviusculo; seta
recta; sporangio obovato. *Dillen.* t.
47. f. 29. (excl. var. *atra*; v. sub an-
tecedente adnotata). *Hedw. Specc.*
t. 23.

Bryum hypnoid. J. L., *Dicr. microc.* Schrad.
Samul.

In saxis alpestrum. Aestate. 24.

Sporangia pro ratione minuta, in caespitibus
crebra. Calyptra subfida. Caespites amoene l.
saturate l. subnigricanti-virides. Quid sibi vellet
Bridel, nostram *Tr. lanuginoso* simile dicens non
intelligimus. *Smith* quidem et alii, immo ipse
noster Hedwig, huic et quibusdam aliis folii api-
cem integerrimum adscribunt; summis tamen aug-
mentis omnibus certe hujus subdivisionis specie-
bus foliorum apex revera serrulatus.

4. *Tr. heterostichum* Hedw.,
caulibus adscendentibus, ramosis, fo-
liis subpatentibus, homomallis, lan-
ceolatis, acumine longiusculo; seta re-

III. t. 34. A. (*Dicr.*). *Web. et Mohr.*
It. Suec. t. 2. f. 4. (*Grimm. ovata*).

In rupibus subalpestrium. Vere, aestate. 2l.

Postquam comperimus et hanc speciem, uti antecedentem, dentibus integris ludere, nullo modo *Grimm.* olim nostram *ovatam* distinctam porro putamus. Eundem naturae lusum in salisbb. ab am. Flörke communicatis exemplis observavimus. Calyptra in hoc subafida. Huic affine, sec. specimina omnino tamen diversum visum, *Dicr. ellipticum* Turn. musc. t. 6. f. 2., scil. „statura multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepans” Turn. Cum insequenti forte Dillenius hancce stirpem commiscuit. Adnotat enim Turner: „huc, nisi fallor, Dillenii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.” — Recte habente critico in Hall. A. L. Zeit. 1805. Nov. (*Link?*) cum nostro idem (ex specim., quae Swartz. misit, origin.) *Dicr. durum* An. de Cienc. n. 14. p. 177. Certe et l. c. p. 178. descriptum *Dicr. saxatile* Trichostomi nostri generis. — Egregio quoque exemplo *Trich. ovatum*, quam vili habeat natura sexus in muscis rationem. Utitur enim hocce, Hedwigio teste, maribus dioicis terminalibus, quam maxime affine *Tr. pulv.* iisdem axillaribus monoicis, *Trr. microc.* vero et plurima reliqua iis tandem l. axillaribus l. terminalibus dioicis.

3. *Tr. microcarpum* Hedw.;
laxe pulvinatum, caulibus adscenden-
tibus, ramosioribus; foliis erecto-pa-
tentibus, subhomomallis, lanceolato-
subulatis, acumine breviusculo; seta
recta; sporangio obovato. *Dillen.* t.
47. f. 29. (excl. var. *atra*; v. sub an-
tecedente adnotata). *Hedw. Specc.*
t. 23.

Bryum hypnoid. J. L., *Dicr. microc.* Schrad.
Samul.

In saxis alpestrum. Aestate. 24.

Sporangia pro ratione minuta, in caespitibus
crebra. Calyptra sub5fida. Caespites amoene l.
saturate l. subnigricanti-virides. Quid sibi vellet
Bridel, nostram *Tr. lanuginoso* simile dicens non
intelligimus. *Smith* quidem et alii, immo ipse
noster Hedwig, huic et quibusdam aliis folii api-
cem integerrimum adscribunt; summis tamen aug-
mentis omnibus certe hujus subdivisionis specie-
bus foliorum apex revera serrulatus.

4. *Tr. heterostichum* Hedw.,
caulibus adscendentibus, ramosis, fo-
liis subpatentibus, homomallis, lan-
ceolatis, acumine longiusculo; seta re-

III. t. 34. A. (*Dicr.*). *Web. et Mohr.*
It. Suec. t. 2. f. 4. (*Grimm. ovata*).

In rupibus subalpestrium. Vere, aestate. 24.

Postquam comperimus et hanc speciem, uti antecedentem, dentibus integris ludere, nullo modo Grimm. olim nostram *ovatum* distinctam porro putamus. Eundem naturae lusum in salisbb. ab am. Flörke communicatis exemplis observavimus. Calyptra in hoc subfida. Huic affine, sec. specimina omnino tamen diversum visum, *Dicr. ellipticum* Turn. musc. t. 6. f. 2., scil. „statura multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepans” *Turn.* Cum insequenti forte Dillenius hancce stirpem commiscuit. Adnotat enim Turner: „huc, nisi fallor, Dillenii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.” — Recte habente critico in Hall. A. L. Zeit. 1805. Nov. (*Link?*) cum nostro idem (ex specim., quae Swartz. misit, origin.) *Dicr. durum* An. de Cienc. n. 14. p. 177. Certe et l. c. p. 178. descriptum *Dicr. saxatile* Trichostomi nostri generis. — Egregio quoque exemplo *Trich. ovatum*, quam vili habeat natura sexus in muscis rationem. Utitur enim hocce, Hedwigio teste, maribus dioicis terminalibus, quam maxime affine *Tr. pulv.* iisdem axillaribus monoicis, *Trr. microc.* vero et plurima reliqua iis tandem l. axillaribus l. terminalibus dioicis.

3. *Tr. microcarpum* Hedw.;
laxe pulvinatum, caulibus adscenden-
tibus, ramosioribus; foliis erecto-pa-
tentibus, subhomomallis, lanceolato-
subulatis, acumine breviusculo; seta
recta; sporangio obovato. *Dillen. t.*
47. f. 29. (excl. var. *atra*; v. sub an-
tecedente adnotata). *Hedw. Specc.*
t. 23.

Bryum hypnoid. J. L., Dicr. microc. Schrad.
Samul.

In saxis alpestrium. Aestate. 24.

Sporangia pro ratione minuta, in caespitibus
crebra. Calyptra sub5fida. Caespites amoene l.
saturate l. subnigricanti-virides. Quid sibi vellet
Bridel, nostram *Tr. lanuginoso* simile dicens non
intelligimus. *Smith* quidem et alii, immo ipse
noster Hedwig, huic et quibusdam aliis folii api-
cem integerrimum adscribunt; summis tamen aug-
mentis omnibus certe hujus subdivisionis specie-
bus foliorum apex revera serrulatus.

4. *Tr. heterostichum* Hedw.,
caulibus adscendentibus, ramosis, fo-
liis subpatentibus, homomallis, lan-
ceolatis, acumine longiusculo; seta re-

cta; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47.
f. 27. A. F. G. (fide *Turn.*). *Hedw.*
Stirpp. II. t. 25. (in Tab. nostra VII.
f. 5. peristomii pars.).

In saxis, ericetis subalpestrium. Aestate. 24.

Caespites ex acuminibus foliorum longioribus
canescentes. Calyptra sub5fida. — Quos s. Hed-
wig in hac stirpe figura (l. c. f. 13.), non verbis
(p. 87. ed. germ.) exhibuit peristomii dentes ad
ipsissimum originem usque partitos, si adessent,
Didymodontem eam declararent. Sed revera sunt
bina crura ad sedecimam circiter longitudinis suae
partem basi conjuncta, et in omnibus conveniunt
hujus speciei dentes cum iis reliquorum *Trichostst.*
Uno quoque margine, averso scilicet, versus api-
cem quasi serrulata crura Hedw. depinxit. Sed
hic summus vir faciem, quam lineae transversales
siccis dant cruribus quasi *nodulosam* male intelle-
xit, hasque ipsas lineas, quod pluribus vicibus ei
accidisse scimus, omisit. Caeterum hocce singu-
lare: dentis singuli crura non aequae lata; nempe
duo angustiora dentium 1 et 2, dentium 2 et 3 duo
latiora sibi contigua, quod sane curiosum videtur.
Cf. de his omnibus fig. nostr. laud.

5. *Tr. lanuginosum* Hedw., cau-
libus decumbentibus, ramosissimis, fo-
liis subulatis, subfalcatis, homomallis,

acumine longiusculo; seta recta; sporangio subovali, minuto. *Dillen* t. 47. f. 32. *Hedw. Stirpp.* III. t. 2. (in Tab. nostra VII f. 8. cal.)

Bryum hypnoides α. L., *Trich. serratum* Ehrh. Decc., *ramigerum* Timm. megap., *hypnoides* Willd. berol.

In subalpestribus. Aestate. 24.

Calyptra 5-7fida. Foliorum apex diaphanus dentato-serratus. In hac specie tribusque insequentibus peristomii dentes, qui in nostris 1-3 et infra 9. 10 et 12., minus longi minusque profunde partiti, etiam aliquantulum medio inflexi inveniuntur, longiores, erectiores, strictiores evadere incipiunt. Operculum tum aequae longius esse debet, et fere in hisce speciebus deoperculatum sporangium longitudine adaequat. Admodum affinis species certe putandum *Trich. canadense* Mich. bor. am., quod apice foliorum minus evidenter serrato differre et magis respondere *Dillen*. t. 47. f. 28. dicitur, tamen *Tr. fasciculare* ob diaphanum foliorum apicem esse nequit. Quod reapse distinctum sit, dubitamus, imprimis quia variis extra Europ. terris nostram speciem quoque degere pro certo habemus. Possidemus enim *Trich. hypnoides* Thunb. Cap. et specimina e *Chili*, quae, quamquam, imprimis ultima, foliis densioribus, vix homomallis,

sed undique fere subpatentibus, parumper differre videantur, pro distinctis tamen speciebus, cum omnibus numeris figura et serraturis folia conveniant, agnoscere nequimus.

6. *Tr. canescens* Timm., caulibus erectiusculis, ramosis; foliis patentibus, subrecurvis, subhomomallis, lanceolato-subulatis, acumine brevi; seta recta, longa; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47. f. 27. B-E. (fide *Turn.*). *Hedw. Stirpp.* III. t. 3.

Timm. megap.

In montos. apricis, arenosis. Aestate. 24.

Calyptra 5-7fida. — Ipse summ. noster Hedw. in errorem induxisse videtur recentiores quosdam botanicos, huic verbis (non figuris) nervum denegans, pro eo strias duas superne divergentes adscribens. Sic forte factum est, ut Cel. Smith prorsus enervia huic tribueret folia, hisque ipsissimis a congeneribus omnibus nostram speciem „certo certius dignoscendam” pronuntiaret, insimulque vero, num omnia Dillenii t. 47. f. 27. specimina huc pertineant, cum non in omnibus enervia observaret folia, dubium injiceret. De Dillenii figg. edocuit nos Turnerus. Nervus vero omnino huic speciei, uti reliquis omnibus, competit, nec defi-

ciens sane impedimento est, quin insequentes duae cum nostro conjungantur.

7. *Tr. ericoides* Schrad., caulibus erectis, ramosis; ramis subpinatis; ramulis brevibus; foliis patentibus, subrecurvis, subhomomallis, lanceolato-subulatis, acumine brevi; seta recta, longa; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47. f. 31.

Schrad. Spicil., *Bryum hypnoid.* γ. L., *Trich. elongatum* Ehrh. Decc.

In ericetis subalpestrium; prima aestate. 2.

Calyptra 7-8fida. — „Ad *Trich. canescens* retulit, uti varietatem, hocce Hedwigi in manuscripti vetustiore parte, antequam Schraderi Spicilegium evulgatum erat.” *Schwaeagr.* in Hedw. Specc. sub *Trich. canesc.* Sane nec ullis essentialibus nobis differre videtur, unice ramositate, quod in differentiis ambarum specierum indicavimus; et aegre tantum in numero nostrarum, uti speciem relinquimus.

•• foliis muticis.

8. *Tr. fasciculare* Schrad., caulibus suberectis, ramosis; ramis sub-

pinnatis; ramulis brevibus; foliis patentibus, subrecurvis, subhomomallis, lanceolato-subulatis; seta longa; sporangio elliptico. *Dillen.* t. 47. f. 28.

Schrad. Spicil., Bryum hypnoides β . L., *lutescens* Dicks.

In saxis montosarum. Aestate. 24.

Calyptra 5-7fida. — Ne falsis differentiis praestigias faciamus tironibus, jam hujus nostri diagnosis, stirpem solummodo foliis non albido-acuminatis a praecedente differre, indicat. Turneri optima sane addamus monita: „Dilleni, Schraderique summae auctoritati obtemperans, *T. ericoides*” (cujus folia amicus noster aequae mutica censet, qualia in originalibus speciminibus Schraderi certe nunquam sunt) „et *fasciculare* disjunxi. Fateor tamen me discrimen nullum, quod ad species duas rite constituendas sufficiat, adhuc reperisse. Folia apice incana dixit Schraderus” (in *Tr. eric.*), „sin ita sit, quomodo” hoc „a *Tr. canescente*, quocum Hedwigius conjungendum censuit, distinguatur, nescio. Haec tria forsitan in unam speciem rectius resolverentur, et inde errori, ut ait Bridelius, inextricabili, ambagibusque vix resolvendis terminus tandem imponeretur.” Et porro: „folia apice incana” *T. canescens* „a *T. fasciculari*, quod forma, habitu, colore maxime refert, distinguunt. Pierine

potest ut hoc in illud transeat?" Sane, qui species certe 6 et 7., forte et 8., in unam conjungit, non multum, nostro ex judicio, peccabit.

9. Tr. aciculare Pal. de Beauv., caulibus adscendentibus, ramosis; foliis patentibus, strictis, lenissime subhomomallis, lanceolatis, obtusiusculis, subintegerrimis; seta breviuscula; sporangio obovato-elliptico. *Dillen.* t. 46. f. 25. et, fide *Turn.* et *Smith.*, etiam 26. (Trich. *aquaticum* Brid. cum primariis certe omnibus synonym., — „vix nisi caulibus fluitantibus, coloreque atro differens" *Smith.*). *Hedw. Stirpp.* III. t. 33. (*Dicran.*).

Bryum L.

In rivulis subalpestrium ad lapides. Vere. 24.

Folia inferiora subnigricantia. Calyptra 5fida. Dentes ad basin fere usque bipartiti, cruribus longis subinflexis, ut jam *Turner* admonuerit, stirpem „inter *Dicrana* et *Trichostoma* ambigere fere" videri, et ipse *Schrader* quoque, muscum proximum esse *Trichost. microcarpo* observaverit. Var. *Dillen.* t. 47. f. 26., nisi fallamur, etiam e *Germania* possidemus; tamen *Bridelii* *Isenacensem*, *hercynicam* stirpem eandem esse non pro certe affirmabimus.

10. *Tr. riparium* Web. et Mohr., caulibus erectiusculis, ramosis; foliis undique patentibus, oblongo - s. lingulato - brevissime acuminatis, integerrimis; seta breviuscula; sporangio elliptico.

Gymnost. Host. Syn., excl. syn. Dill., et verosimiliter quoque phraseos certe ea parte de operculo dicente, — *Trich. aquaticum* Schleich. Cent. 3. n. 20., *Tr. nigritans* Brid. Suppl.

„In agro vindobon. in saxis, palis ad Danub. ripas.” Host. („in rivulo *Lavançon*” Helv. una cum *Trich. acicul.* Schleicher.) Aestate? 24?

Folia livida. Ferme *Trich. acicul.* et *fontin.* jungit, ab illo foliis et caulium laxitate quam plurimum recedens. Dentes ex residua parte peristomii quoque tri-, quadripartiti videntur; certissime *Trichostomi.* Operculum et calyptram nondum vidimus. Illud tamen ex dentium indole acuminatum omnino suspicandum; et vix ac ne vix quidem „breve, obtusum” esse potest. A *Dillenii* musco t. 47. f. 30. (*Trich. obtuso* Anglor. et Brid. — apud hunc quibusdam locis atque synonymis nec non bona descriptionis parte exclusis —), citato quidem ab *Hostio*, quod vero nec in aqua, sed in rupibus in *Snowdon* degere, habituque gaudere dicitur *Tr. microc.*, foliisque in siccis ap-

pressis, quae in nostro et tum patent, et ramos crassos tumentes faciunt, itaque absque fere omni dubio diversissimum. Hostiana caeterum et Schleicheriana exempla ad unguem conveniunt.

11. *Tr. fontinaloides* Hedw., caulibus decumbentibus, ramosissimis, longissimis; foliis erecto-l. subpatentibus, ovato-lanceolato-brevissime acuminatis, integerrimis; seta brevissima; sporangio immerso. *Dillen.* t. 33. f. 2. *Hedw. Stirpp.* III. t. 14. *Dicks.* t. 4. f. 1. (*Font. alpina*, nullis essentialibus, ex specimin., differens, conveni. *Turn. et Smith.*) (in Tab. nostra VII. f. 6. perist. pars, 7. calyptra.).

Fontinalis minor L. (et *Dicks.*), *Hypn. nigricans* Vill. B.

In fluviiis et rivulis subalpinis; in austr. *Germ.* copiosum, in septentr. pr. *Brem.*, sed semper sterile lect. ab amiciss. *Mertens.* Aestate. 24.

Simillimum facie *Gymn. aquat.*, a quo cautius ut distinguas necesse est; cf. quae supra sub hoc monuimus. Novo est exemplo affinitatum muscorum e calyptra et stirpis habitu fere semper congruentibus eruendarum. Calyptra sub5-fido-dimi-

diata, tamen recta secedens ex operculo rectiusculo. Dentes peristomii 16 ad basin usque liberi, 3-, 4partiti, foraminulis praeterea infra varie pertusi, sicci torti. Quam peristomii rationem respiciens Cel. Pal. de Beauv. proprium construxit genus, *Cicclidotus* ei, insimul internum, nec externum peristomium proferens. Quod discrimen vero nullum inter interna et externa muscorum uno tantum sporangii oris munimento instructorum peristomia nobis adesse verum videatur, jam supra in tabula generum sub *Barbula* monuimus; et sane praeter necessitatem et naturae nutum, et haec, uti alias, Gallorum aethéogamista genera multiplicavit. Quid vero sibi velit, Trich. *fontinal.* H. dubie tantum suo generi adscribens, absque dubio *Fontin. erectam* Vill., operculumque *Cicclidoti* mammillare dicens, plane non capimus. Egregii et haec, uti pluries, nostri *Turneri* allegemus verba: „Plurimum laboris huic stirpi impendit Bridel, qui summo opere esse polymorpham optimo jure in Muscologia observavit. — *Fontinales* habitu omnino refert, unde quod iis a Dillenio Linnaeoque annumeraretur minime mirum. — Iconin Hist. Muscor., quae capsulas omnibus ramorum apicibus insidentes fingit, plurimos Botánicos fefellisse videtur, sed exemplaria Dilleniana in herb. suo jam nunc Oxoniae conservata, cum nostris omnimodo convenisse oculus testis adsum.” Dissipatae igi-

tur sint atque resolutae in posterum omnes nebulae, Dillenii atque Linnéi Fontin. *minor.*, uti surpem a Trich. *fontin.*, s. Fontin. *minori* certe plurimi. recentiorum auctt., forte diversam, hucusque involventes. Monemus denique, sexum et huic plantae, ex ipsissimi Hedwigii verbis, esse *monoicum*, quod tamen summum muscologum non movit, ut a reliquis suis *dioicis* Trichostomis eam, uti ex sua methodo ferme debuisset, secerneret. Sexus, hercle, in muscis non inagni momenti.

12. *Tr. sciuroides* Web. et Mohr., caulibus repentibus, ramosis; ramis erectis, subdivisis, siccitate incurvis; foliis erecto-patentibus, subhomomallis, ovato-lanceolatis, acutissimis, integerrimis, nervo latissimo, obsoletissimo; seta breviuscula; sporangio oblongo; operculo conico, brevi. *Dillen.* t. 41. f. 54. *Hedw. Fund.* II. t. 8. II. 45, 46. (*Fissid.*). (in Tab. nostra IX. f. 1. calyptia).

Hypn. L., Dicr. Schreberianor.

In arbor., satis vulgare, rarius fructif. Vere. 24.

A Lesk. *seric.* et *Hypno lutesc.* criticus in (Hall.) A. L. Zeit. 1804. n. 309. dignoscendum jubet! Multo magis sane habitu refert, mouente

Turn. Hedwigii *Pterigg. julac. et trichom.*, ut omnibus concedamus, hic novum esse nexum muscos inter peristomii dentibus integris eosque iis divisis gaudentes. Non tamen ipsissimo Turnero accedere possumus dicenti: „mirum profecto hanc plantam inter *Dicrana*, quorum nulli affinis, hactenus relictam, et a nemine *Pterogoniis*, quibus liquido attinet, esse associatam. Quoad peristomium, si icon in Hedw. Fund. II. t. 8. f. 46. accurate depingatur, ambigere quidem videtur, sed in exemplari, quod nunc sub lente observo, dentes ad basin usque dividuntur; hinc, licet eorum numerus duplo major sit, quam in reliquis, omnino fit *Pterogonium*, generisque characterem in hoc mutare sustinui.” — Ipsi accuratissimam Hedwigii peristomii fig. cit. sane invenimus, et hac vice itaque a partibus stare Cel. *Smithii* malumus. Bene enim hic adnotat: „peristomii forma, dentibus ad basin fere bipartitis, a *Dicrano* aliquantulum recedit. Habitu gaudet *Pterogonii*, neutiquam vero characterem.” Calyptra autem quoque, immo a nostris *Leptodontibus*, s. *Pterigynandris* calyptra sursum pilosa, recedit. Male enim hisce (*Lasiae* suo generi — certe omnibus speciebus —) calyptram campaniformem s. rectam secedentem Cel. *Belvisius* adscribit. *Bridelius* quidem nostri calyptram „subulatam, lateraliter fissilem” dicit, et non injuste. Tamen haec calyptra (cf. nostr. fig. laud.)

recta secedens, basiue fissâ subdimidiata, qualem etiam sporangii et operculi indoles esse suadent *), et omnino cum ea *Trich. patentis* (v. tab. nostrae VII. f. 9.) omnibus essentialibus congruens nuncupari meretur, ut, cum insuper stirpis modo dictae et nostrae speciei tanta sit affinitas, quae non nisi vi ac contra naturam ambas in systemate ab invicem segregari permetteret, nullo sane alio loco meliori jure nostrum muscum enumerare quam inter *Trichostoma*, valuerimus. Caeterum de horum muscorum calyptris excursum ad *Dicrani* genus in tabula generum conspectum sistente supra adjectum pluribus conferas. — Folia huic stirpi densa, arcte imbricata. Enervia ab auctoribus pluribus, *Turn.*, *Smith.*, nec tamen a *Brid.*, nuncupantur, et revera primo intuitu, vel maximis augmentis, talia esse videntur, ut non multum illum vituperare velimus, qui plane nervo destituta

*) Singulare sane phaenomenum in hac calyptra observamus. Scilicet juniorem, totum adhuc sporangium investientem, basi integram, nec fissam reperimus, solummodo circa operculi et sporangii connexum fissura apertam, hiantem. Tale phaenomenum in *Timm.* sua *cucullata* *Michaux.*, l. ejus interpres, quoque describit, et forte ex eo stirpem qua speciem praeprimis distinxit. Compluribus autem muscis, uti scimus, simile quid saepe accidit, nec species ex eo discriminandae.

ea affirmet. Hic enim, quod non in caeteris Trichostst. nobis patuit, ferme illa conditio, ut striae duae mediae observentur. Attamen persuasum habemus, inprimis cum vasorum ad ipsissimam folii basin rationem atque directionem respiciamus, reapse heic nervum adesse talis fere naturae, qualis invenitur in Dier. *flex.* plurimisque aliis, nempe admodum latum, non ita crassum et ideo dilutius coloratum, qui sane obsoletissimus et vix conspiciendus. Strias igitur dictas duas latera hujus lati nervi esse censemus; et pone marginem insuper plica utrinque, ex revolutione marginis folii oriente, folium instructum est. Hac singulari folii ratione, ejusque forma caeterisque bene cum nostro congruentem e speciminibus reperimus Fiss. *sciur. vaginatum* Mich., ut vix nisi varietatem eum habere possimus. Tamen memorabilis sane varietas est. Folia enim multo magis quam in Europaea stirpe curvata et ita homomalla, minora quoque. Inprimis vero perichaetium multo longius, quod ipsam setam superet, sporangium breviter ovale, nec oblongum. Perichaetio tamen setas haud multo longiores, immo id vix superantes etiam in indigena planta Angli observarunt. Apud nos seta satis longa exserta. — Tandem de affinibus nostro duobus muscis, quod scimus in Germ. nondum lectis, certe ejusdem generis, paucis ut loquamur, non plane ineptum censemus. Primus

Bryum patens Dicks. t. 4. f. 8. (calyptra in tab. nostra VII. f. 9.), quod *Pterigynandrum* olim Hedw. (non male ex habitu) suspicabatur. *Dicranum* Smithio audit, facie conveniens cum *Trich.* nostro *acicul.* dictum. Multo magis affine censere debemus *Trich. sciur.*, ut jam cum eo confusum viderimus. Insigniter autem differt. Gaudet enim *foliis lanceolatis, integerrimis, muticis, nervo valido (anguste tamen) excurrente, patentibus (nec, uti Smith. habet: erecto adpressis, quod in sicco tantum statu valet), supremis subhomomallis, operculo etiam multum discrepante, scil. conico-acuminato, subrecto, dimidia sporangii longitudinis, nec breve conico.* Non solum ex *Angl.* habemus, sed etiam e *Gall. merid.* (pro *Fiss. sciur.*), nec non ex *Helv.* Est enim ipsissima stirps *Trich. nudum* Schleich. Cent. 3. n. 19., „ad rupes alpinas” lectum. In anglico musco saepe dens unus l. alter 3-partitus, et eadem peristomii ratio in helvetico quoque nobis obvia. Sunt caeterum dentes ultra $\frac{2}{3}$ longitudinis partiti, subinflexi *). — Altera species est, *Trich. patenti* praeprimis accedens, *Trich. affine* Schleich. Cent. 4. n. 18., multis notis et praesertim foliis, certe summis, apice albidulo, ser-

*) Hicce muscus bis in Suppl. Brid. occurrit: *Pterig. patens* et *Dicr. patens*!

mulato instructis, diversum, sui juris caeterum species hucusque omnino visum. Hae duae forte post-hac merid. Germ. Florae cives agnoscentur.

Bryum *aciculariforme* Hoffm. in Add. ad Fl., quod ad *Rehberg Herc.* Ehrhart legisse dicitur, quid sit, quis nobis extricabit, immo quis multum curabit? Ob allegatum citatum Dill. t. 47. f. 30., non, tali auctoritate, rarum illum Dillenii muscum (*Trich. obtusum* Smith.), a nemine post Dillen., et ab eo solummodo in m. *Snowdon* lectum, exteris itaque minus sane notum, nostrae Florae civibus adscribere jus atque fas esse duximus.

27. *Grimmia* Mohr. l. c. p. 28.

Dentes (8 *), l.) 16, integri, liberi, aequidistantes.

Calyptra dimid., l. mitraeformis.

* seta terminali (*Grimmia* Schreb., *Weissia* **),
Grimmia ***) et Encal. lanceolata †) Hedw.).

† seta foliis perichaetialibus breviori (sporangio immerso).

1. *G. r. apocarpa* Hedw., foliis ovato-acuminatis; sporangio oblongo. *Dillen.* t. 32. f. 4. *Schmid. Ic.* t. 57. f. 1. *Hedw. Stirpp.* I. t. 39. *Sturm.* 2.

Bryum apocarpum α. L., *apocarp.* et *apocaulon* Hoffm., *Grimm. stricta* Turn. t. 2. f. 1., *Schleicheri* Spreng. *Eiul.* t. VII. f. 59. (mala), *rivularis* Brid. l. c. (*gracilis* ††) *Schleich. Cent.* 3. n. 14. et *rivularis* *Schleich. Cent.* 4. n. 5.), *alpicola* Ludw. *krypt. Gew. Cent.* I. n. 18.

*) *Octoblepharum albidum*, tropicus muscus, peristomio semicompleto gaudet, uti *Fissid semicompletus* H., *Didymodon* et *Orthotricha* quaedam.

**) Dioica.

***) Monoica, dentib. latiusculis, reflexilibus.

†) Monoica, dentib. angustis, erectis.

††) Tamen haec extra aquam degit.

In saxis, lapidibus. 24.

Habitu, magnitudine et ramositate caulis nec non sporangii longitudine magnopere variat. Dens peristomii unus alterve non raro foraminibus quibusdam pertusus. In Gr. sic dicta *Schleicheri* singulum quoque ad basin fere usque divisum observavimus. Br. *apocaulon* Hoffm. statura minore, operculo longius acuminato, a vulgatissima forma parumper recedit. Turneri Gr. *strictam* colore saturatiore, ramis strictioribus, distinctam speciem putare nequimus. Folia in exemplaribus ab amiciss. auct. communicatis minime exaete lanceolata, sed eadem gaudentia forma observavimus ac in vulgari stirpe, nec omnia diaphano apice prorsus destituta sunt. Gr. *Schleicheri* Spreng. foliorum perichaetialium apicibus diaphanis longissimis et evidenter serrulatis, sporangio multo longiore, ac in ic. Spreng., primo intuitu differre videtur; sed apex ille diaphanus in vulgari musco saepe serrulatus quoque obvenit, quod quidem Hedwigium fugit. Gr. *rivularis* Brid. saxa inhabitat, aquis rivulorum alpestrium irrorata, quo natali loco perichaetialium foliorum apex diaphanus prorsus evanescit, statura ramosior, diffusior, folia tandem magis homomalla evadunt. Angli eandem stirpem in sua patria nunc detexerunt, et Turner quoad habitum bonam, quoad sporang. et fol. minus aptam, in t. 2. f. 2. ejusdem dedit iconem.

Gr. gracilis Schleich. hac parumper longiores, graciliores habet ramos ramulosque. *Gr. alpico-lam* Ludw. veram censere nequimus, cum vulgaris speciei formis in aqua vigentibus omnibus respondeat, nec folia epilosa sint, nec sporangium cyathiforme, ore dilatato, sed oblongum, ore contracto, nec denique peculiaris genuinae *Swartzianae* stirpis habitus ei competat. Tandem ab omnibus memoratis nostrae formis et inter se ex specimenibus bene distinctas habemus (praeter insequentem *Gr. Donnian.*), in Germ. hucusque, quod scimus, non lectas, ad hanc pertinentes subdivisionem, *Grimmias maritimam* Turn. et *canescentem* Schleich. Cent. 3. n. 12. Illa *Gr. alpic.* Sw., quam aequae distinctam putamus, affinis. Altera, *Gr. Donnianae* proxima, seta satis insigni (quamquam sit cum sporangio perichaetialibus foliis utique immersa) aliisque gaudet notis diagnosticis. De *Gr. alpestri* Schleich. v. supra sub *Trich. pulvin.* β . alp.

2. *Gr. Donniana* Smith., foliis elliptico-lanceolatis; sporangio ovali; seta longiuscula. *Engl. Bot.* t. 1259.

Smith. Fl., *Gr. sudetica* (Spreng. in) Ludw. *Krypt. Gew.* Cent. I. n. 17.

In saxis, in *Asciburgo* Ludw. 24.

Foliis longissimis, seta, quamquam sporangium folia perichaetialia non superet, pro longitudine tamen satis conspicua, sporangio ipso, non elliptico quidem, uti habet Smith, sed exacte ovali, habitu denique pusillo, omnino differre videtur a *Gr. apoc.*, cum qua iisdem gaudet nervi atque apicis diaphani, qui maxime argentibus vitris hinc inde denticulatus, rationibus. Anglica atque silesiaca specimina vix ullis numeris diversa observamus.

3. *Gr. cribrosa* Hedw., foliis lanceolatis; sporangio ovato; dentibus cribrosis. *Hedw. Stirpp.* III. t. 31. A.

In schisto pr. *Goslar.*, basalte m. *Weissner Hass.* Schrad. Pers. (vix hucusque alibi, nec extra German., nisi forte in *Helv.*, in *valle Sanensi.* Schleich. Cent. 2. n. 14., cujus peristomium non vidimus, caetera convenientia observavimus.) 4.

In hac nervus folii in perichaetialibus exacte ad apicem diaphanum procedere nobis videtur, apex, quamquam piliformis, e substantia folii solummodo constare. In vulgari *apoc.* specie nervus infra apicem diaphanum evidenter evanescens.

4. *Gr. plagiopodia* Hedw., foliis ovatis; sporangio ovato; seta lateraliter inserta; dentibus varie pertusis. *Hedw. Specc.* t. 15. ff. 6-13.

Grimm. *obtusa* Brid. in Diar. b. Schrad. 1800. I. p. 276.; ipso in *Suppl.* teste.

In rup. pr. *Jen.* et *Ratisbon.* Flörke. 24.

Foliorum perichaetialium apex diaphanus in hac e nervo et substantia folii oriri videtur. Dentes peristomii hujus speciei et Gr. *Schleicheri* Spreng., peristomia si conferas Trichch. *pulvin.* et *ovati*, affinitatem manifestam reddunt *Grimmiae* inter et antiqui *Dicrani* genera, uti alio loco Gr. *nudae* Smith. s. Weiss. *roseae* Wahl. peristomium, cum iis Didym. *inclin.* et novae Wahlenbergianae speciei, *latifolii*, collatum, nexum comprobat *Grimmias* inter et *Didymodonta*.

†† seta e foliis perichaetialibus emersa.

a. sporangio elliptico, aequali.

α. operculo rostrato.

5. Gr. *controversa* Schrad., caule subsimplici; foliis subulatis; sporangio aequali, operculi rostro obliquo. *Dillen.* t. 48. f. 43. *Hedw. Stirpp.* III. t. 5. B. (*Weissia*). *Specc.* t. 11. ff. 7-13. (*W. microdonta*).

Schrad. Samml., *Bryum viridulum* auctt. et scriptt. Linn., non herb., *virens* Dicks., Weiss.

viridula Hedw. Fund. (cf. *Specc.* p. 68.), *crispa* Timm. (Br. *luteolum* Hoffm.), *Afzelia* Ehrh.

In terra sabulosa. Primo vere. 24.

In hac folia siccitate insigniter tortilia. — De-
lenda in *Roth. Fl. Grimm.* *viridula* (a qua alie-
nissimum *Dicksoni* synon.) et Gr. *crispa*, in *Brid.*
Musc. Weiss. *virens* (excl. syn. Br. *viriduli* auctt.),
W. paludosa (excl. syn. Linn., quod ad Gr. *pus.*
pertinet) et *W. viridula* (excl. syn. Dicks.) —
Weiss. microodontam Hedw. et Mich. bor. am., sec.
auctt. specimm. plane easdem, caule brevior, fo-
liis patentioribus, parumper brevioribus, a vulgari
nostra planta distinguere non valemus. Hanc for-
mam ex *Brid. Suppl.* in Sudet. m. *Schneeberg*
quoque *Ludwig*, et in m. *die Hube* pr. *Eimbeck*
nuperius ipse Cel. *Bridel* legerunt.

6. Gr. *crispula* Turn., caule di-
viso; foliis lanceolato-subulatis, ere-
cto-patentibus, subhomomallis; spo-
rangio aequali, operculi rostro obli-
quo. *Hedw. Specc.* t. 12. ff. 1-6.
(*Weiss.*).

In sax. (v. c. pr. *Erlang.*, *Goett.*, in *Bohem.*).
Aestate. 24.

7. Gr. *cirrata* Schrad., caule di-
viso; foliis lanceolatis, patentibus;
sporangio subinaequali, operculi ro-

stro obliquo. *Dillen.* t. 48. f. 42.
Hedw. Specc. t. 12. ff. 7 - 12. (*Weiss*).

Schrad. Diar. bot. 1799. 2. p. 58., *Mnium* L.,
Bryum crispatum Hoffm. (excl. syn. Dicks., quod
ad *Gr. striat.* pertinet), *Gr. crispata* Roth. (excl.
syn. Dicks.), *Weiss. Dicksoni* Willd. berol. (*Grimm.*
Roth. et Anglor.).

In paludosis. Aestate. 24.

Statura minor, ut in antecedente. Cel. *Smith*
a *Willdenowio* hanc cum *Gr. controu.* confusam
esse contendit; quo jure nescimus. *Grimm. con-*
trou. enim ipse Cel. *Willden.* pro *Weiss. paludosa*
sua olim dicta nobiscum communicavit, *Grimm.*
cirratam pro *W. Dicksoni*. Sed cur ipse Cel.
Smith contra principium nominum antiquissimo-
rum semper restituendorum, *Mn. cirratum* L. *Gr.*
cirratam nuncupatum non vult, sed potius hoc
nomine insignit affinem speciem, nobis nondum
in Germ. obviam, nec alias notam, a quibusdam
florr. angl. pro *Br. cirrato* venditam? Forte ne
Dicksonus honore privatus sit *Grimmiae* suo ex
nomine dictae?

8. *Gr. curvirostra* *Schrad.*, fo-
liis lanceolatis, muticis; sporangio sub-
inaequali, operculi rostro recurvo.
Dillen. t. 48. f. 45., affirm. *Smith.* ex

herb. Dill. *Hedw. Stirpp. I. t. 7.*
(Weiss. *recurvirostra*).

Schrad. Samml., Bryum curvirostr. et rubell.
(Grimm. Roth.) Hoffm.

Gregatim in sabulosis, lapidosis sylvaticis. Aestate. 4.

„Habitu *Tortulas* refert” egregie monet *Turner*, et, nisi cum speciebus nominati generis sit confusa (uti Hudsono *Grimmia* haec *Br. setaceum* $\beta.$, *Barb. convoluta* *Br. setac.* $\alpha.$ fuit, ac *Dillenius* quoque ambos muscos juxta invicem seposuit), vix perspiciendum esset, quo modo ab antiquioribus post *Dillenium* botanicis negligi ac omitti potuerit. Cum *Grimm. heteromalla* *Bridel* quidem in *Diar. bot. Schrad. 1800. l. p. 279.* *Br. rubell.* Hoffm. conjungendum judicat. Sed ab ipso Hoffmanno vidimus exempla, et multoties rarior *Gr. heterom.* in vulgaribus locis cum *Enc. vulg.* nunquam legitur. — Sub nomine *Weiss. bipartitae* in quibusdam nostratium herbb. hanc speciem quoque vidimus.

9. *Gr. lanceolata* *Schrad.*, foliis lanceolatis, concavis, apiculatis; sporangio aequali, operculi rostro obliquo. *Hedw. Stirpp. II. t. 23. (Leers.)*

Schrad. Samml.

In solo lutoso, argilloso, Vere. 4.

Cum quibusdam *Gymnostomis*, uti *trunc.* et *ovato*, ab antiquis botanicis vulgaris stirps confusa est. Ne in eundem incidas errorem caveas!

an huj. subdivisionis *Gr. latifolia* n: 20.?

β. operculo conico.

10. *Gr. heteromalla* Roth., caule flexuoso, subdiviso; foliis lanceolato-setaceis, homomallis; sporangio subinaequali. *Hedw. Stirpp. I. t. 8. (Weiss.)*.

Bryum Weissia Dicks. et Hoffm.

Rarius in viis cavis reg. subalp. Aestate. 24.

Aegerrime quidem hanc speciem discernes a *Didym. homomallo*, praeter peristomium, statura paulo altiori, operculo subincurvo vix dignoscendo, et certe ultima stirps apud nos multoties rarior; attamen e partibus stare non possumus amiciss. *Turneri*, qui ambos muscos vix specie distinctos censet. In *Lappon.* quoque veram *Gr. heter.* amiciss. *Wahlenberg* observavit.

11. *Gr. Starkeana* Roth., caule stricto, simpliciusculo; foliis oblongo-lanceolato-acuminulatis, apice recurvis;

sporangio aequali. *Hedw. Stirpp. III.*
t. 34. B. (*Weiss.*).

In solo lutoso (inter *Gymn. trunc.*) *Siles.* —
pr. *Braubach* ad Rhen. *Röhling* (miss.). Autum-
no. 24.

Folia patentia, apicibus recurvis, margine in-
ferne reflexo, superne plano. Operculum conve-
xo - s. subhemisph. - apiculatum, nec reapse coni-
cum. VV. CC. *Turner* et *Smith* rarissimam no-
stram plantulam in suis Opp. quoque Florae an-
glicae civibus adnumerarunt. Sed jam tum mo-
nuit *Turnerus*: „ab Hedwigii icone specimina no-
stra pr. *Eblanam* lecta, statura fere duplo majore
et colore intensiore discrepant.” Specimina Ebla-
nensia benigne nobiscum sunt communicata, peri-
stomio vero raso et nullo adente in hac specie
maximi momenti censendo operculo. An hoc An-
gli viderint? *Smith* se non vidisse expressis ver-
bis fatetur, et *Turner* „breve, convexum” id pro-
nuntians, forte in Hedwigii solummodo innisus est
auctoritatem. Caulem enim plantae „vix linea-
rem,” folia „amoene viridia” si dicit, fere necesse
est, ut ex Hedwigiana stirpe descriptionem sum-
sisset. Hibernicus muscus scil. uncialis, caule 6
lin., semper diviso, noster 2 - 3 lin., caule unius
lineae, subsimplici. Folia caeterum et sporangii
orma in utraque conveniunt, at multo saturatiores

illa in externa stirpe. In *Bot. Guide* jam ipse Cel. Turner huncce muscum, bene certe, propriam speciem declarat, ei nunc audientem Grimm. *atrovirens*; insimul autem veram Gr. *Stark.* nunc quoque in *Angl. lectam* esse nos edocet. *Smith* etiam ad suam plantam allegaverat *Bryum minutum* Dicks. F. 4. t. 10. f. 17. Sed hujus musci statura quidem circiter nostrae Gr. *Stark.* (minime hibernicae), operculum vero nullus vidit, certe non descripsit, folia, ipsius Turneri, nec non Dicksoni fide, „angustiora, erecta, apicibus subconniventibus;“ ita ut perquam dubium et hoc videatur synonymum. Procul fere dubio tres distinctae species Gr. *Stark.* german., Gr. *Stark.* hibern. s. Gr. *atrovirens*, et Br. *minutum* Dicks.

b. *sporangio ovato, cyathiformi, pyriformi, cernuo.*

† 12. Gr. *aciphylla* Web. et Mohr., caule simplici; foliis oblongo-longius acuminatis, strictis, integerrimis, margine superne involutis; sporangio subovato, subaequali.

Weiss. *Wahlenb. inst.*, *W. nana* Hedw. fil. *inst.*

„In argillosis, saxosis duc. *Megap. starg.*, rarius.“ *Schultz.* (pro *Weiss. starkeana*). 24? (ex

ins. *Gothland* Wahlenb. retulit; unde Hedwig. habuit, nescimus.)

A Gr. *Stark*. habitu, foliorum directione, forma caeterisque rationibus, sporangio, operculo, toto coelo distinctissima, licet similiis; cf. quae vix de foliis et operc. Gr. *Stark* monuimus, et infra descript. nostrae speciei. Wahlenbergii nomen triviale retinere justum duximus, cum procul dubio antiquissimum. Caeterum Hedwigiana stirps ex asse convenit.

13. Gr. *pusilla* Schrad., cauliculo simplicissimo; foliis e latiori basi selaceis, erecto-patentibus, subflexuosis; sporangio subcyathiformi. *Dillen.* t. 49. f. 53. *Hedw. Stirpp.* II. t. 29. A. (*Weiss.*).

Schrad. Samml., *Bryum paludosum* L.

In sax., praesertim calc. Aestate. ☉?

Folia hujus musci sec. summum nostrum Hedw. enervia. Nervo vero satis lato et in folio tam angusto maximam paginae partem occupante, attamen vitris convexioribus lustrando, ipsi ea instructa observamus. Nec quo jure dici posset a nostra, „folia ei esse siccitate non tortilia” capimus.

†14. Gr. *Seligeri* Web. et Mohr., cauliculo simplicissimo; foliis lanceo-

lato-subulatis, erectis, strictis; sporangio subpyriformi.

In sax. (calc.?) com. *Glatz. Seliger* (pro *Weiss. calcar.*) ☉?

Foliis saturate viridibus, nec flavescentibus, minime crispabilibus, haec nudo oculo differt ab antecedente. Sed ut cautius microscopica investigatione, accuratius praepremis foliorum pendens formas, maximopere habitu sibi similes plures hujus subdivisionis species discernas, utique necesse est. Ex Hedwigii enim verbis et figg., quibus folia *WW.* suarum *pus.* et *calc.* (hujus in *Spec.* t. 11. f. 3.) illustrat, has duas species toto coelo distinctissimas putares, quippe cum ex iis illa foliis enerviis, haec foliis longissime ex nervo, supra folii paginam excedente, apiculatis gaudeat. Simulac vero *Gr. pus.* folia revera nervo excedente instructa, ea *calc.* minime solummodo ex nervo apiculata, sed e folii ipsius pagina et nervo acuminata observaveris, multo minus ab invicem hae duae species Tibi distabunt. Attamen non cum amiciss. *Turn.* convenire possumus, dicente: „ipse tamen fateor, me nihil, quod ad species duas rite constituendas sufficiet, adhuc reperisse.” *Gr. calc.* folia habet lata basi instructa, subito, nec sensim, angustata in acumen admodum exilis diametri (ut, termino, prout videtur, male adhibito, „cylindracea” Angli haec

folia nuncupent). Praeterea nervus in hac specie non majorem, pro ratione, paginae folii partem occupat, ac in aliis muscis. In *Gr. pus.* contra folia ita angusta, ut, quamquam basi sint parumper dilatata, attamen fere capillaria, l. a suo origine setacea appareant. Quod ad nostram adtinet *Gr. Selig.*, habitu quidem et magnitudine prorsus congruit, imprimis cum *Gr. pus.*; sed folium fere lanceolatum, angustum quidem et elongatum, tamen minime ita exilis latitudinis, ut scrupuloso observatori, scil. microscopico, hujus folii forma confundi queat cum ea *Gr. pusillae*. Pagina folii in hac nova specie utrinque juxta nervum ita lata exstat, ut ratione ejus nervus non insigni diametro utatur. Denique folium superne ita pedetentim angustius evadit, ut cum eo *Gr. calc.* prorsus non confundi possit. Omnes igitur tres species revera distinctissimae, licet aegrius dignoscendae. *Gr. recurvata* denique a *GG. pus.*, *Selig.* et *calc.* cautius tum distinguenda, cum ejus seta recta in exsiccatis assurrexerit. — *Gr. calc.* nostrae Florae non accensemus, licet in *Suppl. Bridel* habeat: „nuperius *Seliger* in muris vetustis Silesiae invenit, ut ego in lapidicinis montis Seeberg prope Gotham.” Seligerianus muscus hic ipsissimus noster novus, et Bridelius forte nunquam veram anglicam stirpem vidit.

15. *Gr. trifaria* Web. et Mohr., caule simplici; foliis trifariam imbricatis, lanceolatis, obtusiusculis, erecto-patentibus, strictis; sporangio subcyathiformi-pyriformi.

Weiss. Brid. in *Diar. bot.* Schrad. 1800. I. p. 283., *tristicha* Ej. Suppl.

In m. *Capuzinerberg* Salisb. ad saxa. *Flörke.* ☉?

Vix nisi primo intuitu cum duabus anteceden-
tibus confundi potest.

16. *Gr. striata* Schrad., caule diviso; foliis lineari-suboblongis, apice denticulatis, erecto-patentibus, flexuosis, siccitate crispabilibus; sporangio cyathiformi, sulcato, ore amplo; operculi rostello incurvo, sporangii longitudine. *Hedw. Spec.* t. 13. ff. 5-10. (*Weiss. fugax.*).

Schrad. *Diar. bot.* 1799. 2. p. 57., *Bryum crispatum* Dicks. t. 7. f. 4. (pessuma), affirm. Smith., *Weiss. Ludwigii* Brid. olim, ipso teste.

In saxis arenosis subalp. Majo. Jun. 24?

Hedwigii icon quidem folia integerrima exhibit, et ita Cel. Smith ea describit; sed revera sunt, contra hujus generis universaliorē morem,

convexioribus vitris apice lenissime, evidenter tamen, denticulata. Nervus folii prope apicem delitescit. Castigandae quoque nobis videntur Hedwigianae sporangii et operculi sub 6 et 8. tab. cit. datae figg., quippe quae sporangium justo brevius, os contractissimum, rostellum denique operculi admodum breve sistunt, cum sit longissimum, et, bene monente Smith., „longitudine capsulae.” Sed Dicksonianae figurae ita plantae dissimillimae, ut ex iis haec minime erui queat, quo forte motus Swartz olim nobis dixit, se Dicksonianam stirpem diversam habere. (Injuste denuo ambas plantas uti diversas Bridelius protulit in Suppl., sub nominibus *W. fugacis* et *W. denticulatae*.) Habitu quidem ad hanc *Gr. striat.* accedit *Gr. schisti* (*Bryum* Gunn. Fl. norv. [Fl. dan. t. 538. f. 2.]), caulibus vero multo elatioribus, fere uncialibus, foliis siccitate, monente Smith., non crispabilibus, sed solummodo „incurvis,” colore saturatiore, statim dignoscenda. Maximi momenti autem notae diagnosticae accuratiori observantur examine. In *Gr. schisti* enim, vix hucusque in Germ. lecta, folia sunt revera setacea, canaliculata, madida recurva, minime, uti habet Smith., integerrima, sed toto margine, et non apice tantum, denticulata. Sporangium, jam bene admonente Smith., „basi strumosum” est, i. „apophysi obsoleta instructum,” cum in *Gr. striata* strumae

omni vestigio plane caret. Denique operculum in *Gr. schisti* fere tale, quale in *Gr. striata*, sed minus bene, Hedwig tradidit, nempe conico - breve rostratum, l., aequae Smithio jam auctore, „capsula duplo brevius.” — Dentes in nostra specie ita fugaces, ut, monente Hedw., „exempla spora evacuata facile pro *Gymnostomo* habeas,” et reapse ob sporangia sulcata cum *Gymn. lappon.* eam confusam vidimus. Statim dignoscendum *Gymnostomum* sporangio, quod dicunt, subsessili.

17. *Gr. recurvata* Hedw., caule subsimplici; foliis lanceolato-selaceis, erecto-patentibus, subflexuosis, subhomomallis; sporangio pyriformi. *Wulf. in Jacq. misc. 2. t. 12. f. 1.* (*Bryum setac.*). *Hedw. Stirpp. 1. t. 38.* (in Tab. nostr. VIII. f. 1. perist.)

In sax. subalp. densiss. grege per strata laete viridia effusa. Aestate. 24.

Exsiccatione seta, naturaliter incurva, erigitur. Tum plantulam ne confundas cum *Gr. pusilla* cave.

18. *Gr. acuta* Turn., caule diviso; foliis subulatis, subpatentibus; sporangio subpyriformi. *Dillen. t. 47.*

f. 34. *Hedw. Stirpp.* III. t. 35. (*Weiss.*).
Spec. t. 14. ff. 6-12. minus aptae
(*W. rupestris*).

Bryum Huds. et Dicks. h. sicc., Br. *splachnoi-*
des Dicks. Fasc. (excl. syn. Fl. dan., quod ad
Grimm. *schisti* pertinet), uti var., fide *Turn.* et
Smith.

In sax. madidis subalpestrium *Siles.*, *Salisb.*
(Rathhausberg) *Carniol.* Aestate. 2.

Exempla quoque *W. rup.* ab ipso summo *Hed-*
wig in plagulis herb. adglutinata, quorum inqui-
rendorum amiciss. R. A. *Hedwig* humanissime an-
sam praebuit, aequae ac illa, quae a detectore spe-
ciei, *Ludw.*, accepimus, nervo foliorum gaude-
bant, ita ut male denuo *Turner* folia enervia nun-
cupet. Humani quid ergo summo muscologo ac-
cidit; sed et forte nobis ipsi. Monente enim jam
sagac. *Swartz* admodum hodie proclives sumus,
Grimm. nostram *rupincolam* It. Suec. t. 2. f. 3.
a - d. ipsis inam putare *Weiss. acutam* H. *Stir-*
pis nostrae habitus, singulaque caetera plane eadem.
Nullus vero omnium, qui *Gr. acutae* hucusque
mentionem fecerunt, scriptorum, seta eam in vivo
statu insigniter curvata uti adnotaverat. Nostrae
Gr. rupinc. omnes ita nobis observatae setae. Di-
judicent itaque, qui in recenti statu genuinam *Gr.*
acutam viderunt, num uterque muscus differat,

nec ne. Si noster vere novus non est, certe ex errore nostro nova detecta atque firmata erit Hedwigiani nota characteristicam, et in eadem culpa quod simus cum oculatiss. Hedwig et Dickson, quorum uterque bis speciem enumeravit, animum non despondebimus. „Apophysis valde obsoleta,” quam habere dicitur Br. *splachnoides* Dicks., in nostris speciminibus quoque adest.)

19. Gr. *nigrita* Roth., caule diviso; foliis ovato-longe acuminatis; sporangio obovato, cernuo. Hedw. Stirpp. III. t. 39. (*Weiss.*).

In solo argillo humido *Algov.* pr. Oberndorf, Sonthöfen detex. J. A. Frölich. 24.

Sporangium maturum nigrum, splendens, sulcatum. Operculum convexo-brevius et obtusius acuminatum. — In *Suec.* m. *Omberg* minoris staturae, maxima in *Lappon.* et *Helv.*

20. Gr. *latifolia* Web. et Mohr., caule simplici; foliis cordato-ovato-acuminatis, conniventi-imbricatis, nervo infra apicem evanescente; sporangio ovato.

Weiss. Schwaegr. in Schultes Reise II.

In rup. micac. *Heiligenbluter-Tauern*, ultra nives. ☉. Schwaegr.

„Caulis exiguus. Folia aetate albida, ut Bryi *argentei* emarcida. Margo apicis foliorum undulato-crenatus. Operculum rostratum. Foliis similis Br. *Forsteri* Dicks.” (*Grimm.*? *Smith.*), „sed differunt folia Br. *Forsteri* reticuli areolis omnibus circularibus (quae in nostra ad basin subparallelopipedae, versus apicem ovato-circulares), multo minoribus, colore nigroviridi, secund. specimina. Tota denique toto habitu differt.” *Schwaegr.* l. c. Ipsi plantam nondum vidimus, sed bona auctoritate inter nostras recipiendam judicavimus. Ex fig. Dicks. Br. *Forsteri* dubie haesitamus, an ad subdivisionem „sporangio elliptico,” l. ad hanc haec species pertineat. Ex verbis *Schwaegrichenii* huc retulimus.

•• seta alari (*Pterigynandra* Hedw., excell. speciebus calyptra paraphysiphora instructis).

21. Gr. *ornithopodioides* Web. et Mohr., foliis ovatis, acutis, binerviis, nervis obsoletis, divergentibus, infra medium evanescentibus, apice serrulatis. *Dillen.* t. 41. f. 55. (collatis a Dicks. datis cum Hedwig. specim.). *Hedw. Stirpp.* IV. t. 6. (*Pterig. gracile*).

Hypn. Huds., *H. gracile* L.

In fagis (sec. alios quoque in saxis) v. gr. „in
agri fluminensis sylvaticis” *Host. Syn.* (sec. spe-
cimm. collata). Febr. 24.

Hypno myosuroidi H. habitu quodammodo si-
mile. Caulis enim repens, ramis erectis, arbuscu-
loideis, ramulis fasciculatis, recurvis. Sporangium
ellipticum. Operculum conicum, subobliquum.
Calyptra sec. *Smith.* in *Engl. Bot.* (t. 1035.) pa-
raphysiphora, l., quod dicunt, sursum pilosa; et
tum esset nostra ex methodo *Leptodontis* *) gene-
ris species. Cum vero hanc calyptram ipsi non
observavimus, hodie in hoc genere muscum reti-
nuimus, sed in ambigua re, deque stirpe apud
nos hucusque raro observata lectores monitos vo-
luimus. — Fide *Schrad.* in *Herc.* praeter *filifor-*
mem speciem et nuperrime detectarum unam, sit
l. catenulata *l. cylindracea*, nullum provenit *Pteri-*

*) In *Mohr Obs.* p. 27. e *Pterigynandris* Hedw.
calyptra sursum pilosa gaudentibus hocce ge-
nus constructum. Species hucdum notae om-
nes erant exoticae, americanae *Pt. trichomi-*
trion (cf. in fine hujus generis sub lineola
Observ.) et *Pt. subcapillatum*, nec non *Hypn.*
Smithii Dicks. (*Mich. gen.* 114. n. 98., ino-
nente *Smith.*), in *Ital. sept.*, *Gall. merid.*, in
Barbar., ad *Cap. b. sp.*, in *Britann.*, sed hu-
cunque non apud nos, quamquam etiam in
Helv. (*Neckera bipinnata* *Schleich. Crr. helv.*
C. IV. n. 22. s. fr. !) lectum. *Lasia* genus *Bel-*
visio audit.

gynandrorum Hedwigii, nec, uti *Ehrhart* contendit (*Beytr.* 3. p. 79.), *Gr. ornithopod.* Quare quae de musco hercynico habent *Hoffm.* et *Roth* in suis *Fl.* (cf. *Hoffm. Add.*) sunt delenda. Neckeri vero *Hypn. palatinum* an idem sit cum nostro musco, quis nunc extricabit? Hoffmanni Rothique autem citata *H. palatini* Dicks. quid sibi velint plane nescimus, cum nullum habet Dicksonus hujus nominis Hypnum. Monet quoque Cel. *Bridel* in *Diar. bot. Schrad.* 1800. I. p. 277., se *Pter. grac.* acceptum possidere ex *Alpp. Salisbb.* sub nomine *Pt. filiformis*. Haec planta est nostra *Neck. decipiens*: v. infra. — *Gr. gracilem* hanc speciem dixissemus, nisi vetassent *Gr. gracilis* Mich. bor. am. (sec. P. Beauv. *Grimm. acuta*), et *Gr. gracilis* Schleich. *Cent.* 3. n. 14., quae, uti supra monuimus, ad *Gr. apoc.* pertinet. — Nostrae denique *Gr. ornithopod.* folia enervia dicens *Smith*, microscopium compositum non adhibens in muscorum investigatione in errorem inductus esse videtur. Quam enim sint obsoleti gemeli ad basin nervi, attamen adsunt, recte judicante Hedw.

22. *Gr. filiformis* Web. et Mohr., foliis ovato-acuminatis, enerviis, apice serrulatis. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 7. (*Pterig.*).

Hypn. Timm.

in fagis subalpestrium — *duc. megap. Herc.*,
copiosiss. in m. *Weissner* Hass., in m. *pinif. Fran-*
con. et in Germ. australi (vix hucusque in boreall.
Europae plagis lecta). Vere. 24.

„Aliquam habet cum *Lesk. attenuata* similitu-
dinem" Brid. Caulis ramique filiformes, decum-
bentes. Sporangium ellipticum. Operculum con-
vexo-rostellatum, rostello subincurvo. Calyptra di-
midiata, calva. Unicum est in hoc genere (quoad
species germanicas) exemplum speciei foliis plane
enerviis gaudentis. Sed male haec folia Hedwi-
gius noster integerrima exhibuit, quo in errore
Rothius eum secutus est. Sunt revera apice ser-
rulata, et quidem non minus evidenter ac ea prae-
cedentis speciei. Quomodo factum sit, ut cum
antecedente haec a quibusdam confunderetur vix
capimus. Sic etiam *Pterig. gracile* Schleich. Cent. 1.
n. 9. huj. l. esse omnino videtur, distinctissimum
a *Gr. ornithopod.*

*23. *Gr. ? catenulata* Web. et
Mohr., foliis cordato-acuminatis, uni-
nerviis, nervo versus acumen evane-
scente, integerrimis, erecto-appressis.
Brid. musc. II. P. I. t. 5. f. 4. miran-
da (Pterig. ?).

In arborr. Alpp. Salisbb. Flörke. 24.

Caulis adscendens. Rami subfasciculati, incurvi, subhomomalli. Caeterum ex teneritate ramorum quantum pendeat, idem habitus ac antecedentis et insequentis speciei, ut omnes tres microscopio utique sunt lustrandae. — Hujus fructificatio ignota; quare genus incertum. Sed ramis foliisque (quorum unum satis juste depictum a Bridelio) plane conveniunt Salisburgensia Flörkeana ac Helvetica Brideliana exempla.

†24. *Gr. cylindracea* Web. et Mohr., foliis ovato-longe acuminatis, uninerviis, nervo excurrente, integerimis, subpatentibus.

Pterig. longifolium Schleich. Crr. helvv. Cent. IV. n. 8., in valle *Salvan.* ad rupes lectum, plane idem ex partibus vegetationis; fructus vero cum ei desit, et ita prorsus certi quid non determinandum, nostrum nomen, ne confusio forte exoriretur, retinere maluimus.

In arb. ? (com. *Glatz. Seliger*, lucusque rariss.) 24.

Ne oculo nudo investigatum muscum cum antecedentibus confundas cave. E peristomio dignoscas a *Leskiis Hypn*isque externa forma similibus. An idem, excell. synn., *Pterig. nervosum* Bridel. Suppl. ?

Gr. *obliquata* Host. quid sit, plane nescimus; ergo speciem in nostrarum numerum recipere nequimus. In *Styr. alpp. judenbb.* lecta dicitur.

Pterig. quoque *trichomitron* Hedw. (*Leptodon* nobis; v. supra), sec. allatum in Hedw. *Spec. Musc. Hypni Saladiniani* Neck. *synon.*, intra antiquos Germ. fines, in *Flandria*, observatum quidem exhibetur. Dubitare tamen nobis liceat de re minime extra ambiguitatem posita. Caeterum tanti viri pace, vix in sententiam abire possumus amiciss. *Turneri*, qui in *musc. hib.* p. 102. *Dillenii* stirpem t. 85. f. 15. ex herb. *Dill.* ad *Pterig. julac.* Ha. non ad *trichomitron* pertinere contendit. Certe fig. nullo modo cum illa, exactissime cum hac specie quadrat.

28. *Didymodon* Schreb. *)

Dentes per paria approximati (semper erecti).

Calyptra dinidiata.

* dentibus 16.

1. *D. inclinatum* Sw., foliis distichis, e lanceolata vaginante basi se-

*) Hujus generis omnes nostrae species foliorum nervo, et singulo, gaudent.

taceis; recurvis; sporangio ovato, sub-
cernuo. *Hedw. Stirpp. II. t. 27. (Cynontodium [Swartzia] *)*).

Ad rupes Salisb. Flörke. Aestate. 24.

Peristomium 16 dentium, nec a *Smith*, nec ab *Hedw.* juste observatum. Ille enim „aequidistantes, nec per paria approximatos” dentes nuncupat. Quam vero levis sit eorum approxinatio, tamen adest. Caeterum unusquisque dentium, si ab ore sporangii tertiam ejus supergresseris longitudinis partem, non, uti *Hedw.* habet, medio notatus est singula linea, in qua foramina pauca conspiciunda, sed saepe saepius, more fere dentium *Grimm. plagiop.* lineis 2 ad 3 signatus, quae lineae non raro totidem evadunt fissurae, cruribus apice distincte separatis, ut et hic muscus cum affini novo, *Wahlenbergiano* *Did. latifol.*, transitum demonstret a generibus dentibus integris ad ea dentibus divisis. Cff. quae de *Grimm. nuda* *Smith.* sub *Gr. plagiop.* supra adnotavimus. Dictum *Wahlenbergianum* e litt. mar. glac. ad *Ki-strand Finmark.* allatum *Did. s. Cynont. latif.*, peristomio et sporangio cum nostro eximie congruens, *foliis sparsis, ovatis, apiculatis, erectis,*

*) Flore hermaphrodito.

affatim differt. — In *Did. inclin.* sporangil os minime dilatatum, quod Smith esse asserit.

** dentibus 32.

2. *D. capillaceum* Schrad., foliis sparsis, e latiori vaginante basi setaceis, undique recurvis, subintegerrimis; seta recta; sporangio subcylindraceo, obliquo, operculo conico, brevi. *Hedw. Stirpp.* II. t. 26. (*Cynodont.* [Swartz]) *Sturm.* 6. (in Tab. nostra VIII. f. 2. peristom.)

Schrad. Spicil.

In montosis. Apr. Majo. 24.

Folia minime exacte disticha, quod Cel. *Hedw.* habet, sed inferiora sparsa, suprema subdisticha, ut melius jam omnia talia declaraverit *Turner.* Similitudo, quam hoc inter et *Dicr. heterom.* intercedere admonet Cel. *Roth.*, sane non ita eximia, ut tironem seducat.

+ 3. *D. longirostrum* Stark., foliis sparsis, e latiori basi subulatis, canaliculatis, subintegerrimis, falcatis, homomallis, nervo obsoletissimo; seta flexuosa; sporangio elliptico, subae-

quali, operculo rostrato, subaeque longo, rostello subincurvo.

Ad trunc. putr., in sylv. subalp. com. *Glatz*, in *Sudet.* Omni anni temp. sporangia mature-
scit. 24.

A quibusdam nostratium, uti vidimus, hocce
superrime sumtum pro *Br. frag.* Dicks. (cf. *Dicr. flex.*), quo inducti hi quidem Dicksonianum mus-
cum distinctam crediderunt speciem. Peristomio,
cujus dentes in *D. flex.* vix supra medium divisi,
sporangio longiore, non, ut in *D. flex.*, sulcato,
foliis (insigniter homomallis) affatim differt. Huic
affine *Didym. flexicaule* Schleich. *Crr. helvv. Cent.*
4. n. 9., distinctum videtur caule altiore, flexuoso,
foliis multo brevioribus, nec falcatis, marginibus
planis, apice subintegerrimis, basi angustioribus;
seta vix flexuosa; operculo dimidiae tantum spo-
rangii longitudinis; toto habitu. — Demum absque
fere dubio (tum ex descript., tum ex memor. cum
Dicr. longif. affinitate) hujus quoque l. *Dicr. de-
nudatum* Brid. *Suppl.*, excell. et ad *Dicr. flex.* re-
ductis omn. synonym., quae ullius sunt momenti,
scil. *Smith.*, *Turn.*, *Swartz.*, *Dill.* Nunquam fa-
tigabitur Cel. *Brid.* tenuibus et de superficie hau-
stis observ. muscologiam confundere.

4. *D. homomallum* Hedw., fo-
liis e latiuscula basi setaceis, integerri-

mis, homomallis; sporangio oblongo, subinaequali, operculo conico, subincurvo. *Hedw. Specc.* t. 23. ff. 1-7.

„Ad vias declives in *Lusat.* montosis” (Hedw.), in *Herc., Francon.* (Schwaegr. Funk.), *Jenaa* in *Zeizgrund* (Flörke), et certe plurimis locis, ubi usquehunc Grimm. *heterom.* lecta esse dicebatur. „Octobri” (Hedw.). 2l.

Simillimos caute distinguas muscos *Dicr. tortile*, *Didym.* hoc, et Grimm. *heterom.* Ulteriores duae species vix differunt, nisi peristomio et operculo, in *Didym.* parumper incurvo. *Dicr. tortile* ex operculo e basi convexa rostellato, nec conico (praeter peristom.) discernas. Male autem Cel. *Smith.* *Didym.* nostro 8 tantummodo adscribit dentium paria, et inter *Grimmias* speciem enumerat. Insequenti *Did. pusillo* summ. ipse *Hedw.* nostrum „valde simile” pronuntiat, differens „foliorum vestitu densiore, directione unilaterali; sporangii ora annulata.” Inprimis vero amborum muscorum folia toto coelo diversissima. De sexu in hoc *Hedw.* nil admonuit. An flores masculi terminales, l. alares?

5. *D. pusillum* Sw., foliis lanceolatis, subserrulatis, subhomomallis, erectis, strictis, et siccitate; sporangio oblongo, recto, operculo conico-

acuminato, acumine subincurvo. *Hedw. Stirpp. I. t. 28. (Trichost., Hedwigio prius Trichostoma sua atque Didymodonta separare nolente.)*

In locis arenoso-lutosis, apricis, *Saxon., Austr., in Sudetis, duc. megap. Vere. ☉?*

Folia hujus capillaria qui dicat, sane egregie aberrat a veritatis tramite. — Ne cum *Dicr. tort.* affinibusque speciebus, scil. *Trich. tenui* Hedw. et *Barb. curta* ej., nostrum confundas, ex peristomio imprimis cura. Simile quid *Schumachero* accidit, cujus in *Fl. Saell.* enumeratum *Did. pus.* ex specim. verum *Dicran.* esse agnovimus. Male in *Hedw. Specc.*, nescimus quo fato, *Didymodontibus „flos masculus et femineus axillaris”* tribuitur, cum hic semper terminalis, ille hucusque tantummodo in hac specie alaris observatus est.

6. *D. glaucescens* Web. et Mohr., foliis elongate lanceolatis, serrulatis, erecto-patentibus, subflexuosis; sporangio oblongo, aequali, operculo conico-rostrato, rostro incurvo. *Hedw. Stirpp. III. t. 37. B. (Trichost.).*

In Alpp. *Carinth.* Schwaegr. (*Schultes Reise II. p. 357.*) in *Ascib. Ludw. Aestate. 24.*

Connexio inter peristomii dentes binos quam *Hedw.* l. c. fig. 11. depinxit, pace summi viri et acutissimi Swartz., certe nulla exsistere nobis in sexcentis Upsal. lectis speciminibus visa est iterumque visa, qua ex causa stirpem, sub hoc *Didymodontis* genere enumerare debuimus. Ex masculis femineisque floribus distinctis (ambobus terminalibus) Hedwigiana quoque ex methodo *Didym.* *) strictiori sensu esset. A *Did. trifar.* autem nostrum sexu differt, sporangio oblongo (nec ovato), duplo longiore, foliis elongate lanceolatis, erecto-patentibus, sparsis, subflexuosis, pallidis (nec ovato-lanceolatis, brevibus, patentibus, exacte 3stichis, rigidiusculis, intense viridibus). Praecedenti speciei proximum quoque, foliis duplo longioribus bonis vitris evidenter serrulatis, sporangio pro ratione stirpis maximo, caule satis procero, ramosiusculo, distinguendum.

7. *D. rigidulum* Hedw., foliis lanceolatis, recurvo-patentibus, integerrimis, obtusiusculis, siccitate crispabilibus; sporangio oblongo, operculo rostrato, subaeque longo, subincurvo. *Hedw. Stirpp.* III. t. 4.

*) scilicet monoicum genus.

Trichost. *angustatum* Schrad. ?
In muris, saxis irriguis. Vere. 24.
„Habitus omnino *Tortulae*” bene habet Turn.
Ob perist. breve tamen vix cum hujus generis speciebus nostrum unquam confundes. Inter *Didymodonta* foliis siccitate crispabilibus, intense, nec amoene, viridibus, habituque exinde lurido, statim dignoscendum. Facies quodammodo quoque accedit ad eam Grimm. *curvir.*; sed haec duplo altior.

Ex Host austr. enumerandum quoque esset Did. *trifarium* Sw. (*Hedw. Stirpp.* II. t. 28. [*Swartz.*]), de quo praecipua jam monuimus ex anglicanis speciminibus a Swartz. communicatis sub Did. *glauc.* Stirps haec ita rara, ut, donec indigena ipsi viderimus ejus exempla, omittere eam maluimus, quam temere incerti et forte falsi quid proferre.

29. *Dicranum Schreb.*

Dentes divisi, l. basi liberi, l. omnes connexi, illorum cruribus strictis, l. subtortis, horum strictis. *Calyptra* dimidiata.

* foliis distichis, verticalibus (Ehrh. Beitr. III. p. 164.), basi superne duplicatis, vaginantibus, scalpelliformibus (*Fissidd.* Hedw. *)).

1. *D. viridulum* Sw., caule declinato; seta terminali; sporangio aequali, erecto. *Dillen.* t. 34. f. 1. *Hedw. Stirpp.* III. t. 29. (*Fiss. bryoides*). *Theor.* t. 13. ff. 5-10. *Specc.* t. 38. ff. 7-10. (*F. exilis*). *Swartz. suec.* t. 2. f. 3.

*) Monoici. Species hujus subdivisionis, quibus exoticæ omnium terrarum plurimæ, accuratius tamen distinguendæ, in posterum certo certius accedent, mire inter se cognatæ et, quod hodie perspicimus, aequæ remotæ videntur a toto reliquo muscorum græge; quo cupidi naturalium in artificiali methodo generum, characterem pro his satis distinctivum hucusque vix ac ne vix quidem inveniendum valde lugebunt.

Bryum Linn. herb. et Dicks., non auctt. caett.,
nec scriptt. Linn.

Ad terr. nud., in sylv., paludos.; fere ubique.
Vere. ☉.

Omnino cum amiciss. *Swartz* (Diar. bot. Schrad.
1800. 2. p. 177.) et cum *Turn.* in Musc. hib. Hed-
wigii *Fissid.* *exil.* et *bryoid.* plane eosdem putare
debemus, quamquam contrarium nuperrime denuo
statuerit Cel. *Smith*, qui in hoc quoque errat, ut
Rothii *Grimm.* *viridul.*, dubie tamen, hic alleget.
Haec, excl. syn. *Dicks.*, *Grimm.* *controv.*, s. *Br.*
virid. auctt. est.

† *D. incurvum* Web. et Mohr.,
caule declinato; seta terminali; spo-
rangio subcernuo, nutante.

Fissid. amiciss. *Stark.* mst., *Hypni bryoid.* var.
Hoffm. in Add. ad Fl., *Dicr. tamarindifolium* *Turn.*
et *Smith.*?

In iisdem cum praecedente locis eodemque
temp. ☉.

Nullum fere nobis dubium, quin nostrum sit
D. tamarindif. *Turn.* et *Smith.* Folia, quod An-
gli de sua stirpe perhibent, pallide viridia et la-
tiora atque magis arcte imbricata ac ea anteceden-
tis speciei. Tamen operculum exacte conicum suo
musco Angli adscribunt, quod in nostro convexo-
rostratum; quo commoti usitato in Germania per

plures annos nomine nostrum insignire maluimus, quam non prorsus probato assumpto alieno confu-
sioni ansam praebere. Cum Dier. suo *palmato*
Swartz olim nostrum idem esse nobis confirma-
vit. Ex speciminibus vero, quae ipse benigne de-
dit, non tam foliis, multoties tenerioribus, quam,
et imprimis, sporangio exacte cernuo, operculoque
eo longiore, quod in nostro duplo brevius, Jamai-
censem muscum distinctum censere debemus.
Angli hunc quoque a sua stirpe distinguunt. Hoff-
manni muscus l. c. ad hocce Dier. *incurv.*, nec uti
Swartz. voluerat in *Musc. suec.* p. 85., ad vulga-
rem stirpem pertinet.

3. *D. bryoides* Sw., caule ere-
ctiusculo, simpliciusculo; seta termi-
nali; sporangio aequali, erecto. *Dicks.*
t. 5. f. 5. (*pessuma*. *Hypn. asplenoid.*,
excl. syn. *Swartz.* [cf. *Swartz.* in *Diar.*
bot. Schrad. 1800. 2. p. 177.]). *Swartz.*
Suec. t. 2. f. 4. *Hedw. Specc.* t. 40.
ff. 7-10. (*Fiss. osmundioides*).

Hypn. L., fide Ehrh. et Sw., *Dier. osmundioi-*
des Sw. in *Act. Holm.* olim.

In udis (*Siles. Brid.* in *Diar. bot. Schrad.* 1800.
1. p. 292., *Duc. Megap.*). Vere. 24.

Caulis in hoc uncialis et altior, strictissimus.
Folia breviora et arctius imbricata, ac in *D. virid.*

a quo totus habitus diversissimus. *D. asplenoides* Sw., indicum *), a Dicksono cum hoc commutatum, foliis duplo et quod excedit longioribus, linearibus, colore pallidiore et statura ramosiore, non vero, uti vult Swartz. in *Musc. Suec.* p. 86., sporangio obovato, quod in nostro esset ovatum, differt. In utraque enim sporangium exacte obovatum. — Angli *Fiss. bryoid.* Hedw. cum ipso Hedw. porro pro genuino *H. bryoide* L. venditantes, nostrum Swartziano antiquo nomine insignant. Denique Turner *Hypn. Dill.* t. 34. f. 4. (*H. acacioides* L.), e *Patagonia* ad Dillén. allatum, ex herb. viri immort., idem suspicatur. Setae autem brevissimae huic opinioni contradicere videntur.

4. *D. adiantoides* Sw., caule erecto, subramoso; seta mediotenus alari; sporangio subcernuo. *Dillen.* t. 34. f. 3. *Hedw. Stirpp. III.* t. 26. (*Fiss.*) *Hypn.* L.

*) Ne velis cum hoc confundere *H. asplenoides* fronde subramosa, erecta, lineari, apice pedunculifera, caps. incurvis Thunb. *Prodr.* p. 175., quod ex speciminibus ab ill. fautore benigne donatis, quamquam sterilibus, aequè distinctum habere debemus ab omnibus germanicis et exoticis hujus subdivisionis speciebus.

In paludosis, ad rivulos. Vere. 24.

Omnibus numeris, immo foliis apice evidenter serrulatis, quae hanc speciem in suo tribu distinguunt, convenientem ex *Am. bor.* sub nomine *Fiss. subbasilaris* H. accepimus muscum. *Fiss. polypodioides* Hedw. nostro primo intuitu admodum similis, praeter caetera, foliis acutis, nec acumina-
tis, integerrimis, setis subterminalibus, sporangio inaequaliter pyriformi, e seta superne cygneum in modum arcuata nutante, nec obovato, subcernuo, facile distinguitur.

5. *D. taxifolium* Schrad., caule decumbente, simplici; seta alari, subradicali; sporangio subcernuo, nutante. *Dillen.* t. 34. f. 2. *Hedw. Specc.* t. 39. ff. 1-5. (*Fiss.*) *Sturm.* 2. (rudis).

Schrad. Samml., Hypn. L.

In humidis, umbrosis. Vere. 24.

Folia in hoc apice lenissime denticulata. Operculum hujus et *Fiss.* sui *subbasilaris* Hedwig l. c. justo multo brevius delineavit; nec nostri sporangium nutans solummodo, sed subcernuum, minimeque aequale. Caeterum *F. subbasilaris*, americanus, praeter minorem staturam, caulem erectum, setamque altius insertam, sporangio aequali, erecto, discernitur, et eo modo itaque fere sese habet ad *D. taxif.*, quo *D. virid.* ad *incurv.* Huic *Fiss.*

subbasil. Dicr. *bryoid.*, s. *F. osmund.*, habitu Hedw. simile pronuntiavit. Setae insertio utrumque muscum egregie distinguit.

•• foliis sparsis.

† enerviis.

6. *D. glaucum* Hedw., sphagnoidum, foliis ovato-lanceolatis, strictis, undique versis, erecto-patentibus, viridi-albis, integerrimis; sporangio ceruuo, strumoso. *Dillen.* t. 46. f. 20.

Bryum L.

In uliginosis, turfosis (rarius cum fructu). Aestate. 4.

Hanc speciem densissima grege in uliginosis pr. *Waake* Gött., quo etiam loco abunde fructum profert, Jung. *incisa* Schrad. incolit. — An specie differat *Sphagn. javense* Brid.? Commersoniana apud ipsum Cel. Brid. vidimus specimina, quae inter et vulgare *D. glauc.* medium quasi reperimus e Caribaeis allatum muscum (*D. glauc.* sec. Brid. in *Jamaica* lectum, quamquam Swartz. in Flora non habeat). Certe Brideliana stirps Dicranis associanda, a Sphagnis diversissima. — *Bryum* Dillen. t. 83. f. 8. (*Dicr. albidum* Brid.), quod e *Virgin.* et *Pensylv.* Dillen. habuit (male Brid. patriam ignotam

perhibet), ni valde fallimur, et nos e *Pensylv.*, una cum vulgari planta, accepimus; sed utrumque diversum habere non possumus. — Muscus vero e *Carolina* a Cel. *Bosc.* allatus, quique sine dubio *Dicr. glauc. pumil.* Mich. bor. am. („foliis acuminatis”), praeter minorem staturam, foliis ovato-acuminatis, quadruplo minoribus, apicibus recurvis differre, et ita fere sese habere viderur ad *D. glauc. vulg.*, uti *Sphagn. squarr.* ad *obtusif.*

†† uninerviis *).

† 7. *D. saxicola* Web. et Mohr., caule exilissimo, simplicissimo; foliis

-
- *) Aegerrime in plures minoris molis tribus iterum numerosissimae (quamquam a nobis vix satis distinctis multis diminutae) hujus subdivisionis pecies distribuuntur. Firmi limites tales circumscribentes tribus nulli inveniendi. A natura vero quam arctissime conjunctae species varie unaquaque partitione turpissime divelluntur. Nec in Hedwigii opere posthumo, ut singulum tantum laudemus exemplum, bene coordinatas hujus generis species reperis. Serie itaque, quae nobis quodammodo naturalis visa est, in hisce enumerandis usi sumus. Ne autem plane destitutus sit tiro ducente in tam multorum nominum labyrintho filo, insequens proponimus schema, quo in adhibendo accuratius vero singula quisque ut investiget, perquam necesse est. Foliis enim nervum, serra-

e latiori basi lineari-setaceis, integer-
rimis, undique vergentibus, siccitate
tortilibus; seta cygneo-arcuata; spo-

turas, ipsam sporangii strumam, qui non sedu-
lo rem pertractetur et convexissimis saepe
saepius utatur vitris, vix acquireret, uti inclytis-
simis eveniit muscologis, immo nostro Hedwi-
gio, ut has praeterviderint partes, quo ab eorum
sententiis discedere haud raro coacti sumus,
licet aegerime ita egimus.

A. foliis serratis

a. sporangio strumoso (cernuo)

strumiferum, virens, falcatum

b. sporangio absque struma

α. aequali l. subaequali (fol. homomallis)

longifolium, flagellare

β. cernuo

a. foliis homomallis

scoparium, undulatum, Schraderi

b. foliis undique vergentibus (siccitate in-
signiter crispabilibus)

*spurium, montanum, polycarpum,
pellucidum, gracilescens*

B. foliis integerrimis

a. sporangio strumoso (cernuo)

*squarrosum, Schreberi, Starkii, cervicula-
tum, ambiguum, pallidum, purpureum*

b. sporangio absque struma

α. aequali

*saxicola, flexuosum, crispum, tortile,
cylindricum, latifolium*

β. cernuo (fol. homom. l. subhomom.)

*rupestre, varium, rigidulum, hetero-
mallum.*

rangio aequali, elliptico, operculi rostro recto.

In sax. duc. *Brunsv. Schrad.* 24?

8. *D. flexuosum* Hedw., caule subramoso; foliis ex oblonga basi subulato-setaceis, nervo latissimo, integerrimis, undique vergentibus, siccitate strictis; seta recurvo-varieque flexuosa; sporangio aequali, ovali, operculi rostro recto. *Dillen.* t. 32. f. 3. (fide *Turn.* et *Smith*, remotis tamen sporangiis, quae „corpora extranea sunt” [Smith.], et excell., quorum Dill. mentionem fecit, specimm. groenlandd.) et t. 47. f. 33. *Hedw. Specc.* t. 38. ff. 1-6. *Turn. hib.* t. 5. f. 2. (fol. fig. mala).

Bryum flexuos. L. et *fragile* Dicks.

In turfosis. Aestate. 24.

Folium in hac specie, ut in sequente, latissimo et totam fere ejus paginam occupante, sed, quia dilutius coloratus est, obsoleto, et ita a *Brid.*, *Roth.*, *Smith.*, *Turn.* negato nervo percursum observatur, non recte ita conficiente summo Hedw., qui l. c. f. 5. vulgaris formae eum delineavit. Fru-

ctiferis hibernicis tab. cit. depictis speciminibus tandem *Turn.* Dillenii *Sphagn.* t. 32. f. 3. hujus *Dicr. flex.* var., ei *γ. piliferum* audientem, probavit. (Pilum tamen folii incanum in nostris ex ipsius Dillen. herb. depromptis specim., quae caeterum et nervo aequae lato cum vulg. *D. flex.* convenientia vidimus, non reperimus. Aetate forte, quod in pluribus accidit muscis, elapsus est.) Cum Dill. vero et hodierni Angli in errore sunt, si groenlandicum illum muscum, quem sub suo *Sphagno alp.* Linnéus solum intellexit, eundem putent cum *Snowdonensi* a Dillenio delineato. Certe diversissimus est angusto aequae nervo ac seta stricta sporangiisque cernuis. Tamen affinis *D. flex.* et ejusdem generis absque dubio species (cf. *Web. Br.* p. 79, 80.). Forte eundem muscum in Lappon. nunc quoque invenit amiciss. *Wahlenberg* (cf. *Spreng. Einl.* p. 272, 273.). Hunc enim *Swartz* plane non distinctum semper putavit, et nos, qui hucusque cum *Wahlenbergio* discrepantem eum censuimus, in *Swartzii* sententiam abire satis jam proclives facti sumus. *Dicr.* enim *elongatum* *Schleich.* Cent. 3. n. 27., postquam specimina ejus inquisivimus, mediam fere formam groenland. inter et *Wahlenbergianum* muscum sese nobis comprobavit. Ut ut sit, omnes tres laudatos muscos a *Dicr.* nostro *flex.*, et inprimis ejus var. *γ. pilif.*, posthac scrupulosior bene distinguat muscologus. Omnino affi-

nis quoque species *D. introflex.* Hedw. Specc. t. 29. ff. 1-7., bene monente Turn., qui quartae suae *D. flex.* var. *δ. elongatae*, quam non vidimus, nisi haec folii pilo careret, ad unguem conveniens dicit. Cum vero hanc variet. *δ. elong.* sterilem hucusque auctor tantum observasse videtur, vix quid determinandum esse putamus, annon forte ad unum trium pertineat muscorum, puta *Sph. alp. genuin.*, *D. elongat.* Schleich. et *D. Wahlenbergian.* Sed de raro *D. introfl.*, occasione data, nostris ex speciminibus quaedam monere lubet. Hedwigius nempe et ejus folium enerve depinxit, serraturas vero pilii, quarum in descriptione quidem mentionem injecit, in icone aequae omisit. Nervus autem, vulgaris latitudinis, omnino adest in hujus speciei foliis et apicis piliformis serraturae satis superque sunt visibiles, ut duplici respectu castiganda Hedwigii hujus folii figura. A *D. flex.* autem certe distinctissimum hocce *D. introfl.*, jam ex angusto nervo, reliqua ut taceamus. Hedw. Trich. *pulvin.* valde simile pronuntiavit; sed sec. quae ex toto habitu (cum calyptra nondum visa sit) sint autumanda, in nostro aequae ac in Hedwig. systemate ab eo vel genere discrepat. Inter consimiles tandem *D. flex.* species Dicr. adhuc enumerandum *Scottianum* Turn., quod quidem ipsum nondum vidimus, quod vero ex tab. Turn. (6. f. 1.) plane conveniens putare debemus cum *D. stricto* (ob *D.*

strict. [*Bryum* Hoffm.], *D. purp.* variet., male nominato) Schleich. Cent. 3. n. 26. Sed et haec stirps sporangio gaudet subcernuo. De Bryo *immerso* Dicks. ab omni *Sphagno alp.*, genuino et spurio, aequè distincto, v. infra sub *Dicr. vario*, de falso a quibusdam nostratium putato Dicksoni Br. frag. v. supra sub *Did. longirostro*.

9. *D. longifolium* Ehrh., caule ramoso; foliis elongatis, strictiusculis, nervo latissimo, serrulatis, homomallis; seta subflexuosa; sporangio subaequali, elliptico, operculi rostro subincurvo. *Hedw. Stirpp.* III. t. 9.

Ehrh. Decc.

In montosis, sylvaticis. Aestate. 24.

Nervum folii in hac specie plane praetervidit Hedw., et, quod scimus, omnes, qui eum secuti sunt. Revera ita latus est, ut fere nulla folii pagina. — Cum sequente, uti videtur, multi hunc muscum, eo certe vulgatiorem, confuderunt. Sic in *Crr. exss. m. pinif. amiciss.* *Funk* eum dedit pro *D. flag.* *Schleicher* vero, qui sub genuino nomine (*Cat. p. 61*) olim eum misit, nunc in Cent. I. n. 17. eundem denuo, sed foliis fasciculatim per intervalla collectis gaudentem, pro *D. interrupto* Brid. venditavit. Error sane singularis. Ex affinitate enim a Bridelio olim laudata *D. interrupti* et

D. flag., potius hoc cum illo confusum credidisses. Tandem ne confundas *Dicr. longifol.* cum *Didym. longirostro* cave.

10. *D. flagellare* Hedw., caule ramoso, elongationibus flagelliformibus; foliis caulinis serrulatis, falcatis, homomallis, iis elongationum minutis, concavis, appressis; seta stricta; sporangio subcylindraceo, subaequali, operculi rostro subincurvo. *Hedw. Stirpp. III. t. 1.*

In rup., arb. trunc., locis sylvosis. Aestate. 24.

Flagellis, quae caulis elongationes, ab omnibus aliis hujus generis speciebus recedit. A *D. longif.* cautius distinguendum. A Rothio quoque citatum Dill. *synon.* (t. 47. f. 38.) ad *D. interr. H.* pertinet. Nostrum ex Am. bor. a *Willd.* quoque accepimus.

11. *D. scoparium* Leyss., caule ramoso; foliis canaliculatis, apice triquetris, marginibus et carina serrulatis, falcatis, omnibus homomallis; sporangio obovato, subcernuo, absque struma. *Dillen. t. 46. f. 16. A. B. D. Sturm. 2. Turn. hib. t. 4. (D. majus*

Smith.). (in Tab. nostra VII. ff. 10. 11. perist. dens et cal.).

Bryum L.

In sylvis. Omni anni tempore. 2.

* *β. fuscescens*, duplo minus, ramis non ita diffusis; foliis minutius serrulatis. *Turn. hib. t. 5. f. 1.* (operculo justo duplo brevior; est enim, auct. et Smith. jam ipsis monentibus, sporangii longitudine, *D. fuscescens*).

Dicr. longirostrum Schleich. Cent. 2. n. 25., *rupestre* Brid. Suppl.?

Seta ex uno perichaetio singula, l. plures, ut nec ex his, nec uti vult *Turn.* foliis perichaetiall. femm. in *D. maj.* Smith. nervo instructis, in vulg. *scop.* eo destitutis, revera autem in hoc et illo uninerviis, nec ulla alia, quod vidimus, nota, praeter staturam majorem uterque muscus dignosci possit. *D. majus* quoque ex ins. *Gothland Suec.* accepimus, uti vulg. stirpem copiosius ex *Am. bor.* In summo cacum. m. *pinif.* Francon. nostrum ludit caule proceriore, foliis multo angustioribus, elongatius subulatis, ramis exinde multo gracilioribus *Funk.* Hoc quasi medium inter vulg. *D. scop.* et *D. maj.* Huic quoque quodammodo accedit *D. recurvatum* Schultz stargard., quod ex specimm. amiciss. auct. a *D. scop.* vulg. nullo modo distinguere possumus, quodque nullam sane

cum *D. longif.* affinitatem habet, bene jam momento critico in N. Leipz. Lit. Ztg. 1805. April. Quod ad var. nostram β . adtinet, praeter hibernica ab ipso Turn. missa specimm., germanica in cacum. m. *Ochsenkopf*, ad granit. lecta am. *Funk*, norvagica olim am. *Uldahl*, et ex ins. *Gothland* ab ipso allata sagaciss. *Wahlenberg* nobiscum communicarunt. Ex his omnibus specimm. primo Smithium vituperare debemus, hancce stirpem cum *Dicr. falcato* olim a *Schrad.* nuncupato, nostro *D. Schraderi*, eandem putantem (cf. Adnn. ad tin. sub *D. Schrad.*). Sunt, si quae aliae, diversissimae. Turner vero aequae ac Smith. *D. fuscescenti* folia integerrima adscribentes non minori sunt in errore (quamquam sint folia revera multo obsoletius serrulata, ac in vulg. musco), nec, uti vult Turn., folia perichaetialia feminea *D. fuscesc.* habet ab iis *D. scop.* diversa. Quibus ita se habentibus, nos quidem minime pro certo affirmare volumus, *D. fuscesc.* nil esse, nisi vulgaris stirpis varietatem. E contrario fatemur, ex numerosissimis, quae dissitissimis regionibus collecta possidemus specimm., potius propriam speciem quam var. id nobis videri. Cum vero pro diagnosi specifica sufficientes notas invenire nequivimus, in re non ita certa uti notabiliorem potius enumerare volumus hocce *D. fuscesc.* var., quam ambignis verbis in errorem lectores inducere. Caeterum a *D. flagell.*, quod inter

et *scop.* mediam suam stirpem Angli pronuntiant, sporangio toto coelo ea discrepat.

12. *D. undulatum* Ehrh., caule ramoso; foliis planiusculis, siccitate transversim plicatis, apice triquetris, marginibus et carina serrulatis, inferioribus subhomomallis, mediis undique patentibus, supremis conniventibus; sporangio obovato, subcernuo, absque struma. *Dillen.* t. 46. f. 16. C. (fide Turn. ex herb. Dill., vix fig. respond.). *Swartz. suec.* t. 3. f. 5. (*D. polysetum*, excl. syn. Schrad.)

Ehrh. Decc. et auctt. praeter Schrad., *Bryum rugosum* Hoffm.

In ericetis humidis. Aestate. 24.

Quamquam semper Schrader suum *D. undul.* cum Ehrhartiano et cum *D. polys.* Sw. idem, *Bryum* vero *rugos.* Hoffm. varietatem nobis declaraverit *D. scop.*, collatis specimm., quae ipse pro sua stirpe dedit, cum numerosissimis *Br. rugosi* e multis Germ. regionibus nobis missis, et cum *D. polys.*, quod cum ipso Swartz Holmiae legimus, quodque hic agnovit pro nostro *Br. rug.* illi communicato, non possumus non a recepta fere

auctorum opinione discedere. Minime vero et in hoc *D. undul.* folia perichaetialia feminea discrepant ab iis *D. scop.*, quod Turner adnotaverat, nec *D. hoc undul.* foliis uninerviis a *D. scop.*, quippe cui essent enervia, discernendum, quamquam ita statuit *Crom.* in *Hoppe Taschenb.* 1805. „Setae in hoc ex uno perichaetio 1-6,” monente *Swartz.* *Synonymum Buxb. Cent. 2. 8. t. 4. f. 1., D. scopario* hucusque adscriptum, ad hoc refert *Smith.* In *Am. bor.* stirps quoque observata a *Michaux.*

13. *D. Schraderi* Web. et Mohr., caule ramoso; foliis canaliculatis, undulatis et siccitate transversim plicatis, apice obtusiusculis, nervo infra apicem evanescente, serrulatis, subfalcatis, erecto-subhomomallis; sporangio obovato, subcernuo, absque struma.

D. undulatum Schrad. *Spic.*, non auctt., *falcatum* Schrad. olim mst., *Bergeri* Bland. *Muscc. fr. exss. 3. n. 114., intermedium* *Crom. Samml. n. 66., Schultz. starg., affine* *Fuuck. Crr. exss. m. pin. n. 136.*

In paludosis turfosis. Aestate. 24.

Folia apice obtusiuscula, nervo infra apicem evanescente, nec ita apice e nervo, carinam formante, triquetro, caeterum subfalcata, erecto-subhomomalla hanc speciem a duabus praecedentibus, a

quibus et toto habitu differt, insigniter distinguunt. Seta quoque in hoc semper solitaria esse videtur. Foliis perichaetialibus autem femineis, quae in *D. scop.*, *DD. maj.* et *fusc.* Angl., *D. undul.* et hoc certo certius sunt eadem, minime a *D. scop.* dinoscendum, uti Schrader l. c. perhibuit. Caeterum, quae adnotavimus ad speciem praecedentem, conferas. Hoc quoque e Suec. habemus. — Ipse quidem Cel. Schrader in N. Journ. l. 3. p. 104. testatur, suum olim *D. falcatum* Anglor. esse *fuscescens*, ita confirmans Smithii effatum (v. supra sub *D. scop. β.*); sed non possumus non majorem habere optimi viri specimin. fidem, quam ipsius verbis.

14. *D. spurium* Hedw., caule ramoso; foliis undique erecto-patentibus, serrulatis, siccitate crispabilibus; sporangio cernuo absque struma, operculi rostro aequae longo. *Hedw. Stirpp.* II. t. 30.

In sylv. arenos., sec. alios in paludos., turf.; rariss. Majo. Jun. 24.

Magnitudine priorum specierum 11-13. Folia Hedw. et auctt. in hoc et sequente male integerri-
ma verbis et figg. exhibuerunt. Dentium unus alterve 3 fidus, v. Hedw. ic cit. f. 14. *Fissid.* esset Hedwigii ex sexu, quod ipse Hedw. fatetur; ta-

men ob habitum ei antecedentium specierum similem inter *Dicrana* vir summ. reliquit. Et Fiss. vero Hedwigii *polycarpus* nostro simillimus, ut arctissime hoc modo duo genera inter se conjungantur, et quo jure olim sint separata affatim pateat.

15. *D. montanum* Hedw., caule subramoso; foliis undique erecto-patentibus, serrulatis, siccitate crispabilibus, sporangio obovato, subcernuo, absque struma, operculi rostro aequae longo. *Hedw. Specc. t. 35. ff. 8-13.*

D. elegans et *D. pulchrum* Hedw. prius mst., Brid. in *Diar. bot. Schrad. 1800. I. p. 296. 297.*

In mont. regg., ad trunc. putrid., et in paludos. — *Siles., com. Glatz, Elsalpe Salisb. (Flörke), Francon. (Delavigne) (in Scotia nunc quoque lectum, et ab amiciss. Wahlenb. in Lappon.) 24.*

Magnitudine proxime insequentium, et ita *D. spurio* triplo minus. Foliis contra nostrum multo angustioribus, subuliformi acumine multo longiore, supremis pallidis, nec laete viridibus, inprimis vero sporangio, in hoc angusto, fere aequali (praesertim in sicco statu), in *D. spur.* brevi amplo, exacte cernuo, et, teste Hedw., sexu, distinguitur.

16. *D. polycarpum* Ehrh., caule ramoso; foliis lanceolato-subulatis, un-

dique patentibus, flexuosis, serrulatis, siccitate crispabilibus; sporangio obovato, subcernuo, absque struma, operculi rostro dimidia longitudinis. *Hedw. Stirpp. II. t. 31. (Fiss.).*

Ehrh. Decc.

In sylvaticis montosis. Aestate. 24.

„Setae, vaginulae ora, tam arcte continentur, ut neque vi inde evelli queant, hinc saepe quadriennes cum sporangiis corruptis residuae,” monente *Hedw.* Inde stirps *polycarpa* evadit. Cum insequente *D. strumif.* amiciss. *Funk* nostrum idem putavit specimenque misit, in quo, uti perhibuit, ambo in uno caule videnda essent. Sed revera plantae distinctissimae, non nisi in consortio degentes. Pro *D. virenti*, sporangio basi strumoso foliisque exacte recurvis, caetera ut relinquamus, facillime dignoscendo, alii miserunt, et ipse *Schleicher* pro hoc dedit in *Cent. 2. n. 24.* Cum *Bryo Dillen. t. 48. f. 41., s. Br. polyphylo Dicks.,* quamquam bene ab eo in *Stirpp.* distinxisset et ipsa calyptra differens pronuntiasset, in *Specc.* denuo conjunxit sagaciss. *Hedw.* Revera autem genere, scilicet calyptra, quod dicunt recta secedente, nec dimid., *Br. polyph. Dicks.* differt, quod itaque *Trichost. polyph. Turn. hib. t. 7. (Dicr. polyph. et Trich. cirratum Smith., Trich. serratum Schleich. Cent. 2.*

n. 19.) An ad hoc, quod scimus, in Germ. nondum lectum, *Fiss. polyc. α . atratus* Brid. pertineat? Minime vero, quod volunt Angli, jam *Trich. polyph.* et *Dicr. polyc.* distinguenda sunt, quod illi folia serrata, huic integerrima. Amborum certe folia apice serrulata. E com. Glatz. ab rev. *Seliger* pro nova specie *Dicranum* olim accepimus, quod vero praeter minorem staturam ab hoc vix distinguere valemus. Nec quibus essentialibus notis, et praeter folia parum magis patentia, setasque paulisper breviores, a nostro secernamus *Dicr. viridulum* Schleich. Crr. helvv. Cent. 4. n. 13., in valle *Salvan* ad rupes umbrosas lectum, videmus. A *Dicr. gracilesc.* tandem nostrum discernas foliis duplo longioribus, scil. lanceolato-subulatis, nec lanceolatis, sporang. obovato, nec ovato, operc. rostro dimidiaae sporangii longitudinis, nec id subadaequante.

17. *D. strumiferum* Ehrh., caule ramoso; foliis lanceolato-subulatis, strictiusculis, undique patentibus, siccitate crispabilibus, serrulatis; sporangio cernuo. strumoso. *Hedw. Stirpp.* II. t. 32. (*Fiss.*).

Ehrh. Decc.

In udis subalpinis. Aestate. 24.

Foliorum superiorum quaedam interdum leniter ad unum latus sunt inclinata, et ita subhomomalla. Sed nec integerrima folia, quae figg. *Hedw.*, verbis *Smithi* exhibuerunt. Huj loci *Dicr. exiguum* *Schleich.* Cent. 3. n. 29., sed non minor planta, ac nostra; quare cur *exiguum* sit nuncupatum, non capimus. Sane egregia confusio apud *Schleich.* inter *DD. polyc.*, *virens* et *strumif.*!

18. *D. virens* Sw., caule ramoso; foliis e lata basi vaginanti subulatis, undique recurvis, siccitate crispabilibus, serrulatis; sporangio cernuo, strumoso. *Hedw. Stirpp.* III. t. 32.

In udis subalpinis. 24.

Hedw. strumam, evidentissimam tamen, nec, uti vult Turn., „exiguam, non nisi in vetustis conspiciendam,” plane praetervidit, quo forte occasionem praebuit, ut mox *D. pelluc.*, mox *polyc.* botanici pro hoc sumserint, *Schleicher* vero (Cent. 2. n. 29.) nostrum pro *Fiss. strumif.* habuerit, cum verum *D. strumif.* jam, uti novum, *exiguum* nuncupasset. In com. *Glatz.*, *Ascib.*, *Sudet. sec. Stark.* et *Brid.* nostra stirps lecta dicitur, et quamquam non dubitamus, quin revera sit Germaniae indigena, monemus tamen, e com. *Glatz.* nos pro ea *D. pelluc.*, a Stark. vero ipso *D. polyc.* accepisse, vera germanica autem specimina

nondum videri. Quod *Hoffm. e Nassov.* habuit *Bryum virens*, certe *D. pelluc.* est. Caveant post-hac muscorum investigatores, ne in hunc l. illum laudatorum a nobis de hac specie errorum denuo incidant.

19. *D. squarrosus* Schrad., caule subramoso; foliis e latissima basi vaginante lanceolatis, obtusis, nervo versus apicem evanescente, undique recurvo-squarrosis, siccitate crispabilibus, integerrimis; sporangio cernuo, strumoso. *Dillen. t. 46. f. 24.*

Schrad. in *Diar. bot.* 1801. I. p. 68., *Bryum pellucidum* β . L., *palustre* Dicks., fide Turn. et Smith.

In paludos., subalp. (*Salisb. Flörke, com. Glatz. rev. Seliger*). Ver. 24.

Spectabilis stirps, uncias 2-3 longa.

20. *D. pellucidum* Sw., caule subramoso; foliis e latiori basi vaginanti lanceolatis, acutiusculis, nervo excurrente, undique recurvis, siccitate crispabilibus, serratis; sporangio obovato-subgloboso, subcernuo, absque struma, operculi rostro subaeque longo. *Dillen. t. 46. f. 23.*

Bryum L., *Dicr. aquaticum* Ehrh. Decc.

In udis subalpinis. Aestate. 24.

Folia non, uti *Hedw.* et *Smith* habent, integerrima, sed bene jam monente *Turn.*, serrulata. Hoc tandem *Schleich.* (Cent. 1. n. 23.) recte habet. Sed ne cum antecedente et sequente ipse confundas caveas. Cum *D. virenti* quidam, uti jam monuimus, quoque confuderunt.

† 21. *D. gracilescens* Web. et Mohr., caule subramoso; foliis lanceolatis, undique patentibus, siccitate crispabilibus, serratis; sporangio ovato, subcernuo, absque struma, operculi rostro subaeque longo.

Zillerthal Salisb. Flörke. 24. (Tempus florentiae et statio nobis ignota.)

Inter affinia a solis *DD. pelluc.* et *polyc.* cantius forte distinguendum. Satis claris verbis vero, uti speramus, distinctivas notas expressimus; cf. Obs. ad *D. polyc.*

22. *D. Schreberi* Sw., caule simpliciusculo; foliis e lata amplexante margineque undulata basi subito anguste subulatis, flexuosis, undique squarroso-patentibus, siccitate crispabilibus, integerrimis; sporangio cer-

nuo, substrumoso. *Swartz. suec. t. 2. f. 6. Hedw. Specc. t. 33. ff. 6-10. (D. Schreberianum).*

„In umbrosis graminosis” *Swartz.*, „ad fossas argillosas” *Hedw. Majo. 24?*

Nervus minime, uti habet *Hedw.* „brevissimus,” sed excurrens!

23. *D. crispum* *Hedw.*, caule simpliusculo; foliis ex amplexante basi setaceis, integerrimis, subdistichis, recurvis, flexuosis, supremis subhomomallis; sporangio subaequali, absque struma, operculi rostro longo. *Hedw. Stirpp. II. t. 33.*

Bryum vaginale *Dicks.*

In humidiusculis subalp. Jun. Jul. 24.

Male huic nervum folii abnegant *Turn. et Smith.*

Petropoli quoque lecta pulchri hujus musci specim. accepimus ab am. *Flörke.*

† 24. *D. rupestre* *Web. et Mohr.*, caule simpliusculo; foliis confertis, lanceolato-subulatis, patentibus, integerrimis, nervo obsoleto, supremis subhomomallis; sporangio subaequali, absque struma, operculo subhemisphaerico-rostellato, rostello subobliquo.

In rupibus com. *Glatz.* Majo. *Seliger.* 2?

Sporangia deoperculata exsiccata aequalia, erecta, subhemisphaerico-cyathiformia, ore amplissimo.

25. *D. varium* Hedw., caule simpliciusculo, innovationibus brevibus; foliis sparsis, lanceolatis, erecto-patentibus, integerrimis, supremis subhomomallis; sporangio subcernuo, absque struma, operculo conico-acuminato, subincurvo. *Dillen.* t. 50. f. 59. *Hedw. Stirpp.* II. t. 34.

Bryum simplex L.

In argill., fere ubique et omni anni tempore. (E. *Megap.* quoque mis. Cl. *Bland.* sub nomine *D. carnei* s. *D. pulchelli* [quod *Dicr. curvat.* *Schultz. starg.*]) 2.

Admodum polymorpha stirps „trunci magnitudine, innovationibus foliorumque directione variis” Hedw. Sed sporangia minime in hoc, et aequè minime in insequente, quod *Hedw.* et *Swartz* habent, ovata, sed in ambobus obovata. — *Bryum aestivum* Schreb. lips., quod ipse auctor dedit, jam adnotans, omnia esse removenda synonyma, certo certius hujus mera var. major, caule fere uncia!i, nobis censenda videtur. Valde igitur miramur, hanc stirpem a critico in Hall. A. L. Leit. 1804.

n. 369. nuperrime verum *Bryum* esse pronuntiatum. Sed sane hic criticus miranda multa profert. — Cum *Hedw.* optimo quoque conspirare debemus, *Bryum rufescens* Dicks. t. 8. f. 1. idem esse affirmante cum suo *D. vario*, et gaudemus, nostrae opinioni ex litt. nuperrime ad nos datis consentaneum quoque videre eximium R. A. Hedwig. fil. Distinctissimum quidem et nuper Smith utrumque declaravit, insistens in Dicksoni errorem, ut folia subserrata dicat. Specimina vero a sagaciss. *Turn.* benevole missa anxius lustravimus, foliaque non esse serrata, quod jam ipse *Turn.* annotaverat, bene perspeximus, nec ullum inter utramque stirpem reperivimus et levissimum discrimen. Certe itaque, *Turn.* quoque annuente, pro varietate Dicksoni muscus sumendus. Sed vix apte tam *Dicr. var.*, quam *rufescens*, Florae brit. auctor verbis designavit. Simile dicitur huic speciei *Dicr. fulvellum* Smith, quod *Br. fulvell.* Dicks. et *Br. immersum* ej., excell. synn. omnib. (s. muscus a Dicks. falso sumtus pro *Sphagno alp. Dillen. snowdonensi* *)), complectitur; et sane cum fig. Dicks. *Br. fulv.* (t. 11. f. 1.) maxima *Dicr. varii* specimina, a rev. *Seliger* transmissa,

*) Hunc tamen *Turn.* in *Musc. hib. Weissii* forte annumerandum esse perhibet.

bene conveniunt. Sed *D. fulvell.* habitu prorsus esse dicitur *Gr. acutae*, et gaudere sporangio; „turbinato,” aequali. Ipsi speciem non vidimus. — Tandem nostri censemus var. muscum a Cel. *Willden.* communicatum, ipsi allatum ex *Am. bor.*, ejus sporangium obovatum, subaequale, erectum, operculum conico-acuminatum, acumine subincurvo, folia lanceolata, subintegerrima, uninervia, erecto-patentia, sed vix, ac ne vix quidem, quaedam subhomomalla vidimus, quique colore lutescente, exigua statura quodammodo singularis primo intuitu videtur. Cum in *Amer.*, quod constet, *D. var.*, usquenunc non lectum, hocce adnotare volumus.

26. *D. rigidulum* Sw., caule simpliciusculo, innovationibus setam aequantibus: foliis sparsis, lanceolato-subulatis, erecto-patentibus, integerrimis, innovationum iis homomallis; sporangio subcernuo, absque struma, operculo conico-acuminato, subincurvo. *Swariz. suecc.* t. 3. f. 7. *Hedw. Specc.* t. 32. ff. 8 - 12.

„In arenos. Saxon.” *Hedw.* in *Specc.* Aestate. 24. (Ipsi germanica specimina nondum vidimus, et sola summa *Hedwigii* auctoritate inter nostras plantam recepimus.)

„Adfine *D. vario*, sed distinctissimum *surculis serioribus longis*” (nobis: *innovationibus setam aequantibus*), „*foliisque illorum secundis*. — Absque surculis serioribus interdum occurrit, et tunc a *Bryo callistomo* Dicks.” (t. 7. f. 10.) „vix diversum” *Swartz*. Sola sane ab *innovationibus* desumpta nota, vixque foliorum parumper diversa forma, discrepare videtur a praecedente, sed sec. summor. muscoll. effata pro distincta specie et nos suscepimus. Operculum vix apte *Swartz* et *Hedw.* delinearunt, cum plane ejusdem est formae, ac in *D. var.* *Dicr. callistomum* Anglor. ipsi quidem nondum vidimus, sed plurima talia specimina *D. rigid.* accepimus ab am. *Wahlenb.*, qualia, deficientibus *innovationibus*, *Dicksonianum* muscum efficere debent, et, annuente quoque *Turn.* *), vix nobis dubium, quin sit utraque stirps eadem.

† 27. *D. Starkii* Web. et Mohr., caule subramoso; foliis e vaginante basi anguste subulatis, curvatis, homomallis, integerrimis; sporangio obovato-cylindraceo, cernuo, strumoso, operculo rostrato, aequae longo.

*) Rem uti non amplius dubiam tandem *Turn.* confirmat in *Bot. Guide* p. 9. Nil itaque *Bridelii* dubia valent.

In subalpinis — *Siles.* rev. Starke. 24.

Cum nostro plane idem esse videtur *Dicr. curvifolium* Schleich. Cent. 4. n. 14. „in locis humidis alpinis frequens” lectum ab auct.

28. *D. falcatum* Hedw., caule subramoso; foliis lanceolato-subulatis, falcatis, homomallis, subintegerrimis; sporangio obovato, substrumoso, operculo rostrato, subaeque longo. *Hedw. Specc.* t. 32. ff. 1-7.

Bryum longifol. Dicks., excl. syn. *Dicr. longif.* H.; fide Smith.

In *Sudetis.* Ludwig. Augusto. 24.

Diversum quidem, tamen arcte cognatum cum *D. heterom.* Quomodo esset confundendum cum *Dicr. longif.*, cui et Hedw. valde simile dicit, vix vidimus.

29. *D. heteromallum* Hedw., caule subsimplici; foliis subulato-setaceis, subincurvis, homomallis, integerrimis; sporangio obovato, subcernuo, absque struma, operculo conico-rostrato, aequae longo. *Dillen.* t. 47. f. 37. *Hedw. Stirpp.* I. t. 26. *Sturm.* 6. *Hedw. Specc.* t. 30. ff. 1-5. (D.

orthocarpum) et t. 31. ff. 7-12. (*D. curvatum*).

Bryum L.

In sylvat., humidiusc.; fere ubique et omni anni tempore. 24.

Variat 1. in locis humidis: foliis minus homomallis, cum tota stirpe tenerioribus (*D. subulatum* Hedw. Specc. t. 34. ff. 1-5., secundum Swartz in A. Holm. 1795. IV.).

Hanc var. (quam talem Swartz ipse nunc concedit) e *Sudetis* mis. Ludw., e *Salisb.* adtulit Flörke.

2. in montosis: caule elatiori, foliis interruptim fasciculatis, siccitate tortilibus (*D. interruptum* Hedw. Specc. t. 29. ff. 8-12. [*Dillen.* t. 47. f. 38.]).

Folia in vulgatissima forma quaedam apice subserrulata, plurima subintegerrima. Aegre quidem tam multas auctorum, et ipsissimi nostri Hedwigii, species sub hac una conjunximus, prout putamus, tamen sufficientibus rationibus coacti, nec pro lubitu, vel ex immutandi vitioso pruritu. De *D. orthoc.* bene jam habet Cel. Mich.: „sporangium est suberectum, non ita angustum, ac in icone Hedwig.” Et revera in specimm. nostris, quae rev. *Mühlenberg* misit, sporang. omnino obovatum, subaequale quidem, sed non ita aequilaterum, ut ex hoc diagnosis sumeretur a *D. heterom.* Et jam ipse Hedw. sporangium dicit „nonnunquam inae-

quilaterum." Folia, statura, operculum, caetera, omnia *D. heterom.* In hac tamen var. folia magis evidenter versus apicem serrulata. — In *D. curv.* quidem ipsi annulum s. fimbriam invenimus, partem, nec in hoc, nec in vulgari *D. heter.*, nec in reliquis, a nobis pro variett. habitis, ab eo propositis speciebus a summo Hedw. visam, quae vero ita parum sufficienter hucusque in muscis observata est, ut, anne vere competat omnibus nostris *D. heter. varr.*, vix dicendum erit. E foliis autem et sporangio (ut in *D. orthoc. subaequali*, minime aequali) nulla prorsus *D. curv.* derivanda nota diagnostica. — Affinitatem quidem *D. subul.* ad nostrum jam amiciss. *Turn.* hisce notavit: „affine, sed foliis brevioribus, nequaquam falcatis, et statura tenuiore dignoscendum." Nos ex unica nota foliorum parum minus homomallorum, et, uti tota planta, paululum teneriorum, uti speciem distinguere stirpem vix ac ne vix quidem possumus. Levissimae hae distinctiones certo certius pendent a solo natali. Foliorum forma, uti sporangii et operculi figurae, dimensiones et directiones, plane eadem; nec sporang. maturum sulcatum huic solummodo competit, sed aequae caeteris omnibus nostris varr. Quoque, quod *Smith* vult, ovatum *D. subul.*, obovatum *heterom.* esse sporangium, quod sane maximam praestaret distinctionem, non valet. Folia in hoc *D. subul.* caeterum subinte-

gerrima. — *D. interruptum*, sec. specimm. ab ipso amiciss. *Hedw.* fil. missa, praeter laudatas notas, a *D. heterom.* plane non discernere possumus. Sed non capimus *Cel. Brid.* in *Suppl. Dicr. interruptum* *Smith. Fl. brit. et Dillen.* t. 47. f. 38. (contra ipsum *Smith.*) ab *Hedwigiano musco* (*D. caducum* *Ei nunc*) secernere volentem. Certe nunquam l. *Dillenianae* l. *Smithianae*, forte nec ipsius *Hedwigianae* stirpis originalia vidit exempla, et quomodo igitur judicare potuerit? Nos non curabimus hocce *Bridelii* nunc *D. interrupt.* Olim ipse speciem cum *D. flagell.* conjungendam censuit, et forte etiam nunc nil ipse habet praeter var. l. *D. longif.* l. *D. flag.*, quae ambo foliis interruptis et siccitate crispabilibus sane ludunt. — Affine tandem nostro quoque est *D. condensatum* *Hedw. Specc.* t. 34. ff. 6-10, pensylvanicum, sed diversum putandum videtur.

30. *D. cerviculatum* *Hedw.*, caule simpliusculo; foliis lanceolato-subulatis, nervo obsoletissimo, integerrimis, subhomomallis; sporangio ovato, subcernuo, strumoso, operculo rostrato, aequae longo. *Hedw. Stirpp.* III. t. 37. (nec 36.) A.

In arenosis, ericetis humidiusculis. Jul. 24.

β. pusillum, duplo minus, fuscescens (*D. pusill.* Hedw. Stirpp. II. t. 29. B., *Bryum parvulum* Dicks., Hoffm.).

Locis, tempore et duratione iisdem cum var. *α.*

Folia in utraque nostra var. non enervia, uti *Hedw.*, *Smith* et *Turn.* contendunt. Nervus obsoletus ad basin conspicitur, si cautius observes. *D. pusillum* Hedw. *cerviculato* anteposit Smith, et juste tum observat de hoc: „Praecedente duplo majus, sed arcte affine, et differentia specifica difficillima est. Male omnino in Hedwigii opere recentissimo longe separantur.” Nos veram specificam diagnosen ut plane non enucleare valuerimus, libenter fatemur, nec *Dicr. flavidum* Sw. mst., quod in palustribus *Holmiae* cum ipso Swartz copiose legimus, cujusque mentionem injecimus in *It. Suec.* p. 128., ab utraque varietate discernere possumus. Formam, hoc *D. flav.* satis bene sistentem, amiciss. *D. Treviranus* jun. in turfosis pr. *Brem.* nuperrime observavit. De loco in specierum serie *DD. cerviculato* et *pus.* ab eo assignato bene quidem Hedwigium nostrum *Smith* vituperavit; sed ipse ambos muscos inter varias *D. purpurei* formas medios posuit, sane non aptius. Bene enim monente *Turn.* „*D. heterom.* varietatem nostrum primo visu simulat,” quamquam distinctissimum sporangio strumoso, foliis multo minus homomallis, caeterisque.

31. *D. ambiguum* Hedw., caule simplici; foliis lanceolato-longius apiculatis, 4-fariam imbricatis, undique erecto-patentibus, integerrimis; sporangio subcernuo, longicolle-strumoso. *Hedw. Stirpp. III. t. 36.*

Mnium setaceum L. (*Dicr. Sw.*), *Trematodon longicollis* Mich. bor. am.

In humidiusculis subalpinis. 24.

„Affinem” quidem „*Dicr. ambig. H.*”, sed distinctissimum” suum *Tremat. longicollem* Cel. *Michaux* pronuntiat; ex specimm. vero, quae ipse olim *Willdenovio* misit, in litt. conveniente *Swartz*, nec specie, multo minus genere, ambos muscos separandos putamus. Quod novum genus, hoc caractere:

„*Fructificatio utraque terminalis.*”

„*Sporangium stipitatum* (scil. inferne angustatum in collum seu stipitem ipso duplo triplove longiorem arcuatumque.)”

„*Peristomii simplicis dentes 16, distincti, subulati, recti, foraminulis pertusi.*”

ex hac stirpe confecerit b. vir, l. ejus interpres, singulari in sicco statu ejus peristomii specie seductus est. Audiamus summ. Hedw.: „probe tenendum est, dentium brachia, praeprimis in sicco specimine, adeo sibi appropinquari, ut facile pro

simplicibus habeas, nisi augmentioribus vitris in guttulo aquae lustraveris." Bene mon. Swartz. omnino et Trematod. *longicollis* dentes distincta sua crura tandem exhibent; paulisper vero sunt longiores, ac ii in Europ. stirpe, qua quidem nota aeque parum, ac foliorum nervo in americana planta longissimo extra apicem producto, uterque muscus specie distinguendus. Dentium omnium in hac *D. ambig.* et in *D. latif.* ab basin connexio levissimi quoque momenti est, nec genere separandas has species putes.

32. *D. pallidum* Web. et Mohr., caule exiguo, simplici; foliis e lanceolata basi subulato-setaceis, strictis, subintegerrimis, subhomomallis; sporangio subelliptico, subcernuo, substrumoso, operculo conico. *Dillen.* t. 49. f. 57. *Hedw. Stirpp.* I. t. 27. (*Trich.*).

Bryum Schreb. lips.

In subalp., solo lutoso — in *Herc.* Mertens, *Francon.* Funck, duc. *megap.* Bland. Jun. Jul. 24.

Habitu quodammodo *D. heterom.*, sporangio et operculo *D. purpureo* accedit, ut heic collocaverimus. Peristom. apud ipsissimum summ. *Hedw.* l. c. fig. 11. non prorsus juste delineatum. Sede-

cim enim dentium singuli basi non distantes, immo levissime inter se connexi. Tum *bulbillus* dentium multo minus observabilis, nec ipsis cruribus crassior, si ab externo ad centrum sporangii petas, nec ita insigniter et subito lateraliter incrassatus, sed parum tantum et pedetentim latior evadit. Struma quoque sporangii Hedwigium effugit; sed jam filius in americanis specim., quae sub nomine *Trich. strumiferi*, uti novam speciem, nobiscum communicavit, eam detexit. Hanc vero americanam stirpem, quam ex datis ab ipso Michaux. exemplaribus plane eandem esse reperimus cum *Trich. pallido* Fl. bor. am., postquam et in nostra Europaea strumam vidimus, nullo modo differentem ab ea putare possumus, ut et Swartziana in Fl. Ind. occ. III. ad *Trich. strictum* (*Bryum* Prodr.) facta observatio, ad hoc forte potius pertinere Dillenii synonymum, plane sit delenda. Ipse enim amiciss. Swartz surculos dedit sui *Trich. stricti*, quod „valde affine *Trich. pallido*” dicit, quod vero *folia e vaginante basi setacea, longissima, flexuosa, sporangium tenuius, multo magis cernuum (strumosum quoque), caulem pollicarem, simpliusculum tantum, non exacte simplicem* habet, et ex his certe differt a nostro *D. pall.* — „Pedunculis vix semiuncialibus” variare americana specim. docet Michaux. Cur vero idem, quin sit species Hedwigiani generis *Trichostomi*, dubitaverit, vix vidimus.

33. *D. tortile* Web. et Mohr.; caule simplici; foliis e parumper dilatata basi longe subulatis, subintegerrimis, homomallis; sporangio oblongo-cylindraceo, aequali, absque struma, operculo conico-acuminato, acumine subincurvo. (in Tab. nostra VII. ff. 12. 13. sporangii cum perist. et fimbria pars.)

Trich. Schrad. Samml. I. n. 49.

„In rup. et sax. Herc., Gött.” Schrad., pr. *Erlang.* Delavigne, e com. *Glatz.* Seliger (pro *Did. homom.*).

Cf. quae de hujus et antecedentis speciei peristomiis in not. *Barbulae* generis characteri subjuncta in tab. synopt. adjecimus. — „Habitus *Weiss. heterom.* Hedw.” jam *Schrad.* de hac planta monet. Et sane cautius eam tum a dicta specie, tum a *Did. homom.* discernas necesse est. Sed operculum longius in hoc *Dicrano*, ac in illis duobus muscis, sporangium magis cylindraceum, de peristomio ut taceamus. Quam arctissime autem cum duabus aliis speciebus nostra conjuncta est, ut vix dicamus, an omnes tres revera distinctae. Nominamus *Trich. tenue* Hedw. pensylvanicum, et *Barb. curtam* ej. suecicam. Hoc jam in herb. ad *Tri-*

chost. Hedwig. genus Swartz. retulit, cum vero ipsi bonum peristomium non vidimus, an dentes revera, a quo eriguntur, inter se liberi sint, quod vix ex fig. Hedw. autumandum, nescimus. Habitus omnino non *Barbulae*. Caeterum *folia parum- per breviora, latiora*, ac in *D. tort.*, non e *basi exigua dilatata subulata, sed lanceolato- longe acuminata, sporangium brevius, exactius cylindricum, operculum brevius et ita magis exacte conicum, dentes aequo modo parum breviores*. Haec omnia vero e solo diverso solummodo pendere possunt. Crescit enim suecicus muscus in nuda terra, noster ad rup. in sylvaticis, montosis. *Trich. tenue* Hedw. *caule, foliis, sporangio, operculo, fimbria, simillimum* inprimis *Barb. curtae*. Sed *dentes peristomii latiores, rigidiores, et ita vix torti*. Ut sit, vix dubium, quin pone invicem posthac collocandi hi tres musci et cautissime distinguendi! Cum iis quoque quodammodo convenire videtur ex verbis Hedw. (Specc. p. 114.) et Smith. *Trich. linoides* Fl. brit. (Bryum Dicks. t. 8. f. 3.), quod ipsi nondum vidimus.

34. *D. purpureum* Hedw., caule subramoso; foliis ovato-lanceolatis, undique patentibus, integerrimis; sporangio obovato, subcernuo, substrumoso, operculo conico. *Dillen.* t. 49.

f. 50. (*Bryum bipartit.* Dicks. et Hoffm., *Dicr.* Brid., Roth.), 51. (*Bryum purp.* L.), 52. (*Br. strictum* Hoffm., *Dicr.* Smith, *D. palustre* Brid., *Br. aestivum* Weiss. goett.), 54. (*Br. Celsii* L.). *Hedw. Specc.* t. 31. ff. 1-6. (*D. intermedium*), t. 33. ff. 1-4. (*D. Celsii*), t. 35. ff. 1-7. (*D. purpurascens*), t. 36. (*D. purp.*).

Praeter numerosa laudata synonyma, adhuc hujus loci, fide Turn. et Smith., *Bryum tenue* Dicks., excell. synn. *Dill.* (t. 48. f. 49.), et *Web. Spic.* quorum illud forte Barb. *unguicul.* H., hoc sec. plurima certe in auct. Herb. exempla idem.

Ad latera viar., in mur., locis paludos., alibi-que. Vere, aestate. 24.

Annulus, quem in DD. *purpurasc.*, *Cels.* Hedwig observavit, in vulg. *D. purp.* quoque obvi-
nec struma sporangii solummodo *D. Celsii*, quod ex Hedwigio a consimilibus hoc separante forte suspicareris, sed caeteris omnibus hujus polymorphae speciei formis quoque comperit. Dilleni citatas figuras 50, 51, 52 plurimi muscologorum jam olim unius ejusdemque putarunt speciei, et miramur, contra Turnerum has omnes *Smithium* denuo uti distinctas enumerare. Nescimus quoque, quid sibi voluerit Brid. in *Diar. bot.* Schrad. 1800. I.

Br. strictum Hoffm., „quod ad *Dicr. palustre* retulisset,” meram declarans *D. purp.* var. Omnino idem *D. palustre*, ex specimm., quae ipse dedit. *D. Celsii* Angli quidem et nunc ita distinctum putant a *D. purp.*, ut Smith inter utrumque in specierum serie *DD. pus.* et *cervic.* collocaverit, sane non bene. Swartz ipse nobis cum eo commorantibus saepe saepius utrumque prorsus non diversum esse comprobavit, legimusque cum eo circa Holm. sic dictum *D. Celsii* inter vulg. *D. purp.* Bene primus *D. intermedium* nostri Hedwigii non propriam esse speciem Cel. Smith., ad suum *D. strict.* id referens, suspicatus est. Certe diversi nil et nos in eo reperire valemus. Et lubenter quoque cum amiciss. Turn. conspiramus, *D. purpurascens* Hedw. pensylvanicum referendum putante in specie ad *D. bipartitum* auctt. Monet jam Cel. Michaux, in sua Flora *D. purpureum* enumerans „meum humile et statura *D. purpurascens*.” Pro specifica certe distinctione ex specimm., quae R. A. Hedw. dedit, nil sumendum vidimus. Denique *Bryum papillosum* Dicks. t. II. f. 5. nostri var. censuerimus, nisi testis nobis factus esset Turn. in Smith. Fl., huic esse dentes peristomii 32, per paria approximatos, qua ex nota *Didymodon* nobis esset, *Trichostomum* est Smithio, male, prout scimus, conjungente nominata duo genera. Certe struma sporangii, operculum

conicum caeteraque a *Didymodontium* habitu valde recedunt, et quis est, qui nesciat, *D. purpurei* et consimilium peristomium dentibus valde profunde divisis saepe saepius gaudere?

35. *D. cylindricum* Smith., caule simplici; foliis e basi amplexante subulato-setaceis, integerrimis, sparsis, recurvo-undique patentibus; sporangio cylindraceo, subaequali, absque struma, operculo conico. *Hedw. Specc.* t. 24. ff. 7-13. (*Trichost.*).

Trich. tenuifolium Schrad. in *Diar.* 1799. 2. p. 58., *Bryum paucifolium* Dicks. t. 11. f. 3., ex herb. Turn. adnotante Smith.

„Ad latera viar. in Herc. sylvatt.” (v. c. ad m. *Herzberg* pr. *Hesfeld*) „Jul. Aug.” Schrad. — in m. *Weisner Hass.* am. Rohde — ad *Rathhausberg Salisb.* Flörke, in *Lusat.* Ludw. 24? (e *Norv.* habemus a Swartz)

Suum synonymum ipse olim docuit Schrader. Dicksonianum certe nunquam extricasses ex icone et verbis Dicksoni, et si verum, sane figurae omnium miserrimae! Ne cum *D. tortile*, fugitivo intuitu, rarius apud nos hucusque hoc inventum confundas. Male Smith folia enervia dixit.

36. *D. latifolium* Hedw., caule simpliciusculo; foliis oblongis, conca-

vis, imbricatis, apiculatis, subinteger-
rimis; sporangio ovali, aequali, abs-
que struma, operculo convexo-rostel-
lato, rostello recto. *Hedw. Stirpp. I.*
t. 33. Dicks. t. 10. f. 14. (Br. pilife-
rum). (in *Tab. nostra VII. f. 14. pe-*
ristom.)

Swartzia pilifera Brid. in *Diar. bot. Schrad. 1800.*
1. p. 289., Trichost. Smith., Dier. latifolium Schleich.
Cent. 3. n. 28. et D. lanceolatum ej. *Cent. 4. n. 11.,*
nec minimo diversae!

In *Siles. Sudet. Ludw. In Styr. alpp. Host.*
(*Helv. Schleich., Lappon. Swartz. [cf. Schrad.*
Diar. 1800. 2. p. 178.]; Norv. am. Uldahl).

Folia inferne margine reflexa, superne versus
apiculum inflexa, cum tota stirpe simillima iis
Grimm. aciphyllae; cf. sub hac *Adnott. Sec. pe-*
ristom., bene monent. *Turn. et Smith., ex Hed-*
wigiano methodo omnino *Trichost. esset,* dentibus
quam profundissime divisus, ut *Bridel Didymodon-*
tem autumaverit. Vix apta nobis visa *Hedwigiana*
fig. 11. l. c. duorum dentium. An unquam ex
Am. septentr. Linnéus fil. habuerit? Cf. *Hedw. in*
Stirpp. Certe in bor. Europa et in alpp. non ra-
rum, nec *Swartz* unquam americana vidit specimi-
na. Loca natalia Germaniae synonymaque pri-

maria primus Schrader docuit in Diar. 1801. 1.
p. 68.

Dicrana in Roth. Fl. enumerata *paludosum*, *cir-
ratum*, *pellucidum* plane delenda. Verae enim
species non sunt, sed ex confusione, male intelle-
ctis auctorum synonym., originem duxerunt.

*Bryum foliis gramineis pellucidis, cauliculo
rubente* Dillen. t. 46. f. 17. (*Bryum graminifo-
lium* Brid.), in sylva Hangestein prope Giss. Hass.
absque operculo et calyptra a solo Dillen. observa-
tum, prorsus dubia planta, tamen *Dicr.* ex habitu
potius videtur, quam *Catharinea*, nisi forte *Bryum*
Schreb. (cf. Brid. musc. II. 3. p. 90.) Videant Bo-
tanici Gissenses, quinam muscus in natali loco pro-
veniat, forte a Dillenio intellectus.

Fugit nos quoque *Dicr. fagimontanum* Brid.
Suppl., ex ipsius verbis forte *D. heterom.* ex in-
numeris formis una!

30. *Barbula* Willden. *)

Dentes 16 bipartiti, basi connexi, cruribus tortis.

(*Calyptra* dimidiata.)

1. *B. tortuosa* Web. et Mohr.,
caule ramoso; foliis e latiori basi elon-
gate subulatis, patentibus, flexuosis,
margine undulatis; sporangio cylin-
draceo, suberecto. *Dillen.* t. 48. f. 40.

*) Genus quodammodo naturale, plurimis specie-
bus habitu omnino satis peculiari, ad eum so-
lummodo *Grimmiar.* aliquot, uti *curvir.*, l.
Dicranor., uti *purp.*, accedente; prima et ul-
tima nostra specie tamen a reliquis parum alie-
nis. Sexus diversus, florr. masc. l. in eodem
individuo alaribus gemmaceis (in primis specie-
bus, *Tortulis* Hedw.), l. capituliff. terminall.
in diversa stirpe (in longe pluribus, scil. *Bar-
bulis* Hedw.). Folia omnibus integerrima, et,
unica *B. rig.* excepta, omnibus quoque uniner-
via, nervo non evanescente, sed l. excurrente,
l. excedente in apiculum l. pilum, siccitate sa-
tis insigniter crispata. Sporangium omnibus
ex cylindraceo lagenaeforme, operculo rostra-
to, plus minus longo. Annulus certe pluribus
adest. Nil valent, quae de „ciliis” perist. qua-
rundam specierum 16, aliarum 32 (quas per
paria saepe approximatas vocat) in *Suppl.* Bri-
del habet. Conf. Exc. nostr. ad *Barbulae* ge-
nus in schem. gen.

Hedw. fil. in Web. et Mohr. Beitr. I.
t. 6. (*Tort.*).

Bryum L.

In rupibus; Majo, Jun. 24.

Folia certe integerrima, bene *Hoffm. et Smith.* monentibus, nec, quod in *Spic. Schrad.* perhibet, „serrata.” Hedwigii fil. icon optima, descriptio vix omnibus aequae justa. „Foliorum habitu” (vix; folia enim insigniter crispantur), „etiam peristomii indole *Trichostomis* potius, quam reliquis *Tortu- lis*” (*Barbulis*) „videtur affinis” *Smith.* — Vix dubitamus, quin *Bryum flavescens* Scop. carn. t. 62. ipsissima sit nostra planta. Certe *Tort. flavescens* Brid. prorsus oblivescenda. Mixta enim e diversissimis plantis, Scopoliana scil. et *Bryo flavescenti* Dicks. (*Dicrano* Turn.), quarum nec alterutram ipse auctor vidit. Si in Suppl. demum specimina thuringiaca Cel. Brid. substituerit pro sua specie, quis multum hoc curabit? Nonne tali modo in dies confusio augeatur? — A nostra longe recedit *Tort. curvata* Schleich. Cent. 3. n. 24. „in glareosis *Rhodani*” lecta (*Tort. inclinata* Hedw. fil. l. c. t. 5.)

2. *B. muralis* Timm., caule subsimplici; foliis lineari-oblongis, subpatentibus, piliferis; operculo sporan-

gii dimidii longitudine. *Dillen. t. 45.*
f. 14.

Bryum L., *Tortula* Hedw.

In muris; ubique. Vere. 24.

„Ipso Hedw. in litt. monente, Barbularum suarum potius quam Tort. sexu gaudet” *Brid.* Var. *aestiva* *Brid.*, quam vix e Germ. hucusque accepimus, sec. helvetica exempla (*Schleich. Cent. 3. n. 23.*) non nisi nervo, longissimum pilum in vulgari stirpe faciente, minus elongato, nec specificè, differt. A *Dillenio* sub figg. F. G. jam olim notata est. Tort. *hercynica* quoque *Schrad. Spic.*, sane recte jam *Hoffm.* observante, mera et levissimae notae var., unice foliis parumper longioribus, pilis brevioribus insignis. Hoc ex specimm. affirmamus ab ipso auct. olim ad Hedw. patrem missis, a filio benevole nobiscum communicatis; apud *Schrad.* enim nunquam plantam vidimus.

3. *B. cuneifolia* *Web. et Mohr.*, caule simpliciusculo; foliis oblongo-lanceolatis, brevissime apiculatis; operculo sporangii dimidii longitudine. *Dillen. t. 45. f. 15.*

Bryum *Dicks.*, *Hoffm.*, *Tort.* *Roth.*, *Turn.*, *Smith.*, *acuminata* *Brid.*, (qui male in *Suppl. Bryum* *Dill. p. 356. t. 45. f. 15.* [non „p. 456. t. 46. f.

11."] denuo separat a sua Tort. *acumin.* sub nomine Tort. *muticae*), Hoffmanni Hedw. fil. mst., Bryum *murale* β . quorund. vetustior.

In arenos., agger.; vere. 24. (cur *biennem* Smith dixit?)

Evidenter differt a Barb. *murali*, non tantum foliis e nervo vix prominulo solummodo apiculatis, nec piliferis, sed tota apicis foliorum forma, scil. lanceolata, nec lingulato-obtusa, insuper foliis margine non incrassatis, sed aequae tenuibus, immo subundulatis, omni denique habitu. Nimis itaque heic scrupulosus nobis Turner videtur, recte sane caeterum Smithium corrigens, qui foliis oculo armato pulchre reticulatis hancce speciem distinguere voluit. Nonne talia folia omnibus muscis peculiariora?

4. B. *unguiculata* Hedw., caule diviso; foliis lanceolato-acuminulatis, margine reflexis, subpatentibus, strictis; operculo sporangii longitudine. *Dillen.* t. 48. f. 49? (affirm. Smith., dubitante Turn., qui f. 47. potius huius, f. 48. non Barb. *barbatae*, sed Tort. *unguiculatae* Anglor. censet.) *Hedw. Stirpp.* I. t. 23. (in Tab. nostra VIII. f. 3. perist.)

Bryum Schreb., *tenue* Web. Spic., *mucronulatum* Dicks., Tort. *mucronulata* Anglor.

In mur., agger., arvis; fere ubique. Vere. 24.

Cel. quidem *Swartz* in *Diar. bot. Schrad.* 1800.

2. p. 177. suam Tort. *mucronul.* muscc. suecc.

(*Bryum* Dicks.) diversam censet a Barb. *unguic.*

Hedw., quippe cui folia margine reflexa non es-

sent; stirpes vero, quas ipse sub nominibus Tort.

mucronul. et T. *unguicul.* dedit, non nisi foliis in

hac parum minus reflexis distinctas vidimus, cae-

teris omnibus convenientibus, et sane quoque ori-

ginali Hedwigianae plantae margine reflexa folia

competunt. Bene itaque, nobis censentibus, Hed-

wigianam Barbulam cum Bryo Dicksoniano denuo

Angli conjunxerunt, sub nomine Tort. *mucronu-*

latae. Rejiciunt nempe nostrum triviale ab *Bryum*

unguicul. Huds., Dicks. aliorumque Britann. Flo-

ristst. iis longe diversum videns. Hocce (Tort.

unguiculatam eorum, et sec. Dicks. et Smith. Dil-

len. t. 48. f. 47.) nondum vidimus. — Sane mul-

tum haec species ludit, foliis mox latioribus, mox

angustioribus, plus minus margine reflexis, acumi-

ne l. brevior, l. longior, interdum apiculiformi,

immo operculo longior, brevior; ut, si america-

nae species Hedwigianae, *acuminata* (quam ipse

summ. vir. varietatem potius censet), *apiculata*,

stricta, *lanceolata*, ab ea non distinctae essent,

forte non multum detrimenti exinde scientia capessivisset. Nec Tort. *apiculatam* Turn. hib., quae comparatis specimm. eadem ac Barb. *apiculata* Schleich. Cent. 3. n. 21., una cum hac vero satis luculenter a pensylvanica stirpe recedit, specie a nostra distinctam haberemus; unice enim differt, quod acumen vulgationis musci heic apiculi formam gerat, hoc autem saepius accidisse observavimus. De hac quoque falsa B. *apicul.* procul dubio verba fecit Brid. in Suppl., hanc speciem in tota *Eur.* et in *Germ.* habitantem declarans. An haec Turneri et Schleicheri Barb. s. Tort. *apicul.* ipsum Bryum *aristatum* Dicks. (Tort. Smith)? — Certa tandem afferimus variabilis nostrae speciei synonyma ex specimm. auct.: Barbb. *curtam*, *lanceolatam*, *amoenam* et *incertam* Schum. Saell. (nisi ultimam forte cum Tort. *apicul.* Turn. iungere malles) et Barb. *brevicaulem* Schleich. Cent. 4. n. 10.

5. B. *revoluta* Brid., caule subdiviso; foliis ovato-lanceolatis, acutis, margine insigniter revolutis, erecto-patentibus; operculo sporangii longitudine.

Brid. in *Diar. bot. Schrad.* 1800. I. p. 299, *Tort.* Schrad. Samml.

„In rup., mur., locis siccis” Goett. *Schrad.* 24.

(Ni fallimur, ex Helv. quoque accepimus; vix caeterum extra *Germ.* observata.)

Distinctissima a *B. unguic.* Hedw.: foliorum infra medium luculenter attenuatorum, nec porro acuminatorum, sed acutorum, forma, colore intensius viridi, margine demum non reflexo tantum, sed vere revoluto. Totus quoque habitus diversus.

6. *B. fallax* Hedw., caule ramosiusculo; foliis e latiori basi subulatis, muticis, margine reflexis, recurvo-patentibus; operculo sporangio paulisper breviori. *Dillen.* t. 48. f. 46.? *Hedw. Stirpp.* I. t. 24.

Bryum imberbe L.?

In iisdem locis cum *B. unguic.*, eodem tempore. 24.

Linnéi et Dillenii indicata synonyma Dickson et Smith excludunt, propriae speciei, *Tort. imberbi* Smith., ea adscribentes. Turner vero ex herb. Dill. affirmat, ejus plantam non minus eandem esse cum *Barb. fall.* e *Germ.* accepta, quam ab ipso Dicks. missum *Bryum imberbe*. Veremur quoque, ut a nostra satis diversa sit *Tort. barbata* Smith. (*Bryum* Curt., *Dillen.* t. 48. f. 48.?). Prorsus vero certa accedunt synonyma e specimin. sedulo investigatis *Barbb. gracilis* et *dubia* Schum. Saell., huic *Dillen.* figura 48. satis bene respondente. —

A BB. *unguic.* et *revol.* foliis madidis recurvo-squarrosis, praeter caetera haecce statim dignoscitur.

7. *B. convoluta* Hedw., caule diviso, foliis lanceolato-apiculatis, patentibus, perichaetialibus (femineis) latissimis, obtusis, convolutis, vaginantibus. *Dillen.* t. 48. f. 44. *Hedw. Stirpp.* I. t. 32. (*Barb. setacea*).

In mur.; hyeme, vere. 24. (Rarius — certe in Germ. sept. — sporangia maturat.)

Perichaetialibus foll. femm. statim dignoscenda! Apud Hedw. foliorum communium figurae non bonae, inferne nimis angustae, apiculo carentes.

8. *B. rigida* Hedw., caule exiguo, simplici; foliis ovato-lanceolatis, concavis, obtusis, margine inflexis, nervibus, patentibus; operculo sporangii dimidium superante. *Dillen.* t. 49. f. 55. *Hedw. Stirpp.* I. t. 25.

Bryum Huds., *stellatum* Schreb.

In muris; vere. 24.

Folia pauca, carnosae, luridae, aloideae, siccitate incurvae, „plantae masculae pauciora breviora, rotundata” *Hedw.* Unico in genere exemplo est fo-

liorum nervo carentium, et margine inflexorum, non reflexorum, ab omnibus aliis longe distinctissima, remotissima species, ut, post *B. convol.*, perichaetio fem. non minus insignem, merito agmen claudat. Var. suecicam, operculo brevi, conico, obtusiusculo, a Swartz. acceperunt Turner et Smith., quam nondum vidimus, memorabilem tamen censere debemus.

Nobis dubium *Bryum nervosum* Hoffm. Fl., quod forte Tort. *unguic.* Anglor., aequè a nobis non visa (v. supra sub Barb. *unguicul.*). Insequentia de hoc musco habet Cl. *Crom.* in *Hoppe's Taschenb.* 1805. p. 37.: „unterscheidet sich deutlich vom *Bryum mucronulatum* Hoffm. (Barb. *unguicul.* H.) durch die stark vorscheinende Mittelrippe, die jenem fehlt; durch die — nicht wie bei jenem, mit einer durchsichtigen Spitze besetzten Blätter, und durch den Deckel, der beinahe eben so lang wie die Capsel, gewölbt ist, und in eine pfriemenförmige abgestumpfte Spitze ausläuft, bei jenem hingegen kegelförmig und an der Spitze abgestumpft ist.“ Ex his qui sapit, magnus nobis erit Apollo. Nec sane *Crom.* hicce melius Hoffmanni plantam intelligere potest, quam quis alius. Specimina certe ab auctore non habet, descriptio vero insufficientissima, et synonyma dubia, ipso Hoffm.

concedente. Obliviscenda igitur planta. In *Crom. Samml.* n. 70. non omnibus numeris completa exempla adsunt, ut nec ex his quid determinare valeamus.

Brya quoque *setaceum* et *cirratum* Hoffm. valde obscura, ex synonym. allatis alterum *Dicran.*, alterum *Grimm.*; nec scimus, num auctori fides sit habenda, ut veras *Barbulas* descripsisset!

Demum nos fugiunt *Tortt. crocea*, *Saussuriana*, *acuta* Brid. Suppl., quae Germ. indigenae dicuntur, quae vero tam insufficienter in chaotica specierum hujus generis coacervatione descriptae sunt, ut, dum forte specimina olim quis viderit, prorsus praetermittendas et excludendas a nostris eas censuerimus.

31. *Syntrichia Bridel.* in *Diar. bot. Schrad.* 1800. 1. p. 299.

Dentes 16, supra medium (membrana) connexi, torti, apice divisi.

1. *S. subulata* Web. et Mohr., caule exiguo, simplici; foliis oblongo-lanceolatis, apiculatis, subpatentibus, strictis. *Dillen.* t. 45. f. 10. *Hedw. Specc.* t. 27. (*Tort.*). *Sturm.* 5. (in *Tab. nostra VIII.* ff. 4. 5. perist.).

Bryum L.

In agger., sepibus. Vere. 24.

Bene jam acutissimus Hedwig habet: „peristomii filamenta spiraliter inferne” (l. „ad extremitatem usque”) „in cylindrum coalita, superne libera.” — Sec. eundem hujus var. Tort. *pilosa* Schrad. Spic. p. 66. (T. *goettingensis* Bridelio, nominum mutatorum semper cupido); et habet Cel. Turn.: „varietas foliis piliferis (quae T. *pilosa* Schrad. fide Hedw.) hic illic occurrit: folia autem pilifera et mutica in eodem individuo reperi.” Ipsis nobis nunquam contigit Schraderianam plantam, et apud auct., videre.

2. *S. ruralis* Brid., caule elato, ramoso; foliis ovato-oblongis, piliferis, patentibus, recurvis. *Dillen.* t. 45. f. 12. *Hedw. Fund.* I. t. 6. ff. 28–32. *Sturm.* 2. *Spreng. Einl.* t. 6. f. 54. (sporang. c. perist.).

Brid. l. c., *Bryum* L., *Barb.* Hedw.

In tect., mur., agris, arb. Vere ineunte. 24.

Foliorum ex nervo excedente apiculus, longitudine fere folii, incanus mox, mox subviridis, semper serratus. Vix ac ne vix quidem itaque amplius distinguimus *Syntr. norvagicam* in Arch. f. d. syst. Naturg. t. 5. ff. 1a—1i depictam. Nec vel minimis diversa videtur alia stirps ex *Ind. occid.* nobis allata. — De *Bryo ericetorum* Dicks.

(Tort. Smith.) Turn. ait: „species huic proxima, foliis tenuioribus, non piliferis, siccitate contortis, primo visu differt.” An revera cum hoc anglico musco idem patagonicus Dillen. t. 45. f. 13., a Dicks. et Smith. citatus? — Folia demum in utraque *Syntrichia* margine leniter reflexa, nec, quod de nostra Turn. habet, „inflexa.”

32. *Catharinea* Ehrh. in hann. mag. 1780. p. 933., emend. in Beitr. I. p. 178.

Dentes epiphragma prehendentes. *Calyptra* paraphysiphora (sursum pilosa) l. nuda.

1. *C. undulata* Web. et Mohr., foliis lanceolatis, marginibus planis, undulatis; sporangio cylindrico cernuo; operculo longirostro. Dillen. t. 46. f. 18. Hedw. Stirpp. I. t. 16. et t. 17. ff. 11–13. (*Polytrichum*). Sturm. 2. (*Bryum*). Hoffm. Fl. t. 1. (*Bryum*).

Bryum L., *Catharinea* *Callibryum* Ehrh.

In sylvis; vere. 2.

Folia in hac mollia, non polytrichoidea, tamen marginibus aequae ac carina serrata. Operculum

longitudine sporangii. Calyptra tantum apice subpilosa.

β. minor, caule pumilo; foliis minus insigniter undulatis. *Hedw. Stirpp.* I. t. 17. ff. 14-21. (*Pol. undulatum β. minus*, excl. syn. Dillen.).

Pol. controversum Brid. musc., excl. syn. Dillen.
In agris.

Omnino non distincta haec habenda a var. *α.*; sed americanus muscus (*Dillen. t. 46. f. 19.*, *Pol. undulatum minus* Mich., *angustat.* Brid. Suppl.) ab auctoribus allegatus foliis erectioribus, multo angustioribus, sporangio longiore, angustiore omnino aliquantulum differre videtur.

2. *C. hercynica* Ehrh., foliis rigidis, marginibus involutis; sporangio erecto; operculo conico. *Hedw. Stirpp.* I. t. 15. (*Polytr.*) *Sturm. 2. (Polytr.) mala.*

Ehrh. Beitr. I. p. 190., *Bryum incurvum* Huds., *Orthotr. hercynicum* Hoffm.

In sylv. subalp. septentr. et merid. Germ.; aestate. 24. (e Norv. quoque habemus.)

Foliorum margines atque carina mox serrulata, mox integerrima. Singularem vero nervi s. ductulorum fasciculi in hoc musco lusum observamus. Mox enim supra basin singuli ductuli ab invicem parum recedunt, insigniter crispantur tales-

que ad apicem folii usque continuuntur. — Calyptra interrupte (undique) pilosa. — Cur linearia folia *Smith* dixerit? Sunt sane lanceolata.

33. *Polytrichum Ehrh.* in hann. mag. et Beitr. II. cc. ex antithesi, tacite *).

Dentes epiphragma prehendentes. *Calyptra* paraphysibus abruptis et ei adglutinatiss vestita (deorsum pilosa).

• sporangio angulato l. subangulato, apophysiato l. subapophysiato.

1. *P. piliferum* Schreb., caule simpliciusculo; foliis margine inflexis, piliferis; sporangio quadrangulo, apo-

*) Genus omnino naturalissimum et una cum *Catharinaea* eximie segregatum a toto reliquo muscorum grege. Sed difficillimum, uti in generibus naturalibus plerumque, natura fecit officium, species rite distinguendi; et veremur, ne justo longe plures earum auctores statuerint, posthac reducendas. — Moneri vix meretur, si aliis speciebus nervo instructa, aliis enervia folia hi l. illi tribuunt auctores, hoc plane injuste factum esse. Omnibus speciebus nervosa folia, nervo latiori in quibusdam minus tantum manifesto.

physi distante. *Dillen.* t. 54. f. 3.
Sturm. 4. (fol. *D. insufficiens* fig.).

Schreb. Lips. 74., commune γ . L.

In ericetis; vere. 24.

Folia margine carinaque integerrima, pilo solummodo serrulato. Quomodo revoluta *Smith* dicere potuerit non capimus; sunt enim quod in pluribus speciebus, marginibus inflexa.

2. *P. juniperifolium* Hoffm., caule subsimplici; foliis margine inflexis, integerrimis, carina serrulatis; sporangio 4-angulo, apophysi distante. *Dillen.* t. 54. f. 2. (fide Turn. et Smith. ex herb. Dill., foliis caeterum a Dill. margine serratis exhibitis, ut synonymum excludendum putaverint *Menzies*, et *Swartz* in *Diar. bot.* Schrad. 1800. 2. p. 173.). *Menz.* in *A. S. L.* IV. t. 6. f. 4. (opt.) *Hedw. Specc.* t. 18. ff. 6-10. (folii figg. 8. 9. malac.). *Sturm.* 4. (*P. juniperifol.* — fol. fig. C. mala), 5. (*P. alpestre* Hopp.).

Hoffm. Fl., *juniperinum* Willd. et plurimor. auctt., commune β . L., affine Funck Cryptt. exss. m. pin.

In ericetis, locis aridis l. udis quodammodo forma varians; vere. 24.

Bene quidem monet Cel. *Turner* inter PP. *pilif.* et *yuccaef.* hoc esse quasi medium, et sane cum illo foliis, praeter pilum, cujus loco heic mucro exstat, satis convenit. Si vero quoque in singulis individuis praesertim mucro folii non solum carina, sed etiam marginibus una alterave serratura instructus invenitur, tamen species non, ut *Turn.* suadet, cum *yuccaef.* conjungenda; potius toto coelo differt, foliis in ultima dicta specie marginibus planis, nec mucronatis, sed solummodo acutissimis. Vario vero modo fucum nostra alias auctoribus fecit, scil. in aridis atque in palud. et turfo-
sis, imprimis subalpestrium, habitu multum ludens, ex quo *P. affine* amiciss. Funck. (ipsissimum *P. juniperinum* Swartz. musc. suec.) et *P. alpestre* Hopp., sec. specimen originale a Funckio quoque communicatum, atque var. β . mox recensenda evaserunt. *P. alpestre*, quod in summo m. pinif. quoque provenit, nullo modo a vulgari stirpe differt, nisi quod acumen s. mucro folii in illo parum brevior, quod sane levissimi momenti censendum.

β . caule ramoso. *Vaill.* bot. paris. t. 23. f. 6.
Menz. in *A. S. L.* IV. t. 7. f. 1. (*P. strictum*.).

In siccis, apricis. (Ex *Am. sept.* quoque *Menz.* retulit.)

Caulis jam ad basin dividitur. Haec differentia omnis; bene itaque vel *Smith* atque *Turn.* consentientibus, ut pro varietate stirps habenda sit.

3. *P. yuccaefolium* Ehrh., caule subsimplici; foliis margine carinaque serratis; sporangio quadrangulo, apophysi distante. *Dillen.* t. 54. f. 1. *Sturm.* 4. (in Tab. nostra VIII. f. 8. cal.).

P. commune α. L., *commune* plurimor.

In sylvis. Vere. 24.

Magnitudine summopere ludens, saepe pedalis. Foliorum margines plani a praecedentibus certissime distinguunt. Num vero recentiorum auctorum plurimae exoticae species, insufficienter descriptae, v. gr. PP. *perigoniale* Mich. (etiam nostro eadem folia perigonialia, qualia auctor describit, nec *Europam* suo carere ipse dicit), *elatum*, *elongatum*, *remotifol.*, *subpilosum* Belvis., reapse diversae sint a nostro, quis autopta, nec specierum numeri nimis cupidus, nobis demonstrabit? Certe ex *Am.* bor. *P. yuccaefol.* quoque habemus, simillimasque masculas plantas e *Peruvia*.

4. *P. formosum* Hedw., caule simpliciusculo; foliis margine carinaque serratis; sporangio quadrangulo,

apophysi obsoleta, adnata. *Hedw.*
Spec. t. 19. f. 1. Sturm. 5.

P. attenuatum Menz. in *A. S. L. IV. t. 6. f. 2.*,
 testibus *Turn.* et *Smith.* (num recte, dijudicet no-
 ster *Swartz.* — icon bene quadrat), *pallidisetum*
Funck. in *Crr. exss. m. pin.* (parum tantummodo
 minus, caeterum nil differens.)

In subalpestr. Germ. infer., etiam in duc. *me-
 gap.* aliisq. locis. Vere, aestate. 24. (Magna co-
 pia circa *Holm.* quoque legimus.)

Habitu graciliori, eleganti, foliis evidentius ser-
 ratis, sporangio elongatiori, prae ceteris vero obso-
 leta et adnata, nec distante, apophysi a praecedente
 statim dignoscenda et bona omnino species. Pro-
 cul dubio olim cum *communi* stirpe commixta.
 Insigni vero errore *Cel. Turn.* tenetur, *P. auran-
 tiacum* Hopp. hujus varietatem faciens!

5. *P. gracile* Menz., caule sub-
 simplici; foliis margine carinaque ser-
 ratis; sporangio obsolete sexangulo,
 subapophysiato. *Menz.* in *A. S. L.*
IV. t. 6. f. 3. Swartz. suec. t. 8.
f. 16. (P. longisetum). Sturm. 4. (P.
aurantiacum Hopp.) mala.

In paludos., turfos. (prout videtur totius Germ.)
 Vere, aestate. 24.

Sporangium subapophysiatum s. basi contractum, ovatum, gibbum, subsexangulum (vix obovatum, quod Swartzii icon sistit). Folia margine diaphano serrata, dorso s. carina versus apicem tantum rarius serrulata. Distinctissima species.

6. *P. sexangulare* Floerk., caule simpliciusculo; foliis margine versus apicem leviter involutis, cum carina integerrimis; sporangio sexangulo, apophysi obsoleta, adnata. *Sturm.* 4. (fig. fol. *C. pessuma*).

In alpp. salisbb., tyroll., siless. (vix hucusque extra Germ.). Aestate. 4.

Optimi juris species, facile dignoscenda.

7. *P. septentrionale* Sw., caule subramoso; foliis acutiusculis, margine carinaque apice serrulatis, subhomomallis; sporangiis teretiusculis, subovatis, subexapophysiatis. *Fl. dan.* t. 297. (*P. Oederi* Brid.)? *Menz.* in *A. S. L.* IV. t. 7. f. 5. *Swartz. suec.* t. 9. f. 18. *Hedw. Specc.* t. 22. ff. 1-4. (*P. norvegicum* — vix bona, tamen specimin. a filio acceptis cum Swartzianis comparatis specierum identitatem probantibus.

Swartz. in Act. Holm. 1795. p. 270, *P. ferrugin.* Brid. Suppl. ?

In Germ. infer. alpp. *Schwaegr.* Aestate. 24.

Vexata stirps. Ab insequenti statura minore, foliis brevioribus, saepe subhomomallis, non toto margine, sed solummodo apice serrulatis, praeterea sporangio absque apophyseos vestigio, et inprimis operculi rostro longiore, recurvo ex mente *Swartz.* dignoscenda. Operc. vero in affinibus omnibus speciebus mox longius, mox brevius rostratum, et absque norma hodie incurvum, cras recurvum. Apophyseos porro umbra omnino et in nostro adest; nec sane folia interdum subhomomalla bonum characterem praebent. Cum *Turn.* itaque haesitamus, num propria species sit habenda, l. potius insequentis varietas. Sed hoc de peculiari *Swartzii* musco. Illum in alpp. Germ. merid. lectum ab amiciss. *Schwaegrichen* *Schrad.* quidem distinctum putavit, habens sub nomine *P. australis*. Essentialem tamen discrepantiam nec ipsi detegere valuimus, quamquam sedulo inquirentes. Addamus integram opt. *Schwaegrichenii* in viva planta institutam Obs. Exstat in *Schulte's Reise n. d. Glockner*. II. ad calc. hisce: „valde variat. Ad glaciem m. *Glockner* valde humile, folia non heteromalla, sporangia nunc globosa, nunc 5-angulata l. sexangularia; ramos edit 1-4. Gracilius et multo longius, minus ramosum, foliis evidenter

heteromallis in m. *Brennkogel* et *Schleinitz*. Foliorum margo involvitur, integer est, tantum ad summum apicem dens acutus unus aut alter conspicitur; etiam in dorso summi apicis folii apparet denticulus. Caeterum omnia conveniunt cum descriptione Cl. *Swartzii*; sed icon folii in ipso libro, quoad folium, corrigendum videtur, quippe descriptioni repugnans."

8. *P. alpinum* L., caule ramoso; foliis acutis, margine carinaque serratis; sporangiis teretiusculis, subovatis, apophysi obsoleta, adnata. *Dillen.* t. 55. f. 4. *Hedw. Specc.* t. 19. f. 2.

In subalpinis; aestate. 24.

9. *P. arcticum* Sw., caule ramoso; foliis acutis, margine carinaque serratis; sporangiis teretiusculis, oblongis, subexapophysiatis. *Swartz. musc. suec.* t. 8. f. 17. *Sturm.* 4. (*P. alpinum*), quantum ex fig.

P. sylvaticum Menz. in A. S. L. IV. t. 7. f. 6., vix dubie.

In subalpinis; aestate. 24.

Capsulis in oblongam formam magis elongatis, subexapophysiatis unice differre videtur a *P. alp.*,

a quo sane nec ipsi specie separassemus, nisi Swartzii auctoritas jussisset. Turnero quoque propria species non videtur, nec enumerata est a Smith.

•• sporangio tereti, exapophysiato.

10. *P. urnigerum* L., caule ramoso; foliis acutissimis; sporangio cylindrico. *Dillen.* t. 55. f. 5. *Hedw. Specc.* t. 22. ff. 5–7. *Sturm.* 4.

In sylvis montos. regg. Aestate. 2l.

Distinctissimum a tribus antecedentibus, et ab insequenti.

11. *P. aloides* Hedw., caule subsimplici; foliis obtusiusculis, rigidis; sporangio cylindrico. *Dillen.* t. 55. f. 7. *Hedw. Stirpp.* I. t. 14. *Sturm.* 4.

Mnium polytrichoides β . L., PP. *aloid.* et *rubellum* Menz. in A. S. L., hoc tab. 7. f. 3.

In sylvaticis, arenosis; vere. 2l.

Cum primaria *P. rubelli* Menz. diagnosis a *P. aloide*, ex ipso Menz. atque Smith. in foliis illius toto margine atque carina, hujus tantummodo versus apicem in margine, nec in carina serrulatis ponitur, in omni *P. aloidi* Hedw. vero etiam carina et fere toto margine serrulata folia conspici-

mus, cum D. *Templeton* (v. *Turn.* musc. hib.) non possumus, quin utramque speciem omnino conjungendam censeamus. Nec quibus essentialibus notis differat Pol. *Dicksoni* Turn., quod *aloid. nanum* Hoffm. Fl., apud nos similibus quibus Turner invenit locis vulgatissimum, ex specim. omnino est, sane videre possumus. Hanc ipsissimam plantam quoque *Crom.* misit e *Megap.* sub nomine Pol. *mini.* Novam praeprimis auctor putat speciem ex *calyptra* saepe infra sporangium circa setam residua, quod levissimus natura lusus, quotidie versatioribus muscologis obviis in omni fere genere. Cf. quae sub *Trich. sciur.* p. 125. et de *Timm. cucull.* Mich. observavimus. Heic apice *calyptra* pervia. — Pol. *laterale* *Crom.* Samml. n. 89. forte *rubell.* Mz. esset; est enim subramosa (ex innovatione) P. *aloidis* var. — Quoque P. *pulverulentum* Reyn. Act. Laus. — test. *Turn.* ex specim. a R. A. Hedw. acceptis ad P. *rubell.* Mz. pertinet.

12. P. *nanum* Hedw., caule simplici; foliis obtusiusculis, rigidis; sporangio subgloboso, subnutante. *Dillen.* t. 55. f. 6. G-H. (dubie ex *Menz.*, indubie ex *Smith.*, caeteris figg. A-F., quas, monente *Menz.*, *Dillenius* in propria schedula delineaverat, ex utro-

que ad *P. subrotundum* Huds. pertinentibus). *Hedw. Stirpp. I. t. 13. Sturm. 4.*

Minium polytrichoides α . L., *P. ericoides* Hoffm. Fl.

In ericetis, arenosis; aestate. 24?

Folia in hac carina vix summo apice obsolete serrulata. — Si olim putaverimus (*Arch. f. d. syst. Naturg. p. 146.*), *P. subrotundum* Huds. a Swartziano *pumilo* forte differre, nec nisi var. esse *P. nani*, hoc ex errore factum est, cum a b. am. Noehden pro *P. subrot.* specimina anglica accepissemus, quae evidenter non distincta a *P. nano*. Swartzianum *P. pumilum* in *Helv.* („supra *Servan en geule* in sylva”) nunc quoque legit Schleicher (*Cent. 2. n. 16.*); sed foliis brevioribus, minus evidenter serrulatis, sporangio suberecto, subturbinato an revera haecce species satis differat a *P. nano* semper adhuc nobis (cum amiciss. *Turn.*) dubium. E Germ. collectum vix hucdum vidimus (tamen in Fl. sua *Hal.* Sprengel enumerat; merito, nec ne, dijudicare nequimus); nec *P. pumilum* Schum. verum censere valeamus, ex foliis nimis longis. Potius minus *P. nanum* videtur. Demum nec ullo modo Pol. *intermedium* Brid. Suppl. ab ipso am. Blandow. miss. a vulgari musco discernere valeamus.

2. duplici.

* dentibus rectis.

34. *Orthotrichum* Hedw. *)

Calyptra carinata (glabra l. sursum pilosa. *Dentes* subgeminati; *cilia*, si adsint, distincta, libera, aequidistantia).

* ciliis deficientibus.

1. *O. anomalum* Hedw., foliis lanceolatis, subpatentibus; seta exserta; dentibus 8 geminatis; calyptra pilosa. *Dillen.* t. 55. f. 9. *Hedw. Fund.* 2. t. 7. f. 35. (sporang. c. perist.), *Stirpp.* 2. t. 37.

*) Omnium fere muscorum generum naturalissimum, nunquam dirimendum, nec speciebus similibus quidem, longe autem diversis (quod *Brid.* et *Belvis.* fecerunt) praeter naturam distandum, l. potius perturbandum. In genere *Bryum striatum* L. continet, sexu gaudet vario, marib. gemmaceis alaribus in eadem, l. capituliformm. terminall. in diversa stirpe, annulo s. fimbria prorsus destitutum, operculo semper convexo-brevius et recte rostellato, foliis integerrimis, patentibus, nervo excurrente praeditis, utens. Pulchrius vix ullum genus; difficiliora non multa.

Bryum striatum B. L., *Weissia ithyphylla minor* s. *Weiss. minor* Ehrh.

In sax., mur., vulgare. Vere, aestate. 24.

Peristomium minus juste in *Stirpp.*, quam in *Fund.* l. c., Hedw. depinxit. — Vix nisi colore atrato ab hoc differt *Orth. longisetum* Schleich. Cent. 2. n. 32., „ad rupes aridas in valle *Servan.*” lectum, nec nisi statura duplo minore altera Schleicheri species, *O. humile*, Cent. 4. n. 15. „in valle *Saanen* ad rupes” inventum.

2. *O. cupulatum* Hoffm., foliis lanceolatis, subpatentibus, sporangio immerso; dentibus 16 geminatis; calyptra subpilosa, hemisphaerica. *Dillen.* t. 55. f. 10.?? (volente Hoffm.).

Hoffm. Fl.

Ad saxa circa *Goett.* Hoffm. („hinter dem *Heimberg*,” uti olim ipse dixit,) nuperius circa *Neobrand.* megap. Schultz. Autumno. 24.

Peristomii dentes in planum convergentes et quodammodo cohaerentes, minusque reflexiles sunt; quod etiam de dentibus antecedentis speciei in *Stirpp.* bene *Hedw.* monet. Cum enim in hisce duobus cilia omnino nulla, talis dentium ratio necessaria evadit, ne citius sporae aufugiant. Nostra sane distinctissima species. Sed ex verbis et figg. *Dicksoni*, nec non e *Smith.* descript., admo-

dum simile ei videtur, forte idem, *O. nudum* Dicks. t. 10. f. 15. (*Engl. Bot.* t. 1325.), a nobis nondum visum. Hoffmannianus muscus calva s. nuda calyptra quoque observatur; et caetera omnia, etiam specialior locus in saxis, conveniunt. — Orth. tandem *cupul.* Schleich. Cent. 3. n. 33. verum omnino existimandum; peristomio enim simplici utitur dentium 16 geminatorum, reliquisque omnibus convenit notis, licet statura majori habituque diffusiore gaudeat, quod vero a natali solo certo certius pendet. Est enim a Schleich. repertum „in alveo torrentis pr. Roche.” Etiam huic calyptra subpilosa. — Schultziano musco eadem fere facies cum Schleicher., et idem quoque locus in humidiusculis.

** ciliis octo *).

3. *O. obtusifolium* Schrad., foliis ovatis, obtusis; sporangio immer-

*) Uti *Splachnis*, sic et omnibus *Orthotrichis*, si accuratius in peristomium investigates, dentes *sedecim* sunt, per paria saepe sibi invicem agglutinati, et cohaerentes, singuli obscuriore linea longitudinali medio notati, in hac linea non raro iterum divisi, ut tum 16 geminati sive 32 simplices evadant. Hac nostra in subdivisione sedecim dentium bini utplurimum arcte conglutinati remanent, quo inter tales binos conjunctos cilium superfluum esset ad tuendas sporas. Eo modo hic tantum 8 cilia!

so; dentibus 8 geminatis; calyptra subpilosa. *Swartz. suec. t. 4. f. 8.*

Schrad. Samml.

Ad arbb.; aestate. 2l. (rarius fructiferum.)

Foliis latissimis, concavis, obtusis, margine planis, nec revolutis, facile distinguendum. Etiam in hac unica specie cilia ipsa geminata esse videntur, licet, ut in reliquis, alternentur cum dentibus. Non prorsus juste itaque, putamus, de interno hujus speciei peristomio noster locutus est Swartz. In *Suec.* haec species copiosissima, nobis saepius obvia. Nervus folii non evanescit, quod Schraderus habet.

4. *O. pumilum* Swartz., caule subdiviso; foliis lanceolatis, acutis; sporangio immerso; dentibus 8 geminatis; calyptra glabra. *Swartz. suec. t. 4. f. 9.*

In arbb., pr. *Erf. Bernh.*; duc. *Megap. Bland.*; *Kil. Hols. Ipsi.* Vere, aestate. 2l.

Si vero mox 8, mox 16 geminatos dentes singulis adscribamus speciebus, hoc ita intelligas, ut in illis vix prima divisio 8 parium in dentes 16 simplices, in his saepe saepius et altera 16 parium in dentes 32 distinctos locum teneat.

Pumilum; vix dimidium pollicis superans. Dentium 8 paria in 16 simplices omnino demum, sed rarius, divisos observavimus!

5. *O. affine* Schrad., caule ramoso; foliis oblongo-lanceolatis; sporangio immerso; dentibus 8, l. 16 geminatis; calyptra pilosa. *Dillen.* t. 55. f. 10.? (ita *Smith.*).

Schrad. Spicil., *Weissia octoblepharis* Roth.

In arbor. et rupibus; aestate. 24.

Folia et statura insequentis speciei, peristomia antecedentis, nec cilia, ut in *Orth. striato*, moniliformia, sed filiformia. *Weiss. octoblepharis* Roth. essentialibus nullis, fide specimm. differt. Dentes initio ita arcte geminati, ut 8 tantum appareant, ex quo Rothii error. *Dillenii* synon., ab *Hoffm.* ad *Orth. cupul.* citatum *Smith*, dubitanter tamen, huc refert. In rupibus multum ludit species colore ac habitu, non essentialibus quibusdam notis. Hujusmodi formae *Orth. octoblepharis* Schleich. Cent. 2. n. 30. („ad saxa” lectum) et *Orth. rupestre* ej. Cent. 3. n. 34. („in valle Saas ad rupes umbrosas” inventum.) Nec a nostro diversum, et minime genuina species, *Orth. pumilum* Schleich. Cent. 3. n. 32. ex arboribus.

*** ciliis 16.

6. *O. striatum* Hedw., caule ramoso; foliis oblongo-lanceolatis; sporangio subimmerso; dentibus 16 geminatis; calyptra pilosa. *Dillen.* t. 55. f. 8. *Hedw. Stirpp.* 2. t. 36.

Bryum striatum α . L., *Weissia ithyphylla major* s. *Weiss. major* Ehrh.

In arboribus; vere et aestate. 24.

Folia, vix (nisi forte casu), quod Hedw. habet, apice erosa; sed plane eadem, ac in antecedente. Cilia 16 moniliformia distinctissimam produnt speciem, quam, fide Smith. *Ehrhart*, et procul dubio alii multi cum praecedenti confuderunt et adhuc confundunt. Huic proximum, reliquis exemptis, etiam ciliis filiformin. diversum nobis visum, *Orth. rivulare* Turn. hib. t. 8. Nostrum magnitudine multum variat, et, bene jam adnotante *Turn.*, etiam „calyptra calva” ludit. *Orth. striatum* β . *Turn. hib.* sterile tantum vidimus; et sane habitu multum a nostro recedit. *Michaux* quoque in *Am. bor. O. striat.* ab ipso lectum esse refert.

7. *O. diaphanum* Schrad., caule simpliciusculo; foliis lanceolato-acuminatis, acumine albido, piliformi, margine revolutis; sporangio immer-

so; dentibus 16 geminatis; calyptra subpilosa. *Turn. hib. t. 9. f. 1.* (in *Tab. nostra IX. ff. 2. 3. perist. et calyptra*).

Schrad. Spicil.

In arboribus. Vere. 24.

Cilia capillacea, non moniliformia, ut in priori specie. — Ab hoc nostro Angli nunc, ipsi dubitantes tamen, distinguunt *Orth. diaphanum* Dicks. t. 10. f. 12. (*O. aristatum* *Turn. hib. t. 9. f. 2.*), quod colore nigro-viridi, calyptra utique nuda, foliis margine vix revolutis praeprimis differre dicitur. Revera quoque pilifera *Turn.* folia describit, scil. nervo, folii paginam exsuperante, solo pilum constituyente, cum in nostro certe diaphanus apex e folii pagina et percurrente nervo (non, quod velle videtur *Turn.*, solummodo e pagina folii absque nervo) formetur. — E specimine quoque a nostro vix multum discrepare videtur *Orth. heterophyllum* *Pal. de Beauv. prodr.*, haud procul a *Paris.* lectum. — Nullo vero modo distinctum ab *O. diaph.* e specim. ab amiciss. *Swartz.* communicatis censere valemus *O. ulmivola* *An. de Cienc. nat. No. 14. p. 186.*, quod male crit. in (*Hall.*) *A. L. Ztg. 1805. Nov.* *O. affine* declarat. Si descriptionem rite perlegisset, jam ex ciliis 16 effatis verbis ab auctoribus suae speciei tributis et ex fo-

illis piliferis ab iis memoratis, errorem perspexisset!

35. *Neckera Hedw.* *)

Cilia distincta, libera, aequidistantia. *Calyptra* dimidiata, l. mitraeformis (laevis l.) sulcata, non carinata — glabra l. sursum pilosa.

• calyptra mitraeformi sulcata.

1. *N. ulophylla* Web. et Mohr.; foliis e latiori basi lineari-subulatis, erecto - l. subpatentibus, siccitate flexuosis et crispatis; seta brevi. *Dillen.*

*) Singulis sane nostrae Florae hujus generis speciebus nervi singuli certe vestigium adest; et miramur, summos hucusque muscologos, quantum scimus, praeter *Belvis.*, omnes, speciebus *foliis bifariam imbricatis* gaudentibus, quarum ex numero in hoc opere altera et tertia, exoticae plures, hancce partem denegasse. Subnullus quidem est dictus nervus in *N. pennata*, tamen ad basin melioribus vitris arripendus. Evidentissimus est in tropica *N. disticha*, et in hoc a Belvisio inventus; est enim *Pilotrich. truncatum* laud. auct. ipsissima haec species. Integerrima quoque plurimarum nominatae tribus pinxerunt atque descripserunt specierum folia summi viri; sane non meliore jure.

t. 55. f. 11. *Hedw. Stirpp. II. t. 35.*
(*Orthotr. crispum*). *Sturm. 4.* (male
absque interno perist.) (in *Tab. nostra*
IX. f. 3 a. calyptra.)

Bryum striatum J. L., *Weissia ulophylla* Ehrh.

In arborum truncis; vere. 24.

Caules ramosi. Folia integerrima, nervo ex-
currente. Sporangium subcarinatum, peristomii
dentt. 8 geminatis, ciliis 8 (l. 16?). Calyptra sur-
sum pilosa. Hedw. quidem 16 cilia in hac specie
observavit; bene vero jam Cel. *Smith* monet, mul-
to magis (et in Britannia semper) 8 ciliorum peri-
stomium internum inveniri; nec ipsi unquam aliud
reperimus. Non itaque diversum habere valemus
a nostra stirpe *Orthotr. cirratum*, quod ab *Erfurto*
benevole nobis misit (sed non satis completa spe-
cimina) Cel. *Bernhardi*, quodque sequentibus ipse
diversum censuit in litt.: 1) perist. interni ciliis
semper 8; 2) sporangiis cum seta multo minori-
bus; 3) foliis brevioribus, basi latioribus; 4) prae-
primis pilis calyptrae erectis, brevioribus, nec in-
ferne diffusis, patentibus, et calyptra ipsa longio-
ribus. — Tandem ut de loco musci in systemate a
nobis mutato paucis loquamur, necesse est. Aegre
sane contra omnium scriptorum auctoritatem ab
Orthotrichis eum removimus, et ut recte feceri-
mus, vix hodie quemquam concessurum esse spe-

ramus. Tamen forte nullus negabit, a reliquis *Orthotrichis* hocce olim dictum *foliis siccitate crispis* aliquantulum distare. *Orthotrichi* generis vexatissimi firmum alium nullum, nisi e calyptra, characterem reperire ut potuerimus, in conspectu generum pluribus monuimus. Hoc characterē sane diversa Neck. *ulophylla*; cf. figg. nostr. 2 et 3 a. in tab. IX., et quae supra in generum enumeratione laud. diximus. Convenit vero potius ipsa calyptra noster muscus cum exoticis pluribus (forte *Hypno polytrichoidi* Hedw. et — si pilos negligas — *Anictang. cirrhoso* ej.), hucusque, perperam, ut putamus, *Neckeris* adnumeratis. Cum vero hic non locus sit *Neckerae* generis reformandi, ad interim nil facere potuimus, voluimus, nisi ab *Orthotrichis*, ut hocce certe genus stabiliatur demum atque mundetur, nostram speciem segregare. — *Crispae* triviale nomen nunc erat rejiciendum ob alteram Neck. *crispam*; olim restituendum erit, si in plura dissimillimae *Neckerae* genera distributae sint.

•• calyptra dimidiata.

2. *N. crispa* Willd., foliis bifariam imbricatis, ovato-lanceolato-acuminulatis, siccitate transversim plicatulis; seta exserta. *Dillen.* t. 36. f. 12.

Willd. bevol., Hypn. L.

In nemorosis, montosis, praeprimis calcareis, rarius fructificans. Vere, aestate. 2l.

Nervus folii tantum ad basin, obsoletissimus, cito evanidus. Acuminulo folia bonis lentibus serrulata. — Eandem ipsam habemus ex ins. *Teneriffae*.

3. *N. pennata* Hedw., foliis bifariam imbricatis, lanceolatis, serrulatis, siccitate transversimplicatulis; seta immersa. *Dillen. t. 32. f. 9. Hedw. Stirpp. III. t. 19.*

Fontinalis L.

Ad arbb. in subalp. (vix in *Herc.*, uti Web. habet in Spicil. — muscus in auct. herb., fructu destitutus, alia species videtur; nec unquam recentiores in designato loco legerunt.) Vere. 2l.

Toto fructu foliis perichaetialibus abscondito statim a praecedente dignoscitur. Calyptram bene Hedw. l. c. depinxit; nec aliam in americana stirpe (*Neck. pennata* Mich. bor. - am.) reperimus, quamvis sursum pilosam auctor describat, simul adnotans, peristomium internum nullum adesse. Nisi ab ipso speciminula haberemus, aliam eum designare voluisse plantam crederemus. — Simillima nostrae dicitur et est *Neck. pumila* Hedw., vix extra *Angl.*, nec in *Helv.* (*Schleicher* enim, et

vulgatissima ignorans, et diuturne dissimillima confundens, scilicet pecuniam solummodo quaerens, nec scientiae emolumentum, in Cent. 4. n. 21. pro hac sterilem quidem muscum, vix tamen nisi Lesk. *complan.*, dedit) hucusque lecta. Habitu gaudet *N. pennatae*, multo tenuiore vero, foliis forma magis accedentibus nobis visis ad ea *N. crispae*, nervo brevissimo evanescente quoque instructis et apice serrulatis. Calyptram etiam dimidiatam, nec mitraeformem, qualem *Belvisius* suspicatur, observavimus. Seta vix exserta praeprimis haecce dignoscitur, et ita quasi intermedia inter *crisp.* et *pennat.* est.

4. *N. viticulosa* Leyss., foliis aequaliter sparsis, ovato-lanceolatis, obtusis, margine undulatis, integerrimis, subhomomallis, siccitate crispatis. *Dillen.* t. 39. f. 43. *Hedw. Specc.* t. 48. ff. 4. 5. (in *Fund.* I. t. 3. f. 11. anthera, II. t. 8. f. 49. perist., fig. 50. annulus.)

Hypn. L.

Ad arbb., etiam in terra in sylv. Vere. 24.

Foliorum nervus huic excurrent, validus. Var. *β. minorem* pensylvanicam Hedw. l. c. ff. 6-8. (et Mich. bor. am.) nondum quidem vidimus; an

tamen juxta propriam censuerit speciem, sibi Neck.
minor., Cel. *Beauv.*, dubitamus. Diversis ima enim
et apud nos ludit magnitudine muscus, pumilus
inprimis, si terrestris.

5. *N. curtispendula* Willd., fo-
liis aequaliter sparsis, ovato-acumina-
tis, nervo sub acumen evanescente,
serrulatis; sporangio ovato, effoeto
subpendulo. *Dillen.* t. 43. f. 69.

Willd. berol., *Hypn. L.*

Ad arbor. et rupes in montosis. Vere. 2.

Nervus folii ad $\frac{2}{3}$ altitud. evanescit. Apex s.
acumen foliorum omnino serrulatum, bene hoc
Turn., male contrarium *Smith.* statuente. — *Dil-*
len. eundem muscum e *Patagon.* habuisse afir-
mat. Si specimina asservaverit — depinxit nulla
— in herb. beati Angli videant, numne differant.
— Cur figuram Dillenii noster vituperaverit *Brid.*,
vix capimus.

+ 6. *N. decipiens* Web. et Mohr.,
foliis aequaliter sparsis, ovali acumi-
nulatis, nervo supra medium evane-
scente, apice serrulatis; sporangio el-
liptico, erecto.

E *Salisb.* Flörke (dubie pro *Pterig. filif.* Hedw.)
24. (uti videtur ad arbor. truncos.)

Cf. quae sub *Grimm. ornithopod.* supra monuimus.

Neckera heteromalla Hedw., s. *Sphagn. arbo-
reum* L. in *March. brandenb.* et *Bavar.* (*Grimm. arbo-
rea* Schrank Fl.) lecta quidem dicitur (cf. *Brid.*).
Cum vero nec a nobis ipsis, nec a plurimis amicis,
celeberrimis muscologis, germanica unquam visa
sint exempla, ambiguis auctoritatibus suffulti, re-
cepta ea Floram nostram conspurcare potius quam
ditare nolimus. Vix hac nisi *Anglia* superbit;
plurima enim auctt. synonyma dubia. Ad unguem
europaeae stirpi similem, maiorem tamen plantam,
inter muscos e *Mascarenhis* relatos reperimus,
quae sane nec Hedwigii Neck. *filiformis*.

36. *Leskia* Mohr. Obs. bott. p. 31.

Peristomium interius membranaceo-laciniatum,
laciniis aequalibus, integris.

• seta terminali (*Pohlia* Hedw.)

1. *L. elongata* Web. et Mohr.,
foliis elongate lanceolatis, apice serru-
latis. Hedw. Stirpp. I. t. 36. (*Pohl.*)
(in Tab. nostra X. f. 1. perist. pars.)

Mnium *Pohlia* Hoffm. Fl.

In viis cavis montoss. region.; v. gr. pr. Chem-
nitz. Sax. Hedw., pr. Hanov. Ehrh., in Francon.
Funck, Siles. Ludw. Aestate. 24.

Foliorum stirpis forma in ic. Hedw. justa, sed
serraturas apice vitris maximis conspicuas auctor
omisit. Operculum breve, conico-acuminatum, re-
ctum. Annulus speciei denegatus ab immort.
Hedw. omnino adest, et quidem compositus. Nec
quidquam valent Sprengelii somnia, tanquam inte-
rius peristomium essentialiter aliud esset, quam
Hedw. id descripsisset atque delineasset. In minus
essentialibus tamen paulisper diversum ipsi inve-
nimus, scil. membrana paulisper minus alta, pro-
cessus carinati; v. fig. nostr. Icon Sprengelii ab
alienissimo musco, cum etiam exteriores dentes
denticulatos exhibeat, qui revera integerrimi. Et

sane quam plurimi muscologorum, microscopicae harum stirpium inquisitioni non addicti varia auctt. Brya pro genuina hac Hedwigii *Pohlia* sumserunt, quod *Schleichero* quoque (Cent. II. n. 36.) et aliis accidit. Num igitur *Smithio* fides habenda, ut in herb. Dill. sub Br. *nutante* Schreb. (t. 50. f. 61.) haec commixta sit stirps? Vix inter sexcentos ab aliis pro *Pohliae* acceptis surculis paucissimos genuinos reperimus. Tales in *Ehrh. Dec.*, *Ludw. Mooscent.* 1., *Funck Cryptt. exss.* Quid sibi velint „flores hermaphroditi, terminales” in *Hedw. Specc. musco* adscripti, cum sic. auct. *Stirpp.* „flores dioici, terminales; masculi capituliformes,” ut in *Bryo Hedw.*? Demum *Pohl. minor.* *Schleich.* Cent. 4. n. 19. nil nisi vera tandem *P. elong. H. minoris* staturae!

2. *L. inclinata* Web. et Mohr., foliis lanceolato-longissime tenuissimisque acuminatis; subintegerrimis. *Swartz. suec.* t. 5. f. 11. (*Pohl.*).

In uligin. *duc. megap.* Bland. 24.

Diffidentissime speciem inter nostras recipimus. *Swartz* muscum olim ad font. *arc. Upsal.* unice legit, nec recent. tempore ibidem unquam denuo repertus est. Certe non bene summ. vir peristom. int. observavit. Quae enim ei „cilia geminata transversa unita” l. „denticuli reticulati” (expres-

siones rem sane obscurissimam relinquentes, repetitae tamen a Brid.) nil nisi peculiare 16 majores et perforati processus, qui quidem cum dentt. externis alternantur. Ultimi non inflectuntur. Minores processus plurima a Swartzio condonata specimina anxie dissecantes nullos reperimus, et experti sumus, quod am. vir habet: „difficillime perist. int. separatur ab exteriori.” Nil igitur de perist. int. hucusque dicere valeamus, nisi est *membranaceo-laciniatum* (conjuncta membrana satis alta!), *processibus, uti videtur uniformm., latis, carinatis, cum dentt. perist. ext. alternantibus, perforatis.* Nec in surculis a Bland. transmissis meliori ave analysin perist. int. suscepimus. Tamen hoc convenire videbatur cum eo suecicae stirpis, uti sane folia, sporang., operc. plane congruebant. Hic etiam annulum evidenter vidimus, quem, et quidem compositum, non minus in Swartzianis exemplis observasse nobis visi sumus, non hoc pro certo affirmantes, cum contrarium auctor teneat.

** seta alari (*Leskia* Hedw.)

† foliis bifariam imbricatis (*pterygoidis*).

3. *L. complanata* Timm., foliis acuminatis, enervibus, integerrimis.
Dillen. t. 34. f. 7.

Hypn. L.

In truncis arborum; vere. 24.

Surculi pinnatim ramosi; ramuli apice attenuati.

4. *L. trichomanoides* Leyss., foliis muticis, nervo evanescente instructis, apice serratis. *Dillen.* t. 34. f. 8. *Sturm.* 2. (*Hypn.* — fig. *pes-sumae*).

Hypn. Schreb. lips.

In truncis arborum; vere. 24.

Minus regulariter ac in antecedente surculi in hac pinnatim ramosi. Ramuli obtusi. — Nec hujus folia enervia, nec hujus et antecedentis complicata, quod *Turn.* habet.

†† *foliis aequaliter sparsis.*

a. uninerviis.

α. nervo excurrente.

5. *L. paludosa* Hedw., foliis subhomomallis, nervo versus apicem obsoletiore; sporangio erecto-cernuo. *Dillen.* t. 37. f. 27. B., fide *Smith.* ex *herb. Dill.* *Hedw. Stirpp.* IV. t. 1.

Ad radd. arbb. in locis inundd.; aestate. 24.

Surculi repentes; rami erecti, subsimplices. Folia sicca homomalla evadunt, eorum nervus versus acumen obsoletior, non tamen evanescens. Tota planta lurida.

6. *L. polycarpa* Ehrh., foliis subhomomallis; sporangio subaequali. *Dillen.* t. 42. f. 65., fide Anglor.

Ehrh. Decc., *Hypn.* medium Dicks., fide Turn. et Smith.

Ad arbores; aestate, autumn. 2l.

Facie omniumque partium formis, rationibus simillima *L. palud.*, ut aegre tantum distinguatur. In siccioribus vero crescit, amoene viridis est, nec lurida, neque ita tenuis ac illa species (contrarium, ex errore putamus, habet *Turn.* nostrae „duplo tenuiores” ramos adscribens). Caeterum folii nervus in *L. polyc.* ad apicem usque satis validus, obliterated fere superne in *L. palud.* Illius quoque sporang. paulo grandius minus versus orem incurvatur, non tamen plane aequale est; ut vituperanda illa coordinatio in Hedwigii Op. posth., ex qua longe ab invicem cognatissimae species separantur. Primum et bene eas composuerunt *Smith* et *Turn.*; nec quomodo acciderit, ut inter utramque *L. attenuatam* Roth. collocarit, ac *polycarpam* speciem ab hac et a *Grimm. filif.* distinguendam docuerit, divinabimus. Sane cum germanicarum

nulla nostra confundenda, nisi cum antecedente. Inter exoticas vero ambabus simillimae LL. *gracilescens* et *obscura* Hedw.

7. *L. incurvata* Hedw., foliis homomallis; sporangio cernuo. *Dillen.* t. 36. f. 21. (ex Turn.). *Hedw. Specc.* t. 53. ff. 8-14.

Hypn. dubium Dicks., volente Turn.

In udis alpestribus; vere. 24.

L. varia Hedw. americana simillima foliis non homomallis ab hac praeprimis differt. Folia figura caeterum, nervi versus apicem ratio (cf. ad *L. brachyclad.* adnot.) illi prorsus eadem.

β . nervo evanescente.

8. *L. brachyclados* Schwaegr., foliis ovato-acuminatis, subhomomallis; sporangio cernuo.

Schwaegrichen in Schulte's Reise T. 2.

„Ad terram et saxa inter glacies *Salinshöhe*.“

Schwaegr.

„Caulis longus, procumbens, intricatus, pinnatim ramosus. Rami vetusti, tenues, curvati, virides, aut fusco-virentes. Folia subsecunda, ductulorum fasciculo versus apicem evanescente, utrinque stria seu plica exarata, quae interdum in altero

latere deest; margine subtiliter serrata: areolis reticuli angustis elongatis, valde concava. Pedunculi flexuosi, tortiles, apice saepe curvati. Sporangium nutans, demum cernuum. Operculum convexum obtusum. — Similis Lesk. *incurvatae*, diversa ramis copiosioribus, multo brevioribus, minus adunco-curvatis, foliis serrulatis, ductulorum fasciculo non emergente et tenuiore, foliis minus secundis, operculo non conico." Auct. l. c. — Ipsi speciem non vidimus; et monemus, subserrulata quoque folia esse dicenda in *L. incurv.*, nervumque hujus, licet non vere evanescat, ad summum tamen apicem obsoletiore evadere, ut vix ex hisce multum discriminis inter utramque speciem statuendum esset, nisi forte operculum reliquaue magis essentialiter discrepent.

9. *L. sericea* Hedw., foliis lanceolato-subulatis, subhomomallis; sporangio aequali. *Dillen.* t. 42. f. 59. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 17.

Hypn. L.

In arbb., muris, ad terr.; vere. 24.

Surculi repentes. Rami erecti, pinnati. — Non 3-nervia, quod *Smith* habet, sed striis duabus submarginalibus folia notata.

10. *L. attenuata* Timm., foliis ex ovata amplexante basi lanceolatis, acu-

tiusculis, subhomomallis; sporangio aequali. *Dillen.* t. 42. f. 66., excl. fig. d. volente *Smith.* ex *herb. Dillen.* *Hedw. Stirpp.* I. t. 12.

Timm. megap., *Hypn.* Schreb. lips.

In arbb.; autumn. 2l. (Fructum rarius profert.)

b. enerviis.

11. *L. subtilis* Hedw., surculis reptantibus; foliis lanceolato-acuminatis, integerrimis, subhomomallis; sporangio subcernuo; operculo conico. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 9.

Ad radices arborum. Vere; aestate. 2l.

Differt ab *Hypno serpenti* H. et *tenui* Schrad. cum quibus saepius comitantatur, praeter characterem generis, praecipue foliis angustioribus, enerviis, integerrimis, sporang. subaequali, nec insigniter cernuo. Cum *Leskiis* insequenti nostra ac *pulchella* H. (hucusque in Germ., quantum scimus, non lecta) multum quoque affinitatis habet, sed ambabus longe tenerior est, ab illa notis in diagnosibus exhibitis, ab hac surculis reptantibus (nec confertis, erectiusculis), foliis angustis (nec ovato-

acuminatis) sporangioque minus cernuo, longiori praeterea distinguitur. Cum Grimm. *filif.* vix confundas.

12. *L. polyantha* Hedw., foliis patentibus, subhomomallis, lanceolato-longe tenueque acuminatis, subintegerrimis; sporangio (sub-) aequali; operculo conico. *Dillen.* t. 42. f. 62. (vix justa; tamen synonym. certum etiam sec. *Smith.* ex *herb. Dill.*). *Hedw. Stirpp.* IV. t. 2.

Hypn. Schreb. lips., *filiforme* Huds. angl. ed. 2., *filiciforme* ej. ed. 1. ex errore typogr., qui error caetera „inepta” (*Smith.*) nomina *filicifolium* L. Mant., *filifolium* alior. peperit.

In arboribus; vere. 2.

In *Britann.*, fide *Turn.*, operculo rostrato, acuto occurrit; nos semper tantum operculum conicum, breve vidimus. *Dillen.* quoque illius, nec hujus, formae exhibet. Num itaque anglica stirps certe eadem? Qui Anglos non curantes subtiliores peristomiorum internorum (inter *Leskias* et *Hypna*) differentias norunt, forte dubitabunt.

13. *L. julacea* Schwaegr., foliis imbricatis, undique vergentibus, ovatis, obtusis.

Schwaeग्रichen in Schulte's Reise T. 2.

In terra nuda inter gramina ad latera declivia
alpis *Gösnitzensis* ante casas priores pastorum.”
Schwaeग्र.

„Caulis intricatus, rami curvati ex albido virentes, teretes, valde fragiles. Folia albo-virentia, arcte imbricata, in formam squamarum amenti coryli hiemalis. Pedunculus e latere caulium flexuosus, rigidus, erectus. Sporangium ovato-truncatum. Peristomii exterioris dentes albi, pellucentes. Operculum breve, apice obtusum, rotundatum. — Differt a simili *L. pulchella* ramis teretibus, foliis obtusis, arcte imbricatis.” Auct. l. c., mentionem particularem non faciens peristomii inter. Plantam nondum vidimus; et, num recte descripta sit, necne, e simili quadam specie, quam asservamus, determinare nolumus.

37. *Climacium* Web. et Mohr.
It. suec. p. 96.

Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis divisis, cruribus per trabes apiceque connexis.

1. *Cl. dendroides* Web. et Mohr.
Dillen. t. 40. f. 48. *Fl. dan.* t. 823.

f. 2. *Sturm.* 2. (in Tab. nostra X.
f. 2. perist. int. pars.)

Hypn. L., *Neckera* quorund. male, *Lesk.* Hedw.
melius.

In pratis humid. ; in montos. regg. rarius cum
fr. Vere. 2.

Caules decumbentes, reptantes. Rami erecti,
inferne nudi, superne ex ramulis fasciculatis den-
droidei. Folia sparsa, undique vergentia, stricta,
nervo paulo infra acumen evanido. Operculum co-
nicum, subincurvum, $1\frac{1}{3}$ sporang. longitud. — Cae-
terum in *Europaea* stirpe: *Ramuli laxi foliosi;*
folia subpatentia, lanceolata, acutiuscula, plica di-
stincta utrinque pone marginem instructa, superne
serrata; sporang. ellipticum; — in Americano
musco: Ramuli dense foliosi; folia erecto-paten-
tia, multo latiora, breviora, ovata, obtusiuscula,
vix ita conspicuis plicis submarginalibus notata,
toto margine, nec apice tantum, evidentius serr-
ata; sporang. cylindraceum. Operculi in utroque
musco, respectu sporangii sui, eadem ratio, peri-
stomii eadem ratio, nec non folii nervi. An spe-
cies distinguendae sint? Sane characteribus distin-
gui possunt. Tamen *Dillen.*, *Michaux.*, *Hedw. fil.*
non distinctas putant.

38. *Timmia Hedw.*

Peristomium interius membranaceo-laciniatum, laciniis divisis, cruribus apice solummodo connexis.

1. *T. megapolitana* Hedw., foliis e parum latiori basi lineari-lanceolatis, marginibus planiusculis. *Hedw. Stirpp.* I. t. 31. (in Tab. nostra X. f. 5. $\frac{1}{16}$ perist. int.)

„In prato turf. inter carices pr. *Malchin* duc. *megap.* — Aestate. — 4.” (Hedw.)

2. *T. austriaca* Hedw., foliis e lata amplexante basi subulatis, marginibus inflexis. *Hedw. Specc.* t. 42. ff. 1–7. (in Tab. nostra X. ff. 3 et 4. perist. int. $\frac{1}{4}$, et dens per. ext.)

„In subalpin. *Schneeberg* Austriae, *Geuns* dictis, invenit D. Froelich” (Hedw.), in alpp. *Carniol.* *Schwaegr.*, „am neuen Wege bei *Wildbad* in *Gastein*” *Flörke* (pro *Timm. megapol*), „an nackten Granitfelsen am Waldsteine” *Funck* *Crr. exss. m. pin. n. III.* (*Timm. megap.*); a *Stark.* quoque accepimus, an e *Sudet.* l. *Ascib.*? Aestate. 4. (in *Lappon.* *Wahlenb.* invenit, in *Helv.* *Schleich.*

[Cent. 1. n. 28.]; vix hucusque extra *Germ. infer.*, *Lapp.* et *Helv.* lecta.)

Timmiae species jam satis bene descriptae atque dilucidatae plurimis forte videbuntur. Tamen varias de iis habemus, quas addamus, Observv. Primum igitur de charact. gen. loquamur. Vix satis sufficienter de perist. inter. suae *T. meg.* in *Stirpp.* Cel. *Hedw.* egisse nobis videtur. Membrana enim inferne in 64 (si nulla abnormitas adest, ex qua saepius $1/64$ iterum dividitur [et tum quoque, loco unius, duos processulos emittit], ut in fig. nostra ad sinistr.) partes lineolis longitud. distinguitur, quarum quaternae majorem partem efficiunt, oppositam denti singulo perist. exter. Ex unaquaque decima sexta peristomii inter. parte quatuor (nisi abnormitas jam memorata adest, ex qua plures evadunt) processus exoriuntur, quorum bini jam inferne majorem ad invicem affinitatem produnt, mox superne connectuntur. Tandem paulo altius et ipsa duo paria processuum haud raro connectuntur, saepe quoque (uti in nostra fig.) non. — Sed multo minus justam ideam de perist. int. *T. austr.* ex fig. 7. in *Hedw. Specc.* acquires. Omnimode enim eadem ratio, quam de *T. meg.* exposuimus, heic quoque locum habet. Cf. figg. nostr. Et heic quaternae partes membranae perist. inter. cum suis processibus, eodem modo apice

connexis, oppositae sunt unicuique dentium perist.
ext. Solummodo parum tenuius hocce peristo-
mium, ut nec levissima ullius momenti diversitas
observanda. Nec justiore *Sprengelii* in Anl. 3.
t. VII. f. 66. icon peristomii int. *T. austr.* ideam
suppeditat. Stirpes igitur ex nostra analysi pri-
mum caractere generico inter se *exactissime* con-
venientes demonstrantur, quae tali quali modo
conjungendae antea solummodo videbantur; et di-
cendum *peristomium interius: membranaceo-laci-
niatum, laciniis 16 aequalibus, dentib. perist. ex-
ter. oppositis, quadripartitis, cruribus apice con-
natis.* Bene, speramus, haec omnia intelligas e
figg. nostris. Quod igitur genus ex naturali me-
thodo inter ea, quibus duplex perist., distinctissi-
mum a caeteris omnibus (ex foliis, habitu *poly-
trichoides*), hoc etiam semper sancte servandum in
artificiali systemate, contra plurimorum auctt. Hed-
wigiana varie immutantium effata. Si enim pro-
cessuum perist. int. divisurarum minus haberes re-
spectum, attamen egregie a *Lesk.* genus diversum
esset ipsis illis processibus in *Timmiis* oppositis
dentibus perist. ext., in *Leskiis* cum iis alternanti-
bus; ut prius ipsi (quod sane nunquam faciemus)
cum Anglis *Leskias* et *Hypna*, quam alterutri *Tim-
mias* jungeremus. Etiam ad *Pohliam* Hedwigia-
nam ratione sexus *Timmia* sese habet, uti *Arrhe-
noptera* Hedw. ad ejus *Bryum*. *Timmia* enim et

Arrhenopterum stirpes monoicae, masc. alaribus, femineis terminall., *Pohlia* et *Bryum* stirpes dioicae, masc. femineisque terminall., illis capituliff. Hoc de genere. — Nunc de specierum iis quidem primum notis, ex quibus hucusque vix, l. ne vix quidem, differentes judicatae sunt. Ambabus stirpibus folia rigida, polytrichoidea, obtusiuscula, nervo excurrente instructa, margine serrata, et etiam carina summo apice obsoletissime subdentata; ambabus sporangium plerumque inaequale, s. subcernuum, et insimul nutans l. subnutans; ut perperam ex sporangii rationibus T. meg. ad *Orthopyxidis* *), T. austr. ad *Mnii* sua genera Cel. *Belvisius* retulerit. — Tribus vero praeprimis characteribus toto coelo distantes hucusque ambae nostrae *Timmiae* putatae sunt. Peristom. inter. enim earum diversum exhibitum, quod ipsi ad unguem correspondens declaravimus. Tum *annulum* meg.

*) *Orthopyxis* Belv. genus, quantum vera *Brya* Schreb. continet, respondet nostrae horum subdiv. „sporang. inapophys., suberecto;” ex iisdem enim duobus sporangii in his characteribus, quibus nos illam subdivisionem, Cel. *Belvisius* genus suum distinguit. Contra *Mnium* Belv. nostra *Hypna* „seta terminali” et „sporang. subnut., nutante l. pendulo, in pluribus apophysiato” (praeter alienas e perist. species), ex iisdem notis distinctivis, comprehendit.

speciei *Hedw.* denegavit, adtribuit *austr.* plantae. *Compositum* vero *annulum* non solum in *T. austr.* ipsi (cum *Hedw.*) observavimus, sed *prorsus similem* integrum quoque depromsimus de pluribus sporangiis *T. meg.* ab ipso b. Timm. collectis. Qui vero „elastice dissiliens” est, uti *Hedw.* dicit, in *T. austr.*, tardius solvitur in *T. meg.* Tertio perperam hucusque fidentes aequae *Hedwigio*, ex operc. mamillato *T. austriacam*, eodem centro contra *depresso* *T. meg.* distinxerunt. Est autem in utraque specie revera operculum in vivo statu convexo-umbonatum s. mamill., et exsiccatione tantum, etiam in *utroque*, saepe saepius umbo ille s. mamilla deprimitur. Postquam vero antecedentibus notas diagnosticas majoris momenti omnes inter utrumque muscum (bene sane excogitatas, male observatas) abolevimus, ipsi non tantum qua ratione revera sese habeant germanicae duae nostrae species, sed etiam una americana *Timmia*, dicamus. Sane non *multum* species duae nostrae differunt! Tamen foliorum forma quodammodo diversa, ut in *diagnoss.* memoravimus. Insuper tota *T. meg.* saturate viridis (etiam perist. inter. magis flavidum), tota *T. austr.* pallida (quoque perist. inter. pallidius), et *T. austr.* folia iis alterius speciei duplo minora (*Brid.* contrarium statuit). — Hoffm. in sua *Fl.* primus adnotavit se *T. meg.* quoque ex *Am. bor.* a *Muehlenb.* accepisse, nec *Hedw.* hisce

exemplis carnissee videtur, cum *Am. sept.* et ipse patriam musci agnoverit. Hancce plantam et nos a perill. *de Schreber* (qui etiam a *Muehl.* habuit) accepimus. Intermedia quasi est foliorum forma inter duas europaeas stirpes, tamen potius omnino referenda ad *T. meg.* Nullum vero nobis restat dubium, quin eadem sit *Timm. cucullata* ab interprete Michaux. descripta in *Fl. bor. - am.* Descriptio enim omnimode quadrat, et unice ex singulari statu, quo calyptram observavit Cel. vir, ipse speciem distinxisse videtur. Revera enim et in nostra americana *Timmia* calyptram reperimus superne circa setam residua, quasi ex laterali fissura sporangium emittens; de quo phaenomeno jam supra ad *Trich. sciuroid.* p. 125. in not. monuimus; et plane eundem calyptrae statum nec minus in europaeis *Timmiis* frequenter invenimus. Praeter vero hanc calyptrae rationem nil habet Michauxiana descriptio, quod sic dictam *T. cucull.* rite distinguat! Nec l. ejus operculum vidit observator. Tandem paucissima quaedam alia de nostris stirpibus adferamus. Quorsum lacinias suas peristomii int. *T. austriacae* „edecim simplices” *Brid.* desumserit, non capimus! — Perist. ext. dentes in utroque musco forma et colore sane iidem; tamen in *T. meg.* saepius varie pertusi sunt (fere ut in *Grimm. plag.* — quamquam minus —). — Demum ex summa ambarum specierum similitudine et affi-

nitate intelligendum, quomodo, inprimis si fictitium illum et in errorem inducentem ex operculo centro depresso characterem observaverint, Germaniae austral. et Helvetiae forte Botanici etiam *T. meg.* inveniisse crediderint, quod sane Flörkio et Funkio accidit. Verosimiliter *T. meg.* in Germ. unice ducatus *megap.* superbit; et omnia specialiora, quae illius laudat Bridel loca natalia referenda ad *T. austr.* — Sed miramur, ut tanta monenda habuerimus de muscis jam satis tritis notisque certe omnibus visis!

39. *Bartramia* Hedw.

(reform. a Swartz. in *Diar. bot.*
Schrad. 1800. 2. p. 180 sqq.) *).

Peristomium interius membranaceo-laciniatum,
laciniis divisis, cruribus liberis.

1. *B. pomiformis* Sw., caulibus simpliciusculis, abbreviatis; foliis ere-

*) Genus, uti a Swartzio l. c. emendatum est, admodum naturale, inprimis quatuor speciebus prioribus nostris, quibus exoticae *BB. longiseta* Mich., *patens* Brid. et *Menziesii* Turn. accedunt, ita simillimis, ut differentiae satis difficiliter inveniendae. Omnibus speciebus sporangium idem, nempe sphaericum, subcernuum,

cto — l. subpatentibus, e latiori basi anguste subulatis, serrulatis, siccitate strictis. *Brid. musc.* II. 3. t. 1. f. 6. (*B. ithyphylla.*) *Sturm.* 6. (*B. pomif.*, excl. syn. Hedw. — fol. fig. mala). *Swartz.* in *Diar. bot. Schrad.* 1800. 2. t. 3. B. f. 4. (perist. int. BB. *pomif.* et *crispa* identici pars).

Swartz. suec., *B. pomif.* Flörke in *Diar. bot. Schrad.* 1799. 2. p. 170., *Bryum pomif.* L.?

In umbrosis sylvar. in terra, in agris. Vere. 24.

Caulibus brevissimis, foliis etiam siccitate strictis, saturatius viridibus, subulata parte angustiore, serraturis multo minus conspicuis a proxima differt. — Nostrae adfinis Bartr. *longiseta* Mich. (*radicalis* Beauv.), ex specimm. a detectore Beauv. foliis exacte subulatis (inferne non dilatatis) evidentius serratis satis superque distincta, nec similis ullae aliae tam germanicarum, quam exoticarum specierum.

sulcatum; operculum idem, scil. conicum, obtusum; annulus, uti videtur, nullus; folia omnibus nervo excurrente instructa, margine plica reflexa, serrulata, in speciebus jam dictis etiam forma satis convenientia, parum dissimilia in reliquis.

2. *B. crispa* Sw., caulibus subdivisis, elongatis; foliis erecto-l. subpatentibus, e latiori basi subulatis, serratis, siccitate crispis.

Swartz. suec.

Ad rupes, in umbrosis. Vere. 24.

α. minor. Dillen. t. 44. f. 1. (ex fig. 1). *Engl. bot.* t. 993. (*B. pomif.* Smith. et Turn.)? *Brid. musc.* II. 3. t. 1. f. 3. (*B. pomif.*). Turn. in *Ann.* I. t. II. f. A. (fol. — male)? *Hedw. Samml.* I. t. 1. ff. 1-5. (part. sexus).

B. pomif. Hedw., Schleich. Cent. 2. n. 34., procul fere dubio etiam plurimor. auctt., nominatim *Smith. et Turn.* *), *vulgaris* Mich.?

Dillenii et Anglorum, uti ipsius Hedw. planta omnino huj. loci censenda; recte itaque habente *Brid.*, praeter — quod suas *BB. pomif.* et *crisp.* (*hercyn.* Flörk.) separet. Num Linnéi *Br. pomif.* ad hanc l. praeced. vere pertineat? Certe in *Ehrh. Decc.* nos unice *B. pomif.* Sw. sub *Br. pomif.* invenimus (vix ita *Smith*; cf. *Fl. brit.* p. 1341.)

*) Misit enim optimus *Turn.* post evulgationem monographiae in *Ann.* I. *B. pomif.* veram sub nom. *B. ithyph.*, et pro *B. pomif.* — *B. crispam*! — Var. *β.* nostr. *major* solummodo pro *B. crispa* Angli assumere videntur.

β. major. *Brid. musc.* II. 3. t. I. f. 4. (*B. crispa* — figg. vix bonae). *Sturm.* 6. (*B. incurva* Delav.). *Turn. in Ann.* I. t. II. f. B. (fol. — male).

B. hercynica Flörk. in *Diar. b. Schrad.* 1799. 2. p. 171., *crispa* *Turn. in Ann.*, *Schleich. Cent.* 3. n. 35.

Bartr. pomif. β. elong. *Turn. in Ann.*, de qua per litt. amiciss. vir monuit, esse *B. crispam* *Engl. Bot.*, statura quasi media inter *B. crisp. α.* et *β. nostram.*

Facile fatemur, multum convenire *BB. pomif.* et *crisp.* nostras. Tamen bonae species videntur. Sed earum et duarum insequentium diagnoses pessime traditae apud varios auctores. Inprimis Flörkeanae ap. *Schrad. l. c.* characteres sistunt parum a natura sancitos. *B. hercyn.* folia linearia tribuuntur, quae vix ullo musco usitata; nec l. „thecae erectae” (h. e. aequales ex terminologia Hedwigii) *B. pomif.*, l. „ovatae” (non sphaericae) *B. herc.* competunt; neque, quod dicitur „planum” operculum *B. pomif.* Setae quoque „caulem subaequantes” solummodo vocari queunt, si jam innovationem caulis acquisiverint. Porro male definita est *B. gracil.* „foliis erectis,” quae recurva potius primariam speciei notam diagnosticam praebent. Nec huic l. „theca

ovata" (quae in omnibus sphaerica), i. operculum differens ab eo aliarum specierum, nempe „convexum;" nec folia lineari-lanceolata dicenda. Quo- que in *B. haller.* injuste „theca ovata" dicitur. — Pessumae non minus apud *Sturm.* exstantes Hop- pianae differentiae. In his contra naturam *B. gra- tili* setae laterales (quod solummodo ex innovatio- ne caulis interdum evadunt) adscribuntur. Folia quoque *suberecta* audiunt. *B. crispae* folia inte- gerrima dicuntur, ea *B. pomif. serrata*, cum ma- gis serrata sunt in illa. Quoque sporang. *B. hal- lerianae ovatum* exhibetur. — Neque demum lau- dare possumus diagnoses Turnerianas in *Ann. of Bot.* Errores plurimos ex Flörkeanis repetiunt, immo quod apud Flörk. de vera *B. pomif.* dictum, heic translatum ad *B. pomif. falsam*, s. *crisp. α.* Meliores unicae diagnosticae notae a Swartzio exa- ratae (*musc. suec.* et in *Diar. bot. Schrad.* 1800. 2. p. 180.), licet nec ipsi folia *BB. pomif., crispae* et *oeder.* „lineari-subulata" nuncuparemus. — Exoti- carum specierum nostrae certe magis accedunt, quam ullae aliae, *BB. patens* Brid. et *Menziesii* Turn. in *Ann.* Illa est *B. gigantea* Bory de St. Vincent Voy. aux 4 princ. il. des mers d'Afrique. III. p. 96. *),

*) Ab ipso Boryo acceptam *B. volcanicam* nomi- nare voluit *Bridel*, jam immemor suae *B. pa- tentis.*

s. *B. reticulata* Beauv. (sporangio male laevi a Beauv. exhibito), s. procul fere dubio quoque *B. squarrosa* Turn. in Ann. Forte nunquam haec revera ad *fret. magell.*, sed in ins. *Borbon.* lecta a Commers., ex errore in herb. Jussiaei patria falsa nominata. Foliis longissimis, siccitate strictis (omnino quoque serratis et evidenter uninerviis — contra *Turn.*), forma caeterum ad ea *B. crispae* accedentibus, aureo-nitentibus ab hac, caule elongato, seta breviori a *B. pomif.* satis recedit, nec reliquis similis. — *B. Menziesii* Turn. est *subintegrifolia* P. B., habituque magis accedit ad *B. Haller.*, foliis vero siccitate strictis reliquaue facie satis differre videtur. Quomodo integerrima folia observare potuerit *Turn.* non capimus, cum sunt evidentissime serrulata in specim. ab ipso.

3. *B. Halleriana* Hedw., caulibus subdivisis, elongatis; foliis erecto-l. subpatentibus, e latiori basi subulatis, serratis; seta foliis brevior. *Hedw. Stirpp.* II. t. 40., *Fund.* II. t. 6. f. 30. (planta semin. c. cotyledd.) *Sturm* 6. *Engl. Bot.* t. 997. *Fl. dan.* t. 538. f. 3. — et t. 823. f. 1? (*Bryum pendulum* Brid. — procul fere dubio). *Brid. musc.* II. 3. t. 2. f. 11. *Swartz.*

in *Diar. bot. Schrad.* 1800. 2. t. 3. B. f. 6. (perist. int. pars).

Bryum laterale Huds., *recurvum* Wulf. in Jacq. Coll., *Webera clandestina* Hedw. olim.

In sylvis subalpestr. Vere. 24.

„*Dillen.*, qui muscum nostrum ab Hallero acceperat, eum pro *Sphagni sui alpini* var. habebat.” *Brid.*

4. *B. Oederiana* Sw., caulibus subdivisis, elongatis; foliis recurvopatientibus, lanceolatis, serratis. *Fl. dan.* t. 478. *Sturm.* 6: (*B. gracilis* Floerk. ap. Schrad. l. c. — mala). *Brid. musc.* II. 3. t. 2. f. 9. (*B. Oederi*) et 10. (*B. longiseta*). *Swartz. ap. Schrad.* l. c. f. 5. (perist. int. pars). (in Tab. nostra IX. f. 9. quoque perist. pars).

Swartz. in *Act. Holm.* c. ic., *latifolia* quorund., *Oederi* Schleich. Cent. 2. n. 35., *longiseta* Ej. Cent. 3. n. 36., *alpina* Ej. Cent. 4. n. 17., *Bryum Oederi* Retz. scand., *Mnii pomif.* var. Hoffm. Fl. p. 55.

In subalpin. Vere. 24.

Nec *B. longis.* *Brid.* et Schleich. (quam ne confundas cave cum *B. longis.* Mich.), nec *B. alp.*

Schleich., consentiente Swartz., ullo modo essentialiter a nostra differunt.

5. *B. marchica* Sw., caulibus subdivisis, elongatis; foliis lanceolatis, serratis, subhomomallis. *Willd. ber.* t. 6. f. 12. (*Leskia*). *Hedw. Stirpp.* II. t. 39. (*Mnium*). *Swartz. ap. Schrad.* 1. c. f. 2. (perist. int. pars).

Bryum Roth. Fl.

„Pr. *Spandau* ubi bina flumina *Spree* et *Havela* junguntur — in ligno putrido natante. Majo. Junio.” *Willd.*; nuperius „in uliginos. pr. *Woldegk megap. starg.* auf der *Todtensee-Wiese* infrequens.” *Blandow.* 2.

Rarissimae hucdum stirpi, vix extra *German.* super. unquam lectae, male plurimi folia integerrima adtribuunt, hisque partim a sequente specie distinguunt. Revera folia evidenter serrata. Cur autem *Willd.* aequae ac *Hedw.* vix nisi florr. masc. magis clausis peristomioque int. a *B. font.* distinctam pronuntiaverint, non vidimus. Foliorum basi duplo angustiorum forma satis nobis differre videtur. Caeterum sane illi similis. Sed multo magis congruit cum *B. sphaeroc.* Sw. Fl. Ind. occ. (*Mnio* *Hedw. Stirpp.* 3. t. 38. A.), ut recte habeat *Hedw.*, posteriorem speciem fere unice „foliis supina facie

lispidulis” distinguendam esse. Forma foliorum in utraque prorsus eadem.

6. *B. fontana* Sw., caulibus subdivisis, elongatis; foliis ovato-longius acuminatis, serratis, subhomomallis. *Dillen.* t. 44. f. 2. *Fl. dan.* t. 298. *Engl. Bot.* t. 390. *Swartz. ap. Schrad.* l. c. f. 1. (perist. int. pars). *Hedw. Samml.* I. t. 1. f. 6. (spermatocyst. et paraph.).

Mnium L. et Hedw., *Bryum* alior.

In pratis paludosis, uliginosis. Vere. 2.

Var. β . *pumila*. Turn. hib. t. 10. f. 1., quam non vidimus, inter nostram et *B. march.* fere media videtur. — Habitu multum ludit species; et „*Mnium heteromallum*, in paludib. alpinis in *Algaeu* a *Frölich.* lect.” accepimus a perill. *de Schreber*, quod foliis insigniter homomallis primo visu alienam faciem prae se fert. Est haecce var., uti a Swartz. comperimus: Hall. St. helv. n. 1851. fide herb. Davall., ex quo specimen Smith cum Swartz communicavit. Davall. distinctam putavit speciem, non ipse Haller, nec sanè nisi var. est, consent. quoque Swartz. — Ne tenuiora quoque nostrae exempla cum antecedente specie confundas cave. Accidit hoc amiciss. Flörkio, qui specimina talia,

ad Rathhausberg Salisb. lecta, pro *B. march.* olim dedit.

40. *Hypnum Willden.* in Diar. bot.
Schrader. 1799. 2. p. 17.

Peristomium interius membranaceo-laciniatum,
laciniis inaequalibus.

* seta terminali (*Bryum* Schreb. *).

*) a. florr. hermaphrodd. terminall.: *Webera*
Hedw.;

b. florr. monoicis, femm. terminall., masc.
alaribus: *Arrhenopterum* Hedw. (exoti-
cum genus);

c. florr. dioicis terminall., masculis
α. capituliformibus: *Bryum* Hedw.;
β. discoideis: *Mnium* Hedw.

Hypn. crudum et *H. pseudotriqu.* ex ipso
Hedw. quoque florr. hermaphrodd. inveniun-
tur, et cum pluribus aliis speciebus conjun-
genda suadent ab Hedwigio sejuncta quatuor
ex *Bryo* Schreb. genera, cui quidem conjun-
ctioni ut ipse summ. vir, dum viveret, non
prorsus contrarius fuisset, jamjam notum est.
— Fucum et in hoc muscologis Cel. Sprenge-
lius fecit, ut *Bryi Mnique* genera denuo se-
paranda juberet, ex majoribus peristomii inter-
processibus l. perforatis, l. imperforatis. *Bryi*
generi has adscribit, et tum ex hoc sensu *Brya*
nuncupat Webb. *pyrif.* et *longic. H.*, *Arrhe-*

† sporangio inapophysiato, suberecto *).

1. *H. androgynum* Schrank., caule simpliciusculo; foliis lanceolatis, serrulatis; florr. masculis capituliformibus, demum in pedunculo elevatis. *Dillen.* t. 31. f. 1. *Schmid. Icc.* t. 56. f. 1. *Sturm.* 2. *Engl. Bot.* t. 1233. *Hedw. Fund. I.* t. VI. ff. 33–36. (planta monoica utriusque sexus florr., fol. et marium anal.) — *Theor.* ed. 2. t. 14. ff. 5–7. (fl. masc.).

nopt. heter., *Brya delicat.*, *argent.*, *julac.*, *Zier.*, *alpin.*, *capill.*, *caespit.*, *annot.* et *squarros.* Web. vero *pyriformi* et *Br. delicatulo* jam ipse summ. *Hedw.* verbis ac figg. perist. inter, processus majores perforatos adtribuit, et sane tales quoque existunt in *Brr. arg.*, *jul.*, *Zier.*, *alp.*, *cap.*, *caesp.*, *annot.* et *squarr.*, nobis sedulo horum muscorum dissecantibus peristomia testibus. Caeterum vero quis est, quem fugiat, ut *Hypna* quoque *Hedw.* et *Leskiae* Ej. saepe in uno eodemque individuo dictis processibus perforatis et imperforatis ludant, nilque itaque hanc rem fecisse natura videatur.

*) Hujus nostrae subdivisionis plurimas species (excepto *H. Palud.*) nuperius Cel. *Smith* (*A. S. L.* VII. p. 254 sqq.) sub *Mnii* genere, *sporangio sulcato* ei insigne, complexus est. Nobis vero talis character pro genere servando vix aptus sufficiensque videtur.

Schrank Baier. Fl. Mnium L., Bryum Hedw.
Ad arbor., Corylor. radd. et in aliis locis um-
brosis (ex Schmid.). Vere. 24. (rarius fructi-
ferum.)

Folia bene *Hedw.* acuta dicit, quae perperam
Rothio „obtusiuscula.” Sed nec integerrima sunt,
qualia verbis et figg. (*Fund. l. c. fig. 35.*) Hedw.
et, quod scimus, ante Smith omnes exhibuerunt,
sed revera apice serrulata (ut praeprimis ex foliis
reapse integerrimis affinem speciem, *Br. conoid.*
Dicks. t. 11. f. 2. [Engl. Bot. t. 1239.], Angli a no-
stro distinguant), nec nervo „ad apicem pertin-
gente” ex Hedw., sed sub apice evanescente, do-
nata. Annulus, ni valde fallimur, adest. Perist.
inter. processus majores cum dentt. perist. exter.
alternantes carinati, perforati; interjecti minores
bini ternive, prorsus ut in sequente specie! Floris
masculi folia perigonialia primum supra florem con-
nivent; demum hic in pedunculo nudus elevatur.
Ex *Schmid.* (cujus icon, praeter perist., optima,
pro more) contra *Hedw.* planta saepius dioica, quam
monoica. Florum vero masce. in hoc et sequente
musco, quam maxime affinibus speciebus, ab Hedw.
ad diversa genera relatis, dissimillima ratio denuo
satis demonstrat, quam flocci habeat natura harum
partium in hisce fig. atque distributionem. Demum
ne cyathiferos surculos *Tetraph. pelluc.* cum nostri
maribus pedunculatis confundas cave; cf. quae su-

pra p. 95. admonuimus. Etiam ap. *Sturm* errores omnes de hujus musci maribus collatis cum dictis cyathiferis *Tetrapl.* surculis, et de foliis nostri integerrimis repetiuntur.

2. *H. elodes* Web. et Mohr., caule ramoso; foliis subulatis; florr. masculis discoideis. *Dillen.* t. 31. f. 3 et 4. *Schmid. Icc.* t. 56. f. 2. *Engl. Bot.* t. 39 L. (*Bryum palustre*).

Mnium palustre L. et Hedw., *Bryum* Schreberianum.

In paludos., pratis humid., turfis. Vere. 24.

Vulgaris sed memorabilis stirpis bona adumbratio ab Hedwigianorum uno adhuc desideratur. Caulis ramosus, erectiusculus. Folia sparsa, inferiora patentia, suprema erecto-patentia, subhomomalla, lutescentia, omnia subulata, canaliculata, inferiora obtusiuscula, superiora acuta, omnia uninervia, nervo in inferioribus versus apicem evanescente, subundulata, margine reflexa, denticulata, utraque superficie hispidula, siccitate crispabilia. Seta interdum flexuosa. Sporangium oblongum, subcervinum, suberectum, sulcatum. Operculum conicum, obtusum. Annulus adest. Perist. inter. processus majores cum dentt. perist. exter. alternantes carinati, perforati; interjecti minores bini ternive. Flores masculi dioici terminales discoidei.

Quorum in ambitu flagella exoriuntur (rarius, tamen satis frequenter certe in Germ. septentr. paludosis turfosis) setas aemulantia, inferne foliis minutis, remotis, cordatis, acutis, nervo sub apicem evanescente instructis, vestita, superne efflorescentia in glomerulum minutissimorum foliorum squamaeformium, crassorum, enerviorum, fuscescentium. Hasce partes recentiorum plurimi, *Brid.*, *Turn.*, *Smith*, alii male pro maribus alterius formae sumserunt, quamquam jam *Vaill.* et *Haller* pro eo, quod sunt, agnoverant. Talibus flagellis autem instructae plantae masculae abeunt tandem in *Mn. polycephalum* Schultz. starg. (ab ipso miss. — alia quoque exempla habemus *Erlangae* collecta e perill. *de Schreb.*), quod, affirmantibus Anglicis, *Mnium* Dillen. t. 3r. f. 4., s. *Mn. ramos.* Huds. et L., s. *Mn. prolixum* Neck., s. *Br. palustre* β . *ramos.* *Turn.*, male junctum a Rothio *H. androgyno.* — Perperam folia hujus stirpis *Rothio*, *Schwaegrichenio* in *Hedw. Specc.* et *Smithio* integerrima, ultimo in genere acuta, immo *Turnero* acuminata audiunt. Jam bene in *carolinensi* var. *Michaux* l. ejus interpres „pariter ac in Europ.” planta „folia interdum versus summitatem minutissime denticulata” exhibet. — Habitus musci quaedam cum *Dicranis* quibusdam, uti *spurio* etc. Demum certe nostro summopere affine *Mnium inor-*

clinatum Brid. (*reclinatum* Smith in A. S. L. VII.
— *Dillen.* t. 31. f. 8.) ex *Virgin.* allatum.

3. *H. Paludella* Web. et Mohr.,
foliis obovato-acuminatis, recurvis.
Hedw. Specc. t. 44. ff. 6-11.

Paludella Ehrh. *Phytophyt.* n. 69., *Bryum*
squarrosum L., Hedw.

In paludibus Germ. septentr., etiam *Siles.* Aesta-
te. 24.

Sui habitus species. Folia apice serrulata, ner-
vo sub ipso apice evanescente, quod utrumque
Hedw. fugit. Perist. inter. processus majores cum
dentt. per. exter. alternantes carinati perforati; in-
terjecti minores fugacissimi.

†† sporangio subnutante, nutante l. pendulo,
in pluribus apophysiato.

4. *H. pyriforme* Web. et Mohr.,
foliis subulato-setaceis, superioribus
longissimis, flexuosis; sporangio pyri-
formi, pendulo. *Dillen.* t. 50. f. 60.
Hedw. Stirpp. I. t. 3. (*Web.*).

Mnium L., *Bryum* Schreberianor., *aureum*
Schreb., *pendulum* Ehrh. Decc.

„In rupib. calcar. umbros., et speluncis siccis”
(Smith.), „interstitiis muror.” (Hoffm.) Aestate. ☉.

Proprii habitus species, foliis nudo oculo capillaribus. Caeterum folia apice summis lentibus serrulata, quod vix auctores, nec Hedw., adnotarunt. Perist. inter. non omnibus numeris bene Hedw. delineavit. Processus enim majores iis plurimor. Bryor. Schreb. prorsus similes, scil. carinati, perforati, quod vix fig. Hedw. exprimit. — In Am. bor. stirps quoque provenit ex Michaux.

5. *H. Zierii* Web. et Mohr., foliis arcte imbricatis, late ovato-acuminatis, concavis, integerrimis, nervo excurrente; sporangio nultante, longicollo. *Dicks.* t. 4. f. 10. (*Bryum*). *Hedw. Specc.* t. 44. ff. 1-4. (*Bryum*). *Engl. Bot.* t. 1021.

In *Sudet.* Ludw. Autumno. 24. (in *Norvag.* alpp. ante 30 abhinc annos primus omnium legit *Web. pat.*; in *Helv.* invenit *Schleich.* (Cent. 2. n. 38.)

Cum sequente sui habitus, surculis teretibus, amentaceis, foliis exaridis, albicantibus, sericeum l. argenteum plantae colorem praebentibus. Sporangium ex apophysi longissima attenuata clavatum. Operculum conicum. Annulus compositus ab auctt. praetervisus. Perist. inter. processus cum dente. perist. ext. alternantes carinati, perforati; interjecti minores bini filiformes.

6. *H. argenteum* Schrank., foliis arcte imbricatis, ovato-acuminatis, concavis, integerrimis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanescente; sporangio pyriformi, pendulo. *Dillen.* t. 50. f. 62. *Fl. dan.* t. 880. f. 2.

Schrank. Baier. Fl., Bryum L., Hedw., Br. julac. Crom. deutsche Laubmm. n. 71.!

In terra sabul., muris, tectis, rupib.; vulg. Autumno, hieme. 2.

Operculum convexo-mamillatum. Annulus adest. Perist. inter. processus majores cum dentt. perist. ext. alternantes carinati, perforati; interjecti minores bini, filiformes.

β. julaceum, foliis acumine breviorē. *Dillen.* t. 50. f. 63.

Br. Schrad. Spic., filiforme Dicks., argent. β. L., arg. β. viride Leers. Herborn., Mnium holosericeum Hoffm. Fl. sub Mn. arg.

In iisdem cum var. α . locis, eod. temp.; rarius.

Vulgatissimorum Bryorum plurima, cum parce genus pertractavit Hedw., in hunc usque diem, admodum insufficienter ab auctoribus descripta exstant. *Br. argenteo L.* non tantum *Roth* et vetu-

stiores pilifera folia adtribunt, et *Brid.* ductulorum fasciculum in apiculum abeuntem exhibet, sed et (quod miremur) *Schwaegrich.* in Hedw. Specc. „folia ductulorum fasciculo in brevem pilum exeunte” gaudentia nuncupat, et idem fere *Turn.* et *Smith* in suis Operr. habent. Tum *Br. julac.* Schrad. dicti auctt., *Roth.*, *Turn.*, *Smith*, ex foliis, quod dicunt, muticis, s. pilo carentibus, obtusis distinguunt, l. ejus folia dicit *Brid.* „fasciculo donata sed in apiculum minime exeunte.” Veram folii et inprimis nervi rationem itaque nemo in ambabus nostris varr. consecutus est. Sunt enim in utraque stirpe folia iis *H. Zier.* satis similia, scil. late ovato-acuminata, sed nervo praedita ad $\frac{2}{3}$ altitudinis evidenter evanescente, acumine solummodo e pagina folii absque nervo formato. In var. α . acumen hoc longius, praeprimis in summis conniventibus surculorum non fructiferorum foliis, in quibus etiam sub summis lentibus lenissime serrulatum invenitur. In var. β . brevius omnino acumen, ut non, uti in α . a surculo recurvatum exstet, et itaque minus observetur, praeprimis quoque brevius in summis foliis. Tota quanta folia in hac specie inferiore sua parte (in α . ad dimid. fere usque) viridia sunt, superne exsucca et albida. Cum autem in var. α . superior folii pars ex minore acumine minor quoque, exsucca portio ita exigua evadit, ut multo magis viridia folia appa-

reant, quam in vulg. stirpe (ex quo *Leers.* var. β . *virid.* nuncupavit). Caeterum revera nullo modo essentialiter et ita, ut firmis characteribus circumscribantur. utriusque musci partes, in specie folia, discrepant; nam si et operculum quidam (v. gr. *Crom.* in Hopp. Tasch. 1805.) diversum, conicum scil. in var. α ., convexo-mamill. in var. β . dicant, hocce sane ex errore factum est. Minime igitur uti species, tamen uti memorabiles varr., ambos muscos ipsi distinguimus. Quo factum sit, ut „staturam triplo minor.” *Br. julaceo* Schrad. *Turnerus* adscribat non capimus, cum contrarium potius, recte omnibus, etiam *Smith.*, adnotantibus, locum habeat. Egregie autem deceptus est denique *Crom.* ille, in collect. exs. cit. (postquam jam in Hopp. Tasch. l. c. de differentia utriusque stirpis verba fecerat) non tantum vulgarem muscum pro *Br. julac.* divulgans, sed et in descript. folia ei „*enervia*” tribuens. Ita nostrates de superficie hauriunt suas observationes, mox eas proclamantes.

7. *H. carneum* Web. et Mohr., foliis lanceolatis, acutis, apice serratis, nervo subevanescente; sporangio brevi-pyriformi s. turbinato, pendulo; operculo hemisphaerico-acuminulato. *Dillen.* t. 50. f. 69. *Hedw. Stirpp.* I.

t. 20. (*Bryum delicatulum*; in Ind. Op. Br. *tenellum*). *Engl. bot.* t. 360.

Bryum L. *).

In sabulosis, argillos., pasc. humid. Vere. 24.

Tota stirps glaucescens, lurida, statura et in siccis etiam fere sporang. et operculo similis *H. argent.*, quod inter et sequentes species affatim transitum facit. Bene Hedw. adnotavit, ut saepius nervus subevanesceret, sed serraturas folii praetervidit, quas quidem nec Smith, tamen noster Turn. attigit. — *Bryum pulchell.* Hedw. ab hoc differre videtur (certe uti distincta var.): 1) caulib. breviorr.; 2) foliis supremis magis elongatis et appressis; 3) seta longiore; 4) sporang. breviori, subhemisphaer.; 5) forte et operc. non hemisphaer.-acuminulato, sed magis conico. Ita enim haecce pars in lapponicis nobis visa est exemplis, tamen non satis maturis. In adultioribus salisbb. specimm., quae ex reliquis potius *Br. pulch.* quam *carn.* putanda, attamen operc. exacte tale invenimus, quale in vulg. *carn.* est. Quibus ita se habentibus non multum a Turn. dissentimus, quod *Br. pulchr.* H.

*) Sub nom. *Br. erythrocarpi* Brid. Suppl. mst. etiam plantulam accepimus in m. *Hube* pr. *Einbeck* a Bridelio lectam, quam a nostro discernere nequimus.

sit — *carn. B. pulch.* Tamen rem dijudicet noster Swartz. — Br. vero *pulch.* Schultz. starg. minime verum. Folia enim inferne multum latiora, multum breviora, nec inprimis summa elongata, subulata et appressa. Etiam sporang. et operc. differre videntur; quantum ex paucis nec ita bonis ab auct. miss. exemplis videre nobis contigit.

† 8. *H. Wahlenbergii* Web. et Mohr., foliis erecto-patentibus, cordato-triangularibus, acutiusculis, serrulatis, nervo subevanescente, sporangio brevi, turbinato, pendulo; operculo convexo-acuminulato.

Bryum albicans Wahlenb. Fl. lappon. mst.

In arena insull. *Danubii* pr. *Ratisb.* Funck. (ante 12 annos). 24.

Exemplaria Funckiana cum Wahlenbergianis optime conveniunt; nec nisi innovationibus longioribus, ut tota stirps saepe triuncialis evadat, nobis differre omnino videtur *Mnium glaciale* Schleich Cent. 3. n. 41. „in rivulo glaciali juxta glaciem *Fern*” lect. Tamen hujus (ut et germanici musci) operculum nondum vidimus.

9. *H. annotinum* Schrank., dioicum, foliis subpatentibus, lanceolatis,

acutiusculis, subintegerrimis, nervo subevanescente; sporangio subpyriformi-oblongo, pendulo; operculo convexo-acuminulato. *Dillen.* t. 50. f. 68. *Hedw. Specc.* t. 43. (*Bryum*). *Swartz.* in *Diar. bot. Schrad.* 1800. II. t. 3. C.

Schrank. Baier. Fl., Mnium L.

„In arenos., argillos. humid., ad agger., foss. Aestate. 24.” *Hedw.* (rarius fructif.)

Antecedente duplo majus, colore laete viridi, habitu omnino propius accedens ad insequentes species, quam ad antecedentem. Folia serrulata quidem et *Hedw.* dixit, sed talia non delineavit. In icone *Swartz.* (fig. d.) ex errore forte enervia; quod vero sub apice nervus interdum subevanesceret, vix ullus hucusque observavit. Annulus, de quo auctores silent, adest compositus. Etiam perist. int. non ita bene *Hedw.* delineavit; sunt enim processus majores, cum dentt. perist. ext. alternantes, carinati, perforati (nec imperforati), interjectis minorr. 2-3. Melius itaque haecce in fig. *Swartz.* — Masculi hujus speciei surculi bulbos foliolosos in axillis foliorum gerentes absque fructiferis femineis (rarioribus) olim observati, novi generis suspicionem dederunt (*Fl. dan.* t. 215., *Ehrh. Beitr.* 3. p. 73. n. 39., *Trentepohlia erecta* Roth. in

Ust. Ann. St. 10. p. 52., Hoffm. Fl. t. 14., Roth. Cat. I. p. 139. [miro modo Hoffmanniana repetita]). Sed jam bene *Leers* in Fl. herborm. hosce surculos adumbravit, et *H. androg.* adscripsit; nec, postquam recentiori tempore primus *Schrad.* (in Praef. ad Samml. I.), quid sit illa stirps, patefecerat, dubia diu res botanicis remansit. Cf. *Schrad. Journ.* 1799. I. p. 244, 245. II. p. 462. Sed prorsus nebulam removit *Swartz.* ap. *Schrad.* l. c. de masculis aequae ac femineis fructiferis ab ipso inventis bulbiferis surculis Obs. faciens. Alia vero corpora in axillis foliorum surculorum sterilium obvia jam pridem *Hedw.* observavit. Adeas eum in *Spec. musc.* p. 185.

10. *H. turbinatum* Web. et Mohr., foliis ovatis, acutis, integerrimis, nervo excurrente; sporangio aequali, subpyriformi, pendulo; operc. conico-acuminato. *Hedw. Stirpp.* III. t. 8. (Mnium)?

In arenos. humid. *Sax. sup.* Majo. *Hedw.* 24.

Diffidentissime muscum pro *Mn. turb.* *Hedw.* inter nostros recipimus. Minime quadrat cum ic. *Hedw.* (multo minus cum *Dill.* t. 51. f. 74., quod igitur heic omisimus), nec est *Mn. turb.* a plurimis et optimis muscologis nobis datum; sed spe-

cimen hocce ab ipso Hedw. fil. accepimus; et itaque, cum vera stirps prorsus dubia nobis sit, quomodo aliter faceremus vix vidimus. Cf. ad *H. bor.* mox Adnn.

11. *H. intermedium* Web. et Mohr., foliis oblongo-acuminatis, subintegerrimis, nervo excurrente; sporangio inaequali, subpyrif., nutante subpendulove; operc. conico, acuto. *Brid. musc.* II. 3. t. 2. f. 12. (mala praepri-
mis quoad fol. et perist. — *Pohlia*).
(in Tab. nostr. X. f. 6. perist. inter.
pars).

Mnium Ludw. Mooscent. I. n. 81. — certe Pohl.
elong. plurr. auctt.

„In *Lusat.* ad mur. vetust. septentr. respicient.
Ludw. Vere. 24.” *Brid.*

Egregie et de hujus musci charact. generico Cel.
Brid. deceptus est; cf. fig. nostr. Caeterum saepius stirpem, quam etiam in Suec. ipsi collegimus, pro Pohl. *elong.* *H.* (*Lesh.* nob.) accepimus, nec forte ab insequente specie separata esset, si rite perist. esset investigatum.

12. *H. caespiticium* Weiss., foliis ovato-lanceolato-acuminatis, api-

culatis, subintegerrimis; sporangio aequali, pyriformi, pendulo; operc. convexo-mamillato. *Dillen.* t. 50. f. 66. *Hedw. Fund.* II. t. 3. f. 12. (operc.) et t. 10. f. 66. 67. (sporang.).

Weiss. goett., Bryum L. et *Hedw., Mnium* Brid.

Ad aggeres, in loc. arenos., palud. etc.; ubique. Vere. 24.

Annulus compositus. Perist. int. processus majores cum dentt. per. ext. alternantes, carinati, perforati; interjecti minores subterni filiformes. — Admodum polymorpha species pro solo natali. Vingt ad minimum habitu summo opere diversas formas, a variis pro novis speciebus transmissas, habemus, quae in genere foliis magis minusve erectis, latioribus, angustioribus, ut mox ovatae, mox lanceolatae formae magis accedant, acumine et apiculo diversissimae longitud., seta longiore breviorve, etiam sporangio et operculo parum ab invicem recedunt; sed firmos limites nullos hasce discernendi invenimus; nec dubiis speciebus perplexissimum genus augere cupivimus. Non diversa quoque itaque censem *Br. bicolor* Dicks. (*Dillen.* fig. cit. F. G. — *Turn. hib.* t. 11. f. 2.), ab ipso Turn. benevole communicatum (quippe quod

sporang. parumper brevior solummodo differt), nec *Mnium nigricans* Crom. Samml. n. 74. (quod num *Br. nigric.* Dicks. t. II. f. 10. sit, quis nostratum, qui anglicam stirpem non viderit, dicat?), nec *Br. Varneum* Brid. mst., e duc. megap. ab amiciss. Bland. miss. Etiam *Mn. turbin.* Schleich. Cat. (non Cent.) et forte *Br. capillare* Ej. Cent. I. n. 29. huj. loci. Nec antecedentem et duas insequentes species ipsi multum diversas censuissemus, si indescriptas eas accepissemus. Sed fecimus, quod potuimus, ut jam receptas species retinere-mus, non novas ipsi iis adderemus. Bene sane monet *Turn.*: „folia” (in vulgatissimis formis) „circa caules breves dense imbricata, connivent, ut surculi juniores steriles bulbillos referant, et ne pro *Phasco* quodam immaturo legantur est cavendum.” Demum ex *Am. bor.* nostrum, communiori accedens, accepimus.

13. *H. lacustre* Web. et Mohr., foliis subpatentibus, ovato-brevi acuminatis, apiculatis, subintegerrimis; sporangio aequali, subpyrif., pendulo.

Mnium Bland. muscc. exsicc. n. 132.

In palud. duc. *megap.* Bland. 24.

Propria species, ni fallimur, et nostro Swartz. videtur; et sic retinui-mus, licet summopere affinis quibusdam antecedentis varr.

14. *H. pallens* Web. et Mohr., foliis erectis, ovato-brevi acuminatis, integerrimis, nervo excurrente; sporang. inaequali, pendulo; operc. convexo-acuminato. *Swartz. suec. t. 4. f. 12. (Bryum).*

Pohlia Brid., *Cynontod. cernuum* Schleich. Cent. 3. n. 9. et *Mnium gracile* Ej. Cent. 2. n. 40., surculis alienis sterill. elongatis immixtis, ob quos verosimiliter nomen triv. auct. dedit.

In m. *Buchberg* Bohem. *Ludw.* (Mooscent. I. n. 77.) 24.

Swartz. perist. inter. non vidit; ex mera vero conjectura *Pohliam* Brid. nominavit muscum. Jam ipsi in Arch. f. d. syst. Naturg. I. 1. p. 147. monuimus, processus majores cum binis ternisve minorr. in perist. int. alternantes reperiri. Annulum *Swartz.* observavit, nos attingere eum non potuimus. Caeterum silesiaca exempla cum *Swartzianis* omnibus congruunt, nec ullis differunt laudati duo *Schleicheri* musci. En, quot somnia auctt. levium de singula specie!

15. *H. capillare* Weiss., foliis obovatis, longius apiculatis, integerrimis; sporangio oblongo-subcylindraceo, nutante. *Dillen. t. 50. f. 67.*

Weiss. goett., Bryum L. et Hedw., Mnium
Brid.

In loc. humid. sylvy. etc. Vere. 24.

Perist. inter. processus majores cum dentt. perist. ext. alternantes carinati, perforati; interjecti minores bini ternive. Vix ita simillimum *H. caespit.*, ut cum eo confundi queat, contra auctt. Foliis et sporang. summiopere diversum.

16. *H. boreale* Web. et Mohr., foliis erecto-l. subpatentibus, lanceolato-acuminatis, apiculatis, subintegerrimis; sporang. aequali, elongate pyriformi, pendulo; operc. convexo-acuminulato. *Dillen. t. 51. f. 74?*

Bryum turbinatum Swartz. suec., *Br. Ludwigi* Spreng.

In locis udis, depressis; hinc inde, v. gr. in *Siles.* (Ludw.), ad Rathhausberg *Salisb.* (Flörke). 24. (etiam e *Norv.* habemus).

Perist. inter. process. majores cum dentt. per. ext. alternantes carinati, perforati; interjecti minores bini ternive filiformes. Annulus hucusque non nobis observatus. Flores masculi in distincto individuo capitaliformes. — *Bryum* s. *Mnium turbinatum* plurimum. auctt. (non tamen Schleich, Cent. 2. n. 39.) esse videtur; an itaque Dillenii stirps?

Hedwigii vix putanda; nec enim congruit icon (fol. fig. diversissima), nec specimen ab Hedw. fil.; v. supra *H. turb.* *H. caespit.* quibusdam varr. quoque proxime accedit, tamen habitu valde diverso gaudet, statura multo elatiori, ramosiore. — Huic affine *Bryum alpin.* Schleich. Cent. 4. n. 20., quod nunquam verum a Swartz. datum et ex Pyren. relatum. Differt autem a nostro *foliis brevi-ovato-acuminatis* etc.

17. *H. pseudotriquetrum* Web. et Mohr., foliis patentibus, oblongis, apiculatis, superne serratis; sporang. aequali, pendulo; operc. convexo-mamillato. *Dillen.* t. 51. f. 72. (*Bryum ventricosum* Dicks.) et 73. (*Br. himum* Schreb.). *Hedw. Stirpp.* III. t. 7. (*Mnium*).

Meesia nutans Willd. berol., ipso monente et specim. comprobante, ut male igitur hancce *Brid.* retulerit ad *Mn. turbin.*

In paludosis. Vere, aestate. 24.

Br. bim. Schreb. a *Mn. pseudotriqu.* Hedw. nunquam sejungendum censemus, convenientt. Hedw. et Schrad. Nervus folii in apiculum excedit, marginesque ad huncce apiculum satis evidenter serrati, quod utrumque fig. Hedw. l. c. 6. non exhibet.

18. *H. nutans* Web. et Mohr., hermaphrod., foliis suberectis, lanceolatis, acutis, apice serratis, nervo excurrente; sporang. subpyrif., subpendulo; operc. convexo-mamillato. *Dillen.* t. 50. f. 61. *Hedw. Stirpp.* I. t. 4. (*Webera*), *Fund.* I. t. 4. (flos — *Bryum trichodes*), II. t. 6. f. 18. (plant. seminalis — *Web. mutabilis*). *Engl. Bot.* t. 1240.

Bryum Schreb., *sericeum* Huds., ex Turn., contradic. Smith., qui ad insequens refert.

In sylvat. montos. arenos., inque turfosis et ericetis. Aestate. 24.

Perist. inter. processus majores cum dentt. perist. ext. alternantes; interjecti minores bini filiformes. Carinationes majorum processuum vix bene Hedw. delineavit. — Innovantes surculi, quorum *Dill.* mentionem fecit, ex suppositione Turn. a Dicr. *frag.* immixtis sterilibus plantis originem duxere. — Huj. l. esse videtur ex malo specim. Pohl. *elongata* Schleich. Cent. 2. n. 36., quae genuinum *Bryum* Schreb., nec unquam Hedwigii stirps.

19. *H. erudum* Web. et Mohr., foliis remotis, patentibus, planiusculis, lanceolatis, acutis, apice serratis, nervo evanescente; sporang. oblongo, nutante; operc. convexo-mamillato. *Dillen.* t. 51. f. 70. *Hedw. Stirpp.* I. t. 37. (*Mnium*).

Mnium L., *Bryum* Huds., Schreb.

In udis montosis. Aestate. 4.

Foliis pallidis, laxe dispositis, patentibus, planiusculis, nec laete-viridibus, satis insigne. Dentes perist. ext. minime ita breves et obtusi, ut Hedw. depinxit, sed acuti et omnino perist. int. longitudine. — An satis ab hoc distincta *Webera intermedia* Schleich. Cent. 4. n. 18. („ad rupes umbros. subalpin.“ lecta)? Sporangii et operculi forma illiusque directio eadem. Foliorum figura quasi media inter hoc et insequens. Folia enim parum angustiora ac in *H. crudo*, ut fere subulata dicenda (caeterum etiam apice serrulata et nervo evanescente), colore convenientia cum iis *H. longicoll.* Praeter multo adhuc angustiora folia autem *H. longic.* multum iterum differt sporangii directione et ejus et operculi forma. Perist. Web. *intermed.* inter. processus majores quoque carinati, perforati, cum dentt. per. ext. alternantes; inter-

jecti minores plures. Ab *H. nutante* multum haec Schleicheri species differt caule longiore, foliorum nervo evanido, rel.)

20. *H. longicollum* Web. et Mohr., foliis remotiusculis, patentibus, subulatis, acutis, apice serratis, nervo evanescente; sporangio longicollo, erecto; opere. conico-acuminato. *Swartz. suec.* t. 6. f. 13. (*Bryum*). *Hedw. Specc.* t. 41. ff. 1-5. (*Webera*). *Dicks.* t. 11. f. 4. (*Br. cylindricum*)?

In fiss. rup. 2?

Foliis laete viridibus, nec pallidis, statim ab *H. crudo* distinguendum. Caeterum marginata folia Hedw. exhibuit in fig. 4., qualia certissime non sunt. Annulum speciei denegant *Swartz.* et *Hedw.*; tamen in suecicis specimin. eum observavimus, et quidem exacte talem, qualem in *H. crudo* Hedw. delineavit. Perist. int. process. e membrana haud ita alta, majores cum dentt. per. ext. alternantes carinati, vix perforati; interjecti minores bini filiformes, ut sane perist. nil commune habeat cum eo *Timmiae*, contra *Swartz.* et repetentem *Brid.* Ex Hedw. „florescentia simillima” ei „*Web. nutant.*” ex *Swartz.* *Mnium* Hedw. esset. Synony-

num Dickson. ex auctoritate Turn. (Ann. of Bot. Vol. II. p. 335. — Botan. Guide p. 731.), dubii tamen (cum nec ipse Turn. specimen Dickson. inquisivisse videtur) apposuimus. Attamen contradicit (quantum ex ejus verbis apparet) criticus (Musc. Bridel.) in N. Leipz. Lit. Ztg. 1805. St. 154. p. 2459. Sec. hunc ipsum criticum, qui optima fidei dignus videtur, (Hedw. fil.? Schrad.?) muscum, cujus germanica nulla quidem adhuc vidimus exempla, inter nostros recepimus. Addit enim Ille l. c.: „ist jetzt im Riesengebirge, Süddeutschland und der Schweiz häufig gefunden worden;“ cui assertioni, cum et ipsi helveticum specimen (Schleich. Cent. 3. n. 38. — „in umbros. vall. Saas.“ — *) genuinum agnoverimus, eo minus dubium habere potuimus. Tamen, si nimis timere egerimus, lectorum veniam ut impetremus speramus.

21. *H. marginatum* Web. et Mohr., foliis saturate viridibus, oblongis, apiculatis, marginatis, serratis; sporangio pendulo; operculo rostrato.

*) Duos surculos Schleich. misit, quorum unus toto coelo alienissimus, alter foliis, sporang., operc., annulo, perist. cum suecico musco exactissime convenit, licet caulis ei multo brevior.

Dicks. t. 5. f. 1. (*Bryum*). *Brid.*
musc. II. 3. t. 1. f. 2. (*Mnium serra-*
tum).

Bryum serratum Schrad. Spic.

In rup. sylvestr. hinc inde, rarius (v. gr. duc.
brunsv., circa *Jen.*, duc. *megap.*) Vere. 24.
(in *Helv.* quoque degit.)

Marginatis, s. crassiore margine donatis, s. lim-
batis foliis, ex quibus Dicksonus hocce dixit, plu-
rimae abhinc enumerandae species, *serpyllifoliae*,
gaudent. — De syn. *Dicks.* primus certiores nos
fecit *Turn.*; ipsi quoque Schraderiana ac Dickso-
niana specimin. comparavimus. Male olim hancce
speciem cum *H. stellari* Hoffmann conjunxit; nec
sane solummodo operculo ultima species ab hac
differt, quod *Turn.* credere videtur, dicens in *musc.*
hib.: „*Mn. stell.* Hedw. huc” (ad *Br. margin.*)
„quoque citassem, ni operc. convexum vetasset,”
sed praeprimis illa insignis foliis nervo evanescen-
te, haec nervo excedente in apiculum, qua quidem
nota, praeter operc. et folia saturatius colorata, no-
strum quoque statim dignoscendum ab insequente,
cui male *Hedw.* et omnes hucusque auctt. folia
nervo excurrente donata adtribuunt.

22. *H. hornum* Web. et Mohr.,
foliis pallidis, lanceolatis, acutis, mar-
ginatis, serratis, nervo evanescente;

sporangio subpendulo; operc. hemisphaerico-acuminulato. *Dillen.* t. 51. f. 71. *Sturm.* 5.

Mnium L. et Hedw., *Bryum* Huds. et Schreberianor.

In sylvaticis. Vere. 24.

Cum *Haller* suo *Mnio* n. 1846. (*Hist.* III. p. 54.), quod procul dubio huj. l., folia integerrima adscripsisset, ex hoc forte auctt. moti, ut l. var. l. distinctam speciem talibus foliis instructam assumerent. Sic *Weiss. goett.* *Mn. horn. β. integrifol.* habet, sterile tantum ab eo et *Web.* (*Spicil.* p. 116. — tamen inter muscos *Weberi* non aderat) lectum, et hocce *Bridelio* propria species *Mn. integrifolium*. Quis multum hoc curabit?

23. *H. stellare* Web. et Mohr., foliis ovato-acuminatis, immarginatis, serratis, nervo evanescente; sporangio subpendulo, operc. hemisphaerico, mutico. *Hedw. Specc.* t. 45. ff. 1-4. (*Mnium*).

Mnium Timm. megap., *Bryum* Roth.

In nemorosis humidis duc. megap. (Timm. detexit; recent. tempore pr. *Woldegk* copiosius leg. *Bland.*) pr. *Erlang.* Delay. (pro *Mn. horni* var.)

Vere; aestate. 2l. (in *Helv. Schleich. Cent.* 3. n. 40. — verum!)

Certo certius et folia communia, nec tantum perichaetialia, serrulata, contra *Hedw.*; ut dubia varia Bridelii de specie nil valeant. Hoffmanni Rothiique synn. omnino hujus l.; sed valde dubitamus, ut etiam sint citata *Dillen.* t. 52. f. 78. et *Reichard. moeno-francof.*; quare tantum certa loca natalia ipsi protulimus. — Foliorum nervo evanescente species praeprimis ab insequente, foliis immarginatis a praecedente (praeter reliqua) distinguitur. Cf. quoque sub *H. margin.* vix Adnn. Folia saepe glaucescunt, inprimis emollita in aqua.

24. *H. aciphyllum* Web. et Mohr., foliis obovato-acuminatis, marginatis, serratis; nervo excurrente; sporang. pendulo; operc. conico-acuminulato. *Dillen.* t. 53. f. 79. *Hedw. Specc.* t. 45. ff. 5-8. (*Mnium cuspidatum*).

Mn. serpyllifol. β . *cuspidat.* L., *Br. cuspid.* Schreberianor., *Br. serpyllif.* γ . Huds.

„Locis umbros. Vere, aestate.” *Hoffm.* 2l.

Surculi steriles decumbentes, radicales, fertiles erecti. Setae saepe plures ex uno perichaetio ut in sequentibus. — *Mn. affine* Bland. musc. frond.

exs. n. 133. mera huj. var. in turfosis lecta, ex specimm. auct., qui insimul monet, se Bridelii potius quam propria auctoritate pro distincta specie muscum habuisse.

25. *H. punctatum* Schrank., foliis obovato-acuminulatis, marginatis, integerrimis, nervo subexcurrente; sporang. pendulo; operc. rostrato. *Dillen.* t. 53. f. 81. *Engl. Bot.* t. 1183.

Schrank. baier. Fl., *Bryum* Schreberianor., *Mnium* Hedw., *Mn. serpyllifol.* α . *punctatum* L., *Br. s. Mn. serpyllifol.* quorund. recentior., *Br. serpyllif.* α . Huds.

In humidis umbrosis. Vere. 24.

26. *H. rostratum* Web. et Mohr.; foliis ovali-acuminulatis, marginatis, serrulatis, nervo excurrente; sporang. pendulo; operc. rostrato. *Dillen.* t. 53. f. 80. (fide *Turn.* et *Smith.* ex herb. Dill., monente *Smith.*, nec in ipso *Dillen.* specim. folia esse integerr., sed serrulata).

Bryum Schrad. Spicil., *Mn. ellipticum* Hoffm., *Mn. longirostrum* Brid., *Bryum serpyllif.* β . Huds.

In sylvat. humid., duc. *brunsv.*, *megap.*, *Goett.*, *Erlangae*, alibi. Vere. 24. (*Helv.* Schleich.)

Omnino proximum *H. punctato*, et vix cum *H. aciph.* comparandum, quamquam huic propius plurimi judicare videntur, et ipse *Turn.* ab eo distinguere jubet. A quibusdam quoque antiquiorr. *H. punct.* var. putata. Nec multo longius in nostro ac in illo operculum, ut inepta *Brideliana* nominis trivialis et haec immutatio. Quo commotus ab *H. margin.* *Roth* accuratius distinguit, vix capimus.

27. *H. roseum* *Schrank.*, foliis obovalo-acuminatis, subimmarginatis, serratis, nervo excurrente; sporang. pendulo; operc. convexo-acuminulato. *Dillen.* t. 52. f. 77.

Schrank. baier. Fl., *Mnium* *Hedw.*, *Bryum* *Schreberianor.*, *Mn. serpyllif.* 7. *prolifer.* L., *Br. s.* *Mn. prolifer.* quorund., *Br. serpyllif.* 8. *Huds.*

In sylvaticis Vere, aestate. 24. (rarius cum fr., qui etiam hieme maturat, in univsum longe rarius ac tres reliquae *Mn. serpyllif.* L. varr., *Hypna* nostra 24, 25 et 28.)

„Folia omnia caulium prope apices congesta, rosae in formam expansa — speciem” statim ab affinibus „distinguunt.” *Turn.* Setae ut plurimum ex uno perichaetio plures, uti in insequente. Mar-

ginem folior. incrassatum, quem in hoc quoque memorat *Turn.*, s. folia marginata, vix invenimus.

28. *H. ligulatum* Web. et Mohr., foliis lineari-ellipticis s. ligulatis, apiculatis, marginatis, undulatis, serratis; sporang. pendulo; operc. convexo-acuminulato. *Dillen.* t. 52. f. 76.

Bryum Schreb., *undulatum* alior. (*Mnium* Hedw.), *dendroides* Web. Spicil., *Mn. serpyllifol.*
J. undulatum L.

In sylvis. Vere. 24.

Caules repentes. Rami erecti, praesertim fructiferi saepe arbusculoidei, ramulis recurvis, *Salic. babylon.* quodammodo imitantes; alii elongati, simplices. — Cur in Fl. sua de Br. *ligul.* Swartz. suec. eodem dubitet Smith, non capimus. Sed vix ac ne vix quidem hujus l. erit muscus Commersianus sterilis ex ins. Borbon. allatus, cujus mentionem facit *Brid.* musc. II. 3. p. 115. Ni valde fallimur eundem accepimus (ex ins. *Borbon.* — et inter Humboldtiana quoque a Willd.), foliisque spathulato-acuminatis, immarginatis, serrato-ciliatis, nervo excurrente summopere affinem, tamen distinctum, *H. roseo* invenimus, toto coelo dissimilimum *H. ligul.*, cujus solummodo in siccis refert habitum. Etiam omnes, quos ipsi vidimus surcu-

los, semper steriles erant. Tamen species certo certius hujus generis et distinctissima.

Thuringiacis speciebus quidem adnumerat Cel. *Brid.* *Bryum alpinum* L. (Dillen. t. 50. f. 64. — a quo ex *Griffith* in *Turn.* et *Dillw. Bot. Guide* p. 103. vix, nisi var. lege, diversum *Br. cubitale* Dicks. t. 5. f. 2., aliter sentiente Smith.). Dubitamus autem, ut verum *Br. alpin.* Bridel cognoverit, quippe speciem, quae pluribus auctoribus jam fucum fecit. (Sic *Br. alpin.* Schleich. Cent. 4. n. 20. cum genuino nec minimam habet affinitatem.) Nostris ergo tali auctoritate inserere nolimus. Attamen de raro et forte posthac in Germ. detegendo musco Obs. adjicimus ex sterilibus, quae cum Swartz. *Holmiae* legimus iisque prorsus convenientibus, fructiferis pyrenaicis (ad *Pont d'Espagne*) exemplis ab am. *Stromeyer* benigne nobis communicatis. Species affinis *H. caespit.*, e colore surculorum atroviridi statim dignoscenda, foliis gaudens erecto-patentibus, anguste lanceolatis, acutiusculis, margine subreflexis, subintegerrimis, nervo excurrente; sporang. subpyriformi-ovali, pendulo; operc. convexo-mamillato; annulo, prout videtur, composito; perist. inter. processibus majorr. cum dentt. perist. ext. alternantibus

carinatis, perforatis, interjectis minorr. binis terminisve filiformm. Foliis margine subreflexis species admodum insignis est.

De Bryo? *graminifolio* Brid. (*Dillen.* t. 46. f. 17.) v. supra p. 204.; et cf. Brid. *musc.* II. 3. p. 90.

•• seta alari (*Hypnum* Hedw.)

† foliis diversimode vergentibus (nec insigniter homomallis s. circinalibus, nec anacampylis s. recurvis.)

a. uninerviis, nervo excurrente *).

29. *H. serpens* Hedw., foliis lanceolato-subulatis, patentibus, nervo subexcurrente, subintegerrimis, margine planis. *Dillen.* t. 42. f. 64.? (af-

*) Foliorum nervi ratio in *Hypnis* Hedwigianis ad species discernendas certe maximi et fere primarii momenti. Microscopii compositi lentibus quam maxime augmentibus utique observanda; et sexcenties immo optimi muscologi, *Hedw.*, *Schrad.*, *Swartz*, *Turn.*, *Smith* de hac parte hucusque decepti sunt, quod ex nostris de singulis speciebus effatis (nisi sint erronea) patebit. Tamen aegerrime subdivisiones ex nervorum ratione in genere perplexissimo adhibuimus, non quod difficillime illa inquirenda, sed quod vel heic nec sibi constans natura

firm. quoque Smith. ex herb. Dill.,
Turnero [in A. S. L. VII. p. 114.]

appareat. Optime scimus, saepe saepius vix dicendum esse, num nervus excurrat l. evanescat, ut itaque hae subdivisiones in invicem transire videantur. Saepe quoque l. excurrens l. evanescens nervus ita obsoletus, ut nullus, nisi accuratori observatori, sese demonstret. Porro species nervis binis utentes, hosce tandem quoque ita obsoletas habent, ut saepe reapse enervia eorum folia dicenda videantur, et nobis dubium, num prorsus enervibus foliis instructae species revera existant. Demum immo transitus est a speciebus foliis uninerviis ad eas foliis binerviis, uti plurimae dantur species, mox binerviis, mox uninerviis foliis utentes; ex. gr. *H. palustre*. Non itaque leviter nos vituperent velimus lectores, si in specierum diagnosi l. Obs. contradicere videamur ipsi iis, quae in subdivisionis caractere exhibuimus. Sic *subexcurrentem* nervum invenies in subdivisione *nervo excurrente* etc. Nihilominus tamen unicum haec nervi ratio nobis attentissime circumspicientibus sese obtulit, ex quo numerosissimam gregem specierum, nec sane ad unguem hucusque tractatarum, tali quali modo divelleremus. Sed monendum tandem, speciem nullam nervis foliorum plus quam binis, qui certe semper evanescunt, mox prius, mox serius, nec unquam *aequaliter*, nobis observatam esse. Si *trinervia*, *quinque-nervia* etc. horum muscorum folia auctores dicant, plicae ex reflexo folii margine l. aliae in disco pro nervis salutantur.

omn. specim. Leskiae *subtilis* vis). *Hedw. Stirpp.* IV. t. 18., *Specc.* t. 69. ff 5 - 10. (*H. spinulos.*), t. 72. ff. 8 - 13. (*H. contextum*).

Hypn. tenue Schrad. Samml., *exiguum* Bland. muscc. exss. n. 98. (*tenellum* Dicks. t. 11. f. 12?), *Seligeri* Brid.

Ad terr. subhumid., in arbb. radicc. etc. Fere toto anno. 24.

Caulis repens. Rami simplices ramosique. Sporangium cernuum. Operculum convexo-acuminatum. „Flores utriusque sexus in eodem trunco” *Hedw.* — Male olim in *Arch. f. d. syst. Naturg.* I. 1. p. 147. *Bridel.* vituperavimus *H. tenue* Schrad. et *H. serp.* *H. conjungentem*, ipsi adtribuantes *H. tenui* distinctissimum nervum et folii serraturas evidentissimas, *H. serpenti* nervum prorsus nullum, marginem integerrimum. De novo in muscos inquirentes, pace Schraderi, plane convenientes eos vidimus. Sed et facile cum *Turn.* et *Smith.* convenimus, ut levissima sit *H. serp.* var. *H. spinulosum* H., a Swartz. ex Suec. miss. Ambobus prorsus eadem omnium foliorum circumscriptio, margo, directio, nervus (in ramulorum foliis summis subevanescens, in maximis foliis satis juste excurrentes nominandus), ambobus idem sporang., operc. rel. Nec quomodo ex omnibus laudatis par-

tibus l. *H. contextum* H., l. *H. Seligeri* Brid. (parum solummodo majus) l. *H. exiguum* Bland. distinguamus perspicimus. Ultimum egregie convenit cum *H. tenello* Dicks., a *Turn.* misso (de quo jam bene *Turn.* contra *Dicks.* et *Smith.* monet, folia non esse enervia, et cujus etiam perist. cum eo *H. serp.* idem); sed hujus operc., nobis non visum, „capsulae fere longitudine, e basi convexa rostratum, aliquantulum incurvum” (*Turn.*) dicitur. In Blandow. musco quoque operculum parum longius acuminatum est, sed non sporangii longitudine. Ab ipso Bland. quoque habuimus *H. serp.* et *H. tenue!* Certe species nostra quam maxime polymorpha, prout locus natalis varius, ut difficultatibus et ambagibus haud paucis hucusque muscologos involverit, praeprimis cum nervo destituta folia ab *Hedw.* exhibita erant. Saepe saepius superne folia subhomomalla.

30 *H. fluviale* Sw., foliis ovato-acuminatis, erecto-l. subpatentibus, nervo valido, subexcurrente, integerrimis, margine reflexis. *Hedw. Specc.* t. 71. f. 4. et i. k. l.

In sax. fluvior. duc. *megap.*, *m. pinif.* (Funck.), com. *Glatz.* (Selig.) Aestate. 24.

„Trunci fructiferi breviores, steriles longius protensi, 2-3-unc., ramosi, ramis simplicibus.”

Hedw. Folia laxè imbricata, concava, suprema subhomomalla, bene ab *Hedw.* delineata. Sporang. erecto-cernuum. Operc. convexo-acuminulatum. — Nunquam cum *H. lurido* *H.* confundendum, licet ipse inventor Swartz. ejus meram var. suspicaretur (cf. Smith. Fl. p. 1330.) Nervo singulo excurrente statim dignoscitur, nec folia revera circinalia. Lesk. *palustris* Schultz. starg. ex specim. cum nostro convenit. Sunt ei perist. int. process. 2-3 minores inter majores. Lesk. *paludosa* Crom. Nachlief. 2. n. 27. foliorum acuminibus gaudet parum elongatioribus; vix caeterum nobis differre videtur, et certe peristomium idem habet ac *Schultziana* exempla! *H. fluv.* Schleich. Cent. 4. n. 26. longe alienum, sed sterile.

31. *H. fallax* Brid., foliis lanceolatis, erecto-patentibus, nervo excurrente, integerrimis, margine reflexis. *Brid. musc.* II. 2. t. 2. f. 1. (quoad fol. mala).

In *Siles.* Stark., duc. *megap.* Bland., ad *Aquisgran.* (comm. perill. de Schreb.) 24.

Vage ramosum. Foliorum inferiorum saepe solummodo nervi residui spinaeformem aspectum praebent. Sporang. cernuum. Operc. ex Brid. „e basi convexa in rostellum longiusculum, subobliquum desinens.” Affine quidem *H. fluv.* (bene

mon. Schrad. in Diar. bot. 1801. 1. p. 200.), tamen foliis multo longiorr., angustiorr., nervo evidenter excurrente diversum. Ab H. Selig. Brid., cum quo ipse Brid. justo nimis forte cognatum censuerat, quoque distinctissimum *foliis non lanceolato-subulatis, nec nervo subexcurrente tantum*, inprimis vero *operculo*, si hoc tale, quale auct. descripsit.

32. *H. populeum* Hedw., foliis lanceolato-subulatis, patentibus, nervo excurrente, serrulatis, margine reflexis. *Hedw. Specc.* t. 70. ff. 1-6. *Turn. hib.* t. 16. (*H. implexum* — vix bona, praeprimis quoad fol. —).

Hypn. implexum Sw. in Act. holm. 1795. p. 264., *plumos.* ej. Disp. (ipso Swartz. haec sua synonymn. olim docente), *ambiguum* (Schrad.) Schleich. Cat., Lesk. *plumosa* Bland. muscc. exss. n. 137., Crom. Samml. Nachlief. 2. n. 29.

In saxis, arbb ex. gr. duc. *megap.*, com. *Glatz.* (Selig.), *Francon.* (Funck.)

Caulis decumbens, repens. Rami erecti, breves. Seta scabriuscula. Sporang. subcernuum. Operc. conico-acuminatum, acutum. Folia in ic. Hedw. (ff. 3. 4.) justo multo breviora, caeterum in caule

et ramis basi latiora, in ramulis angustiora, margine reflexa. In Lesk. *plum.* Bland. perist. int. process. majores carinati, perforati, interjecti minores 2-3. Pro H. *plum.* L. et Hoffm., nec non pro H. *velut.* L. dedit Schrad. H. *implex.* Turn. revera idem ex specim. Huic quoque quodammodo simile H. *mutabile* Brid. musc. II. 2. t. 6. f. 1. (pessuma), in *Helv.*, vix in *Germ.*, hucusque lect., diversum habitu ex ramis gracilioribus etc., foliis erecto-patentibus subintegerrimis, caeterum convenientibus, sporangio etiam et operc. fere iisdem, sed seta laevi. Cf. de hoc Schrad. in Diar. Bot. 1801. 1. p. 204.

† 33. H. *reflexum* Stark., foliis cordato-acuminatis, patentibus, nervo subexcurrente, serrulatis, margine reflexis.

Stark. mst.

In putridis arbb. truncis „unter dem *Schneeberg*“ Selig. 4.

Huj. subdivis. adhuc habemus sterile H. *aquatile* Stark. mst., quod foliis acutiusc., serrulatis, nervo excurr., margine non reflexis, nec concavis, ab H. *fluv.*, cujus caeterum habitus foliorumque

forma, dispositio et directio, differt. Sed cum fructus non visus, in specierum numerum recipere haesitavimus.

b. uninerviis, nervo evanescente.

Arbusculoidea.

34. *H. alopecurum* L., foliis patentibus, ovatis, acutis, margine reflexis, serratis, nervo subexcurrente; sporangio aequali, declinato; operc. rostrato. *Dillen.* t. 41. f. 49. *Engl. Bot.* t. 1182.

In mont. sylvat., ad rupes. Vere, aestate. 24.

Caulis repens, ramis erectis, arbusculoideis, ramulis fasciculatis, recurvis. Setae laeves ramulos vix superant. Perist. int. proc. major. carinati, perfor., interjecti minor. 2-3 filiformes. Cum sequentibus duobus sui habitus species, et cum iis insigne etiam sporangio aequali, quod in nostro declinatum tantum ex phraseologia Hedw.

35. *H. curvatum* Sw., foliis subpatentibus, oblongis, acutis, inferne margine reflexis, superne subinflexis, subintegerrimis, nervo superne evanescente; sporangio aequali, erecto; operc. rostrato. *Dillen.* t. 41. f. 50.

Hedw. Stirpp. IV. t. 8. (H. myosuroides.)

H. myosuroides Schreb., *H. viviparum* Neck.,
Lesk. alior. olim.

Ad arbor., rupes. Vere, aestate. 24.

Statura praecedentis, duplo minor. Folia, bene
mon. *Brid.*, „obscure serrulata,” non, quod *Hedw.*,
Turn., *Smith* obtinent, integerrima. Nervus inter-
dum subbicranus. — Seta laevis.

36. *H. myosuroides* L., foliis
subpatentibus, lanceolato-acuminatis,
inferne margine reflexis, serrulatis,
nervo medio evanescente; sporangio
aequali, erecto; operc. rostrato. *Dil-
len. t. 41. f. 51.*

Lesk. myosuroid. quorund. olim, *H. myosurum*
Schrad. Samml.

In rupib., arb. Vere. 24.

Seta laevis. — Perist. int. process. major. carina-
ti, perfor., interjecti minores 2-3 filiformes. A
praecedente, cujus habitus, distinctissimum. Dif-
fert: statura graciliori, colore pallidiori, foliis
lanceol.-acuminatis, serrulatis, mediotenus tan-
tum nervosis (nec oblongis, acutis, subintegerri-

mis, nervo supra $\frac{2}{3}$ excurrente), sporangio graciliori, interdum leviter inaequale, operc. breviori.

Repentia, nitoris expertia.

37. *H. intricatum* Schreb., foliis erecto-l. subpatentibus, supremis subhomomallis, lanceolato-subulatis, margine reflexis, serratis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanido; seta scabra; operc. conico. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 28. *Dicks.* t. 11. f. 13. (*H. Teesdalii*.)

Schreb. lips., *H. velutin.* Bland. muscc. exss. n. 146.

Ad arbb. radd. Vere. 2.

Cum *H. velut.* saepius commutatur, licet satis ab eo distinctum, quod ex diagnosibus nostris patet. Sec. Hedw. quoque in hoc annulus compositus, in *H. velut.* simplex. — Huj. l. quoque esse videtur *H. strigos.* Schleich. Cent. I. n. 38., licet folia parum latiora parumque breviora videntur. Certe nec l. *H. Stark.* l. *H. velut.* est, et a vero *H. strig.* omnibus notis, praecipuis seta scabra, operc. conico, magnopere abhorret.

38. *H. Starkii* Brid., foliis laxis, subpatentibus, cordato-acuminatis, acu-

tis, margine subplanis, serratis, nervo sub summo apice evanido; seta scabra; operc. conico.

In Siles. Starke. 24.

Omnia partium rationibus duplo majoribus, foliis evidentius serratis, nervo parum altius egrediente solummodo ab *H. velut.*, cui Brid. *simillimum* dicit, differe videtur. Ab *H. rutab.*, cum quo (ex errore?) Schrad. comparat in *Diar. bot.* 1801. I. p. 201., distinguendum nervo multo longiore, acumine folii multo brevioris nec ita angustato. Species, cujus singulos ramulos am. Starke misit, nobis nondum extra dubitationem posita.

39. *H. velutinum* L., foliis laxis, erecto-l. subpatentibus, supremis subhomomallis, cordato-acuminatis, acutis, margine subplanis, serrulatis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanido; seta scabra; operc. conico. *Dillen.* t. 42. f. 61. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 27.

Ad radd. arbb. Vere. 24.

H. intricato duplo omnibus rationibus majus.
— Fig. sub hoc nomine ap. *Sturm.* 4. obvia omne

fere *Hypn.* Hedw. sistere potest, nec ad nostrum
l. aliud cum ulla certitudine citanda.

Plumosa, splendentia.

40. *H. plumosum* L., foliis sub-
patentibus, supremis subhomomallis,
lanceolato - subulatis, margine subre-
flexis, subserrulatis, nervo supra med.
evanido; seta laevi; operc. conico. *Dil-*
len. t. 35. f. 16., fide Anglor. *Turn.*
hib. t. 15. f. 1.

H. pseudo-plumosum Brid.

In saxis. Vere. 2.

Dillenii, *Hudsoni*, *Linnei* et *Dicksoni* haec plan-
ta fide Anglor. nostratibus certe parum adhuc no-
ta, ab ipso am. Turn. quoque nobiscum commu-
nicata. *)

*) Dubie, bene, ad hanc speciem amiciss. *Turn.*
citatur *Lesk. plumosam* Sw. Disp. (*Hypn. plu-*
mos. Act. holm.) Nostrates, facilius satisfacti
de suorum muscorum determinatione, nuperri-
me pro Swartziana specie venditarunt ipsissi-
mum *Hypn. plumos.* Sw. Disp., s. *H. popul.*,
quod supra monuimus. (Immo, quod mirum, *Crom.*
ille persuadere nobis studet, se in hac falsa
Lesk. plum. revera peristomium interius *Leskaie*
vidisse; v. l. c. p. 47.) *Lesk. plum.* Sw. rarissi-

41. *H. salebrosum* Hoffm., foliis erecto-patentibus, lanceolato-subula-

ma et hucdum obscurissima stirps, semel tantum (et unicum solummodo specimen) reperta ab auct., uti in *Arch.* p. 146. jam indicavimus. Pro eximia sua erga nos benevolentia humanissimus Swartz hujus sui unici exempli examinandi ansam nuperrime nobis praebeuit. En, quae vidimus! — Certo certius *Hypnum* species est, perist. int. processibus majorr., cum dentt. perist. ext. alternantibus, carinatis, perforatis, interjectis minorr. filiformm., subsingulis. Surculi ramique subcompressi, scil. terram spectante latere applanati, illi repentes, pinnati, ramis brevibus, confertis, rectis. Folia, quod bene *Turn.* de *H. nigroviride* Dicks. monet, „omnia sursum spectantia unde rami inferne compressi,“ imbricata, subpatentia, leniter homomalla, caeterum aequilatera, ovato-longius tenuiusque acuminata (acumen, quod subito exit, inferiore exactissime ovata folii parte dimidio brevius), concava, margine reflexa, superne sub acumine subinflexa, integerrima, subnervia (vestigis gemellorum nervorum basi omnium obsoletissimis). Seta 6-8 lin., recta, laevis, torta. Sporangium erectum, subaequale, oblongum, laeve. (Ex Swartz. operc. acutum.) — Species *H. nigroviridi* Dicks. (de quo vide sub *H. cupressif.* infra Adnn.) sane proxima, etiam foliorum colore nigroviridi et in siccis nitore conveniens. Distinguenda unice videtur foliis densioribus, basi satis latioribus minusque homomallis.

tis, margine plica reflexis, serratis, nervo supra $\frac{2}{3}$ evanido, seta laevi; operc. conico. *Hedw. Stirpp. IV. t. 15.* (*H. plumos. excell. synn.*)

*Hoffm. Fl., H. plumos. Crom. Samml. n. 42. *)*

In sylvis ad rup. Vere. 24. (e Suec. quoque habemus.)

Quanquam *Turn.* et *Smith* *H.* hocce *salebr.* longe distinctissimum pronuntient ab antecedente *H. plum.*, tamen non multum nobis differt praeter elongatiorem folii subulatam partem, plica marginali distinctissima, cum in illo margine folia tantummodo subreflexa. — *Icon. Hedw.* satis justa, sed nervus altius ascendit.

β. capillaceum, pallidius, foliis patentioribus, evidentius serratis.

H. capillaceum Stark. mst.

In comit. Glatz. Seliger.

Habitu omnino hocce *β.* diversum, quod, teste *invent.*, etiam *Schrad.* et *Schwaegr.* novum putant. Magis primo intuitu accedere videtur ad quasdam *H. riparii* *varr.*, a quibus foliis evidenter serratis, margine plica reflexis statim dignos-

*) Egregia synonymorum diversissimorum (*H. plum. Hedw., Linn., Sw.*) apud *Crom.* coacervatio.

cenda. Vix, quo rite sejungeremus ab *H. salebr.* valde ludente, vidimus; sed forte propria species in posterum probabitur.

42. *H. lutescens* Schreb., foliis erecto-patentibus, lanceolato-elongate tenuiterque subulatis, margine plica reflexis, subintegerrimis, nervo superne evanido; seta scabra; operc. elongate conico. *Dillen.* t. 42. f. 60. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 16.

Schreb. lips., *Neck. Willd. berol.*, *Lesk. longifolia* Ehrh. *Decc.*, *H. myosuroides* An. de Cienc. nat. n. 14., ex specim. ab ipso Lagasca!

Ad terr. in sylvosis. Vere. 2.

Praecedenti forte nimis affine censet amiciss. *Turn.* in musc. hib.; sed certe diversissimum, imprimis seta scabra, operc. longiore, etiam toto habitu. Simillimum nostro *H. aureum* An. de Cienc. nat. n. 14., seta quoque scabra gaudens, foliis in siccis appressis, in madidis etiam imbricatis, non ita tenuiter subulata parte elongata, prorsus integerrimis, operc. breviori diversum nobis visum. Ab ipso Lagasca habemus.

43. *H. nitens* Schreb., foliis erecto-patentibus, elongate subulatis, mar-

gine plica reflexis, striis plurimis in disco notatis, subintegerrimis, nervo superne evanido; seta laevi; operc. conico. *Dillen.* t. 39. f. 37.

Schreb. lips.

In paludosis. Vere. 24.

Fulvum, erectum, plures uncias longum, tomento obsitum. Folia longissime (exacte) subulata. *H. nitens* Linn. fil. et Swartz. meth. musc., teste Swartz, non huc, sed ad *H. rufesc.* Dicks. pertinet.

I l l e c e b r a.

44. *H. piliferum* Schreb., foliis laxis, erecto-patentibus, ovato-longe tenuiterq; acuminatis, concavis, margine planis, serrulatis, nervo intra $\frac{1}{2}$ evanido, seta scabra sporang. cernuo; operc. rostrato. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 14.

Schreb. lips.

In sylvat. umbros. Vere. 24.

Egregie ab Hedw. depictum, praeter quod serraturae folii omissae, nec a Turn., nec a Smith. quoque visae.

45. *H. purum* L., foliis imbricatis, ovato-acuminulatis, acutis, concavis, integerrimis, nervo ad $\frac{1}{2}$ evanescente; seta laevi; operc. conico. *Dillen.* t. 40. f. 45. *Hedw. Spec.* t. 66. ff. 3-6.

H. elegans Ehrh. Decc.

In pratis, sylvis. Vere. 24.

Ab hoc differt verum *H. illecebrum* Hedw. pennsylvanicum (*Hedw. Spec.* t. 66. ff. 1. 2.): 1) surculis exacte teretibus (qui in *H. puro* subcompressi); 2) foliis brevior. et latior., subrotundis magis quam ovatis (arcte imbricatis, concavissimis, latissime ovato - [fere subrotundo -] acuminatis, margine plica reflexis); 3) horum foliorum serrutaris (evidentissimis quidem, tamen ab Hedw. neglectis); 4) nervo supra $\frac{2}{3}$ tantum, nec ad $\frac{1}{2}$ evanido (justo brevior est in fig. Hedw. 1., quae caeterum circumscriptione exactissima) et 5) sec. Hedw., seta scabriusc. — *H. illecebrum* auctt., *Dillen.* t. 40. f. 46. *), *Schreb.*, *Swartz.*, *Smith.*, alior. europaeum quid sit (forte non omnium idem; bene enim habet *Turn.*: „Stirpes inter se perquam absimiles in herbb. illustrissimis hoc nomine in-

*) Forte americana specimina, quorum Dill. mentionem facit. genuinum Hedwigii vegetabile.

signitae occurrunt“) ignoramus. Certe nunquam veram americanam stirpem l. ex Germ. l. ex reliqua Europa accepimus. Forte aut insequens *H. trifar.* (quod Schultz fecit), aut *H. Schreberi* (quod ab am. *Lammersd.* accepimus uti *H. illec.* „agnotum ab Hedw.“) pro *H. illec.* dicti auctt. sumserunt, aut demum *H. puri* var. (habet enim *Turn.*: „*H. illecebr.* [Dill. t. 40. f. 46.] planta, qua nulla magis dubiis vexata, vix nisi ramis breviorr., crassiorr., apice rotundatis, foliisq. latiorr. ab *H. puro* differre videtur“) *). Ab omni autem hu-

*) Aliam adhuc conjecturam afferamus! *H. illecebr.* „capitula parva, brevia, erecta“ vocat *Rajus*. Invenimus autem in herb. Web. patr. *helvetica* (non *hercynica*) exempla, nomine *H. illec.* consignata, atque nuperrime ex *Herc.* pro *H. curvato* ad am. *Bland.* allata vidimus, haec et illa plane congruentia cum *Descr. Web. H. illec.* in *Spic.* Hisce speciminibus folia sunt parum latiora quam in vulgari *H. curv.*, nervo saepe jam ad $\frac{1}{2}$ evanescente, ut eo modo haecce folia iis *HH. puri* et *illec.* ap. Hedw. generalioribus notis satis bene respondeant. (Folia enim *HH. curv.* et *puri* non ita dissimillima, e contrario multum convenientia.) Tum autem dictis *helveticis*, tum *hercynicis* exemplis fructus, illis vel operculum; nec ex his partibus et subserrulatis foliis, nisi varietatis lege, ab *H. curv.* haecce specimina discernere valeamus. Sporangia enim aequalia ab *HH. puro* et *illec.* Hedw. et ab *H. Schreb.*

cusque memorato *H. illec.* diversissimum *H. illec.* L. Fl. lapp. ed. 2. (*Bryum caule erecto ramoso, foliis ovatis undique imbricatis* ed. 1.), de quo pauca ut addamus licitum nobis sit velimus. *Arrhenopterum* esset ex system. Hedw. (v. p. 279. not.), bene jam mon. sagaciss. *Wahlenb.*, qui ex *Lapp.* ab ipso relatum hunc muscum ante tres annos nobiscum Upsaliae communicavit sub nomine *Arrh. turgidi* (scil. verosimiliter inscius tunc temporis Linnéani synonym.) Stirps *Arrh. heterosticho* *H. pensylvanico* primo intuitu satis similis, ut eo inductus sit Cel. *Smith* in A. S. L. VII. p. 263., prorsus eandem declarare (postquam optimus *Turn.* non *specificam*, sed *genericam* [prout ex litt. sci- mus] ambarum plantarum identitatem ei innue- rat). En vero quam egregie (ut scimus jam ipso *Smith.* nunc concedente) differunt *Arrh. heterost.* et *A. illecebrum* s. *turgidum*! *A. heter.* folia ovalia, *acuta* (male *Smith obtusa* vocat), *serrata*, nervo in infimis subexcurrente (et tum brevem cuspidem formante), in summis sub apice evanescente (quam nervi rationem nec Hedw. observavit); sporang.

ea statim distinguunt. Quaestio igitur nobis exoritur, num *H. illec. Raji* „capitulis erectis” et europaeum (nec american.) *Dillen. A. B.* (non *Vaill. t. 25. f. 7., s. Dillen. C.*) haecce sit ipsissima crassior *H. curv. var. s. H. illec. Web. Spic.?*

subcylindracenm, erecto - cernuum. — *A. illex*.
s. turgido folia oblonga, obtusa (et quidem obtu-
sissima, apice lingulato-rotundato), integerrima,
nervo in omnibus sub apice evanescente; sporang.
obovatum, cernuum. Caeterum bene monet *Smith*,
non tantum *Bryum Dillen.* t. 45. f. 11., sed etiam
in *Append.* enumerata species t. 85. (ex mendo
typogr. expressum est „35“) f. 19. (quae fig.
priori parum melior!) ad *Arrh. heter.* pertinere.

46. *H. trifarium* Web. et Mohr.,
foliis imbricatis, cochleatim tristichis,
oratis, obtusis, concavis, integerri-
mis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanido; seta laevi;
operc. conico. *Web. et Mohr. It.*
suec. t. 2. f. 2. a-d.

H. uliginosum Schleich. Cent. 3. n. 54. „in tor-
faceis m. Jorogne“ s. fr., *illecebrum* Schultz.
starg.

In paludd. profundissimis ad pag. *Jatzke* in
dem Bruch an der *Eichhorst*. Grenze cum *H. scor-*
pioidi et *adunco*. *Megap.* Schultz. Julio. 24.

Pulcherrimus muscus et distinctissimus, foliis
reapse per tres series cochleatim tortas dispositis.
Male, pro more, *Bridelii* diagnosis *H. illecebrum*
dissimillimo huic am. Schultz associavit. *Cel. Bel-*

vis. *H. subtile* Brid., e Commersonianis sterilibus
H. trifarium denominavit.

47. *H. stramineum* Dicks., foliis
laxis, erecto-patentibus, anguste ova-
tis, obtusissimis, concavis, integerrimis,
nervo ad $\frac{2}{3}$ evanescente; seta lae-
vi, operc. conico. *Dicks.* t. 1. f. 9.

In paludosis (cum *H. scorp.* etc.) *Herc. Hanov.*
Ehrh. Schrad. (cf. Hoffm. in Add. ad Fl.); *duc.*
megap. starg. Schultz; pone *Gefrees* Francon.
Funck. (Crypt Gew. n. 158.) Aestate. 24.

Immerito folia enervia dicuntur ab auctor.

48. *H. cordifolium* H., foliis
laxis, patentibus, cordatis, obtusis,
integerrimis, nervo sub summo apice
evanido; seta laevi; operc. conico.
Hedw. Stirpp. IV. 1. 37.

In paludosis. Vere. 24.

Cum *H. cuspid.* a quibusdam commutatum, ab
ipso *Ehrh.*, uti e specim. pr. *Upsal.* ab illo col-
lecto vidimus, nec non a *Turn.*, cujus *H. cusp.*
β. bicolor musc. hib., ipso mon. in *Botan. Guide*
p. 470., idem.

Strigosa.

49. *H. strigosum* Hoffm., foliis laxis, patentibus, ovato-triangularibus, obtusiusculis, concavis, margine subreflexis, subserrulatis, nervo apicè subevanido; seta laevi; sporangio cernuo; operc. rostrato.

H. intricatum Timm. megap., ex specim., quod am. Bland. misit, recte judicante Hoffm. in Fl.

In sylvis ad terram. Vere. 24.

Contra *Brid.* et *Schrad.* (in nov. diar. bot. I. 3. p. 104.), qui primus specimina dedit, ab insequenti *H. thuring.* distinctum putamus, licet certe ei summopere affine. Folia in nostro ovato-triangularia, nervo vix infra summum apicem evanido, in *H. thuring.* ovato-acuminata, nervo evidentissime versus apicem evanescente. Etiam habitu stirpes dignoscendae.

50. *H. thuringicum* Brid., foliis laxis, patentibus, ovato-acuminatis, obtusiusculis, margine subreflexis, serrulatis, nervo versus apicem evanido; seta laevi; sporangio cernuo;

operc. rostrato. *Brid. musc.* II. 2.
t. 3. f. 2. *Hedw. Specc.* t. 68. ff. 1 - 4.
(*H. pulchellum.*)

In nemorosis. Vere. 24.

Icon Hedw. exactissime plantam repraesentat. Tamen serraturas apice obvias, uti saepius, b. vir neglexit et sub f. 3. fol. parum nimis breve sistit. Huj. quoque loci: *H. Ludwigianum* Spreng. Anl. 3. p. 297. f. 56. (*Ludw. Mooscent.* I. n. 94.), quod male in nostris *Beitr.* I. p. III. b. Hedw. fil. *Leskiam* pronuntiaverat. Sunt enim perist. int. processus filiformes 2 (non singuli, quod Spreng. habet) inter majores carinatos, perforatos (non imperforatos, quales miserrima Spreng. icon sistit), cum dentt. perist. ext. alternantes. Folia quoque minime enervia, quod vult Spreng. — Tandem nostro proxima species *H. praecox* Hedw. *Specc.* t. 64. ff. 11 - 14., foliis arcte imbricatis, erecto-patentibus, cordato-triangulo-acuminatis, obtusissimis, margine reflexis, serrulatis, nervo ad acumen evanescente; seta laevi; sporangio cernuo; operc. rostrato gaudens, ab *H. strig.* distinguendum, quod folia acuminata, ab eo et ipso nostro *thuring.*, quod surculi ex arcte imbricatis, erecto-patentibus foliis fere julacei. Non quidem hoc, quod scimus, hucusque in Germ. observatum, sed, quantum e specimm. deoperculatis judicari li-

ceat, ejus synonymum: *H. abbreviatum* Schlecht.
Cent. 4. n. 25.

51. *H. murale* Hedw., foliis laxis,
erecto - l. subpatentibus, ovali - brevi
acuminatis, concavis, margine subpla-
nis, integerrimis, nervo ad $\frac{1}{2}$ evanido;
seta laevi; sporangio cernuo; opere.
rostrato. *Dillen.* t. 41. f. 52. *Hedw.*
Stirpp. IV. t. 30., *Spec.* t. 65. ff. 1 - 4.
(*H. abbreviatum*.)

H. confertum Engl. Bot. t. 1038., fide Turm.

In muris, saxis humidis. Vere. 24.

Nervus folii in *H. abbrev.* *H.* aequae alte pro-
ductus omnino adest ac in *H. mur.*, nec vel mi-
nimis species differunt, recte jam olim suspicante
Brid. (*Musc.* II. 1. p. 103.)! Ne cum *H. molli*
Dicks. hoc confundas cave. Cum *H. conferta*
Dicks. vix multum convenit, contra Smith.

R u t a b u l a.

52. *H. longirostrum* Ehrh., fo-
liis laxis, patenti-divergentibus, cor-
dato - triangularibus, acutis, margine
reflexis, serratis, nervo supra $\frac{2}{3}$ eva-
nido; seta laevi; sporangio cernuo;

operc. rostrato. *Dillen.* t. 38. f. 30.
Hedw. Stirpp. IV. t. 13. (*H. striatum.*)

Ehrh. Dec. n. 75., *striatum* Schreb. lips. et plurimm. (forte pro parte tantum; etenim scimus, et olim a Schrad. comperimus, haud paucos auctt. sub *H. striato* conjuncta habere Ehrharti *H. longirostr.* et *brevirostr.*, pro qua ratione aptius *longirostri* nomen elegimus), *obesum* Pers. mst., ex (dubia) auctoritate Brid. musc. II. 2. p. 156.

In sylvatt. umbrosis. Vere. 24.

Malam Hedwigii hujus tabulam Sprengel vocat; nobis bona videtur.

53. *H. rutabulum* L., foliis laxis, patentibus l. patentibus subdivergentibus, ovato-acuminatis, margine subreflexis, serrulatis, nervo ad $\frac{1}{2}$ evanescente; seta scabra; operc. conico. *Dillen.* t. 38. f. 29. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 12.

Ad terr. et arb., ubique. Vere. 24.

Hedw. tab. optima, praeter quod serraturas foliorum non sistet. Ne cum hoc confundas *H. brevirostrum* Ehrh. cave; v. infra Obs. ad *H. triq.* β . Characteribus quoque nostrum haud absimile *H. velut.*, habita multum diversum, scil. duplo, tri-

plo omnibus rationibus majus. Etiam annulo nullo ex Hedw. distinguitur, ut alias notas in diagnosis traditas nec repetamus. Bene sane habet *Turn.*: „est maxime variabile, — forma, colore et magnitudine tam mire ludit, ut saepe sagacissimos, quotidie tyrones vexet.” Vexavit quoque, ut putamus, *Smithium*, cum *H. crenulatum* in Fl. brit. exposuit. Specimina enim hujus vix ullo modo, nec seta, a nostro discrepantia observamus. Plantam quoque, quam nec ullis notis, sint l. caulis et folia, l. seta, sporang., operc. (annulus etiam, prout videtur, omnino nullus) et perist., discernere valemus, sub nomine *Lesk. Ludwigii* Spreng. mst. olim misit *Starke*. Non est *H. Ludwigianum* Spreng. Anl., contra *Hedw. fil.* in nostris Beitr. I. p. III. Cf. ad *H. thuring.* Obs. Var. vero *γ. virens* Turn. hib. (*H. virens* Sw. mst.) certe nec huc pertinet, cum in specim. operc. longe rostratum, setam laevem invenimus. Propius sane accedit ad *H. riparioid.*; a quo vix ac ne vix quidem distinguere possumus. Folia enim minime integerrima, licet *Turn.* affirmet, et aequae ac reliquae partes ad amussim conveniunt cum iis *H. riparioid.*

54. *H. megapolitanum* Bland., foliis laxis, erecto-patentibus, ovato-acuminatis, margine subplanis, subin-

tegerrimis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanescente; seta laevi; sporangio cernuo; opero. rostrato.

Bland. musc. exss. n. 147.

In duc. *megap. Bland.. Vere. 24.*

Folii nervus interdum bicranus, ex lusu naturae. *H. pilifero* multum similis species, praeteris seta laevi statim dignoscenda, nec quacum alia confundi queat hucdum videmus. Per litt. quoque monuit amiciss. auct., forte *Dillen. t. 43. f. 67.* esse hujus loci. Sed *Dillenii* stirps, caeteroquin dissimillima, patagonica, ut nec bene ab Anglis cum *H. atrovirenti* Dicks. conjuncta nobis videatur. Etenim habent quidem haud raro nostra *Amer. sept.* et aliae terrae plagae boreales, vix unquam tropicae l. hemisphaerii australis regiones. Exemplum demum Cl. Bland. misit, ei ipsi ejusdem speciei visa, quae novam, „*H. penniforme*,“ Cel. Brid. existimaverat.

55. *H. riparioides* Hedw., foliis laxis, patentibus, ovatis, acutis, concavis, margine planis, serratis, nervo sub apice evanido; seta laevi; sporangio cernuo; operc. rostrato.

Dillen. t. 38. f. 31. A. B. *) et (teste
Smith. ex herb. Dill.) t. 40. f. 44. A.
(*H. ruscifol.* Dicks.), — t. 38. f. 32. et
t. 85. f. 20. (*H. prolixum* Dicks.)
Hedw. Stirpp. IV. t. 4. *Brid. musc.*
II. 2. t. 4. f. 1. (*H. atlanticum* —
s. fr.), t. 5. f. 3. (*H. inundat.*)

H. ruscifol. et *rusciforme* Neck., *rusciforme*
Weiss., *rivulare* Ehrh. Decc., *ruscifol.* et *rivul.*
Hoffm. Fl., *riparioid.* et *ruscifol.* Roth. Fl., *pro-*
lixum Sw. suec. et Mich. bor. am., *ruscifol.*
Turn. et Smith.

Ad saxa, in rivulis. Aestate. 2l.

Surculi subcompressi. Icon Hedw. optima! —
Apud antiquiores auctt., uti patet ex figg. et synonym.
a nobis allatis, bis plerumque species describitur;
certo injuste. (Sed nec Turnero assentire possu-
mus, vel *H. riparium* cum nostro conjungendum
censenti. Toto coelo differunt, quod patet ex
diagnoss. nostris.) Apud *Brid.* ad minimum qua-
ter, forte quinques occurrit. Sunt enim Ejus HH.
atlant., *rusciforme*, *inund.* et *prolix.* certo cer-
tius eadem (*H. atlantici* specimm. ab ipso Desfont.

*) C. ex Patagonia delata vix huj. loci suspi-
canda.

data ex benignitate b. Hedw. fil. possidemus, et cum iis exactissime conveniunt Schleicheriana aequae sterilia in Cent. 2. n. 52., „in rivulo puro pr. Sail-
lon" lecta), et forte quoque accedit *H. rivulare*, nisi hoc potius, excl. syn., ad *H. riparium* pertinet. Proprium quid vix unquam censendum. Cel. Schrad. in Diar. bot. 1801. 1. p. 205. forte duas species denuo esse distinguendas innuit, Ei *H. ruscifol.* et *H. rusciforme*, quorum illud absque ordine patentia, laete viridia, hoc homomalla, densa, appressa et obscure viridia folia haberet. Sed nec hisce species discernendae. *H. ruscifol.* Schrad. est *H. rutab. γ. virens* Turn. hib., de quo vide ad finem sub *H. rutab.* Obs., et *H. rusciforme* Schrad. est ipsissimum *H. rivulare* Ehrh. Decc. s. *riparioid.* *H. . „Mira"* ergo „apud auctores de *H. ruscifol.*" (*riparioidi* hoc) „confusio, ex qua synonyma difficillime extricantur," cujus mentionem facit Turn., certe cessat, si antiqua et varie heic illic translata nomina *HH. ruscifol., rusciform., prolixi* obliviscamur, retinentes Hedwigianum illud *H. riparioidis.* — In *Am. bor.* quoque nostra species obvia; nullis enim differunt Michauxiana sui *H. prolixi*, quae accepimus, specimina. In msto olim *H. rostellatum* speciem auctor vocaverat. — Tandem reapse parum a nostro recedere videtur *H. fontanum* Schleich. Cent. 2. n. 53. „aux Mosses in rivul's" lect., sed absque fructu ab auct.

datum. Foliis margine undulatis, acutissimis l. subacuminatis (nec acutiusculis tantum), evidentius serratis quodammodo insigne; an satis specificè distinctum, vix dicemus.

56. *H. confertum* Dicks., foliis laxis, patentibus, ovato-acuminatis, concavis, margine planis, serrulatis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanido; seta laevi; sporangio cernuo; operc. rostrato. *Dicks.* t. 11. f. 14. *Engl. Bot.* t. 1262. (*H. serrulatum*).

H. clavellatum Huds., excell. synn., *serrulat.* Turn. hib., *serrulat. et confert.* Smith. Fl.

Ad terr. pr. *Brem.* L. C. *Trevir.* Hieme; Vere. 24.

Specimina anglica cum nostris contulimus, et omnibus congruentia vidimus. Habitu species accedit *H. sy'vat.* Huds., characteribus distinctissima. Ab *H. serrulato* *H. pensylvanico*, quocum *Turn.* conjunxit, distinguimus: 1) tota planta nostra multo pallidior; 2) nervus pensylvanici musci obsoletus, pallidus, infra $\frac{1}{2}$ evanescens, europaei intensius coloratus, ad $\frac{2}{3}$ tantum evanidus; 3) folii quoque figura in pensylvan. musco parum alia, nempe fere lanceolato-subulata dicenda. — *H. Schleicheri* Hedw. fil. in nostris *Beitr.* I. t. 7., ex

icone omnibus, et minutissimis, etiam perichæ-
tio, cum *H. hoc!* conferto convenit. Sed setas
scabras in nostris exemplis observare nequivimus.
Num hic character prorsus constans sit, vix hucus-
que probatum est, et minute ac rarissime murica-
tam setam *H. sui Schleicheri* Hedw. quoque tan-
tum pinxit.

57. *H. albicans* Neck., foliis im-
bricatis, subpatentibus, ovato-lan-
ceolato-subulatis, margine plica re-
flexis, integerrimis, nervo sub acumi-
ne evanescente; seta laevi; operc. co-
nico. *Dillen.* t. 42. f. 63. *Hedw.*
Stirpp. IV. t. 5.

In arenos. Vere. 24. (rarius fructif.)

Insequenti quidem proximum, at foliis margine
plica reflexis evidenter distinctum. Icon Hedw.
optima. — Teste olim nobis Schrad. ex specimm.
H. albic. Hedw. et Dicks. prorsus eadem, nec di-
versa Schreberiana exempla, quorum Cel. Roth
mentionem facit in *Fl. germ.* III. I. p. 303. *Obs.*
I., ut *HH. albic.* et *flavesc.* Roth. nullo modo di-
stinguenda. — Quae varietas Ei visa *Lips.* col-
lectam nobis mis. am. *Schwægr.* operc. rostrato
gaudentem, caeterum vix differentem. — Tota
quanta species, nostratibus vix satis nota, meliori
attentioni haud indigna.

58. *H. riparium* L., foliis laxis, patentibus, ovato-lanceolato-subulatis, margine planis, integerrimis, nervo superne evanido; seta laevi; operc. conico. *Dillen.* t. 40. f. 44. B-D.? (consentt. *Hedw.* et *Smith.*, *Turnero* et haec ad *H. riparioi*d. referente). *Hedw. Stirpp.* IV. t. 3.

H. hornum Web. Spic. — solummodo goslariensis specimin., memorata enim in Descr. et Obs. helvetica revera ad *H. sylvat.* Huds. pertinent — (Fissid. *Weberi* Brid. musc.), ex herb. Web., *pallidum* Schwaegr. mst., *longifolium* Schultz. starg., *Schultzii* Bland. muscc. exss. n. 150. (*trichopodium* Schultz. starg.)

In udis, ad rip. fluvior. et in ipsis fluviis. Hieme. 24.

Admodum polymorpha stirps (quod in genere de palustribus valet), foliis mox remotioribus, mox densius congestis, brevioribus l. elongatissimis, setis longiorr. l. breviorr., pro vario solo natali mire ludens, ut tenuissimae varr. fere *H. fluit.* referant ac ne cum eo confunderentur, cavendum sit. Hinc tot auctt. nostratium synonyma! — In *H. longif.* Schultz. folia elongatissime subulata, nervo vix infra $1/2$ evanido. — In *H. Schultzii* Bland. folia subintegerrima observamus, nec cum

Schultzio ea „denticulata” nuncupanda censemus;
ut absque fere dubio etiam hoc synonym. proferamus.

Abietina.

59. *H. abietinum* L., foliis patentibus, margine plica reflexis, subintegerrimis, nervo superne evanescente, dorso papilloso, trunci cordato-acuminatis, ramulorum ovatis, acutis; seta laevi; operc. conico. *Dillen.* t. 35. f. 17. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 32.

Ad terr. in sicc. Aestate. 24. rarius fructif.
(In *Am. bor.* quoque provenit ex *Michaux.*)

60. *H. Blandovii* Web. et Mohr., foliis patentibus, margine reflexis, serrulatis, nervo superne evanescente, dorso laevibus, omnibus cordato-acuminatis; seta laevi; operc. conico.

H. affine Crom. Nachlief. 2. n. 20., non Hoffm.;
v. ad *H. commut.* infra Adnn.

In prat. paludd. duc. *megap.*, pr. *Waren*
Bland., pr. *Neumühlen* Crome. Aestate. 24.

Facie praecedentis, a quo tamen fere differt uti
H. splend. ab *H. tamariso*. *H. abiet.* enim opacum

e foliis dorso muriculatis l. papillosis, nostrum nitet, foliis scil. dorso laevibus. Caeterum diversissimum quoque foliis omnibus latissime cordato-acuminatis, nec iis ramulorum ovatis, acutis. Quoque in *H. abiet.* folia integerrima, nisi forte in reflexo margine papillulae dorsi crenulas ipsius marginis mentiuntur, in *H. Bland.* folii versus basin inprimis satis evidenter serrulata. Retis folii quoque areolae, s. cellulae, in *H. abiet.* subrotundae, hexagonae in *H. Bland.* — Ab *H. filic.* nostrum differt nervo folii evanescente, ab *H. commut.* foliis brevibus, non circinalibus, ab *H. umbrato* nervo semper singulo, serraturis minutis, nec (inprimis apice) evidentissimis. — Quid demum sibi velit *Crom.* membrana sua reticulata, caulem vaginante, in hoc Hypno et in Sphagno *squarr.* obvia (v. *Samml.* Lief. I. p. 24., Nachlief. 2. p. 5 et 36.) non capimus.

61. *H. tamariscinum* Hedw., foliis laxis, patentibus, cordato-acuminatis, acutis, margine reflexis, serrulatis, nervo sub acumine evanescente, dorso papillosis; seta laevi; sporangio cernuo; operc. rostrato. *Dillen.* t. 35. f. 14. et t. 83. f. 6. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 33. (*H. delicatulum*), t. 35.

(*H. recognitum*), *Specc.* t. 67. ff. 1 - 3.
(*H. tamarisc.*) *Sturm.* 2. (*H. prolif.* —
mala.)

H. proliferum L., fide Swartz et Anglis, *deli-*
catum Ehrh. *Decc.* n. 301., *delicatulum* Schrad.
Spic., *parietin.* et *delicatul.* Willd. *ber.*, *prolif.*,
delicatul. et *recogn.* Roth. *Fl.*, *pariet.*, *recogn.* et
delicatul. Brid. *musc.*, *prolif.* n. 34. et *recogn.*
n. 36. *Crom. Samml.*

In sylvis, ad terr. Vere. 2.

Nullum nobis dubium, quin *H. recogn.* Hedw.
Stirpp. et *H. tamarisc.* ej. *Specc.* prorsus sint
eadem. Praeter graciliorem habitum operc. conico
differre dicitur *H. recogn.* Sed jam bene Swartz.
in *Disp. Dillen.* t. 35. f. 14. cum *H. recogn.* *H.*
conjungit, cui conjunctioni quoque nuperrime as-
sentiit optimus *Turn.* contra *Smith*, qui ambas
stirpes diversas censet (male *H. tamarisc.* integer-
tima folia adtribuens). Certe nunquam nos (nec,
prout scimus, *Schrad.*) duas diversas stirpes ex
Germ. l. reliqua *Eur.* accepimus, sed semper
unam eandemq., mox sub *H. recogn.*, mox sub
tamarisc., mox sub *delicatuli* nomine. *) Non

*) Sub ipsa hujus plagulae impressione demum
ab amiciss. Swartz *H. recognit.* a manu pro-
pria Hedwigii accipimus; nec levissimum dis-

solum autem Floristst. Europae *H. delicatum* s. *delicatulum* omnino iungendum cum *H. hoc tamarisc.*, sed nec levissimis illis notis pensylvanicum *H. delicatulum* Hedw. (*Dillen.* t. 83. f. 6.), ex specim. ab *R. A. Hedw.* et perill. de Schreb. distinguere valemus. Caeteris omnibus ad unguem convenientes musci, quos praeprimis, uti videtur, *perist. int.* distinctos Hedw. censuit. *H. delicatulo* enim processus majores imperforatos, minores interpositos singulos adscripsit; reapse autem evidentissime perforatos majores processus videmus et interjectos minores 2-3. — Simillima quoque *HH. tamarisc.* et americano *delicat.* altera pensylvanica species, *H. minutulum* Hedw. *Stirpp.* IV. t. 34., praeter minorem omnium partium molem (reliquis characteribus convenientt.) ab utroque dignoscenda *foliis dorso laevibus.* *) Huic

crimen est inter haecce specimina et ea *H. tamarisc.* Operc. praeprimis minime, prout Hedwig delineavit, conicum sed reapse ut in *H. tamar.* rostratum. Procul omni dubio itaque posthac *HH. recogn.* et *tamarisc.* Hedw. unam tantum speciem sistunt!

*) Licet non splendentia folia papillosam dorsi naturam prodere videantur, tamen et summis microscopii compositi lentibus revera nullae papillae assequendae. Valde visibiles sunt in pensylv. *H. delicat.*

iterum simillimum africanum *H. gratum* Belv., jam foliorum vero forma distinctum ab *HH. tamarisc. . delicat. pensylv. et minut.* Folia enim non sunt ex cordata basi acuminata, certe non in ramulis, sed *cordato - triangularia, obtusiuscula*. Laevia quoque omnia vel summis augmentis videntur, ut *H. minutuli*. Praeprimis autem ab omnibus tribus Hedwigii speciebus Belvisiana differt *seta scabra*! Operculum caeterum et huic ex *Belv.* rostratum. — *H. protensum* Mich. bor. am. (non confundendum cum *H. protenso* Brid.), quidem nondum vidimus, sed et hoc ab *H. tamarisc.* vere diversum vix putamus. Demum triviale *H. proliferi* L. nomen pro nostro non recepimus, cum eo mox *H. splend. H.*, mox *H. tamarisc.*, et contra mox hoc, mox illud nomine *H. parietini* ab auctt. insignitum sit.

62. *H. praelongum* L., foliis laxis, patentibus, l. patentibus - divergentibus, cordato - acuminatis, margine subreflexis, serrulatis, nervo sub acumine evanescente; seta scabra; sporangio cernuo; operc. rostrato. *Dillen.* t. 35. f. 15. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 29. *Sturm.* 2. (mala.) *Turn.* *hib.* t. 15. f. 2. (*H. Stokesii* Smith.),

t. 14. ff. 1. 2. (H. *Swartzii* α . et β . minus.)

Ad arbb., rup., in terra. Vere. 4.

Valde polymorphum, ramificatione praeprimis mire ludens. Folia in trunco et ramis basi cordata, in ramulis ovata, et tunc fig. 5. Hedw. similia. H. *Stokes*. Smith., postquam in germ. specim. (H. *Ludwigii* Brid. mst. — e *Siles.*), operc., quod Angli non viderant, observavimus, nec levissimis essentialibus notis differens invenimus. Folior. fig., directio, serraturae, nervus, seta ac operc. prorsus eadem; nec bene *Turn.* magis affine censere videtur H. *umbrato*, cui seta laevis, operc. conic. Ab H. *tamarisc.* foliis dorso laevibus (et quodammodo splendent.), nec non seta statim dignoscendum. — H. *Swartzii* *Turn.* (*atrovirens* Sw. suec., excll. synn.) foliis laxius dispositis, colore laetiori, solummodo differt, nec ullis essentialibus specie discernere possumus. Praeter holmensia cum ipso Swartz lecta, specim. etiam habemus (utriusque var.) ab ipso *Turn.* Demum nec H. *praelong.* β . *abbreviat* *Turn.* hib. (*Dill.* fig. cit. B.), quam ex litt. *Turn.* *Dicksonus* propriam speciem censet, distinguere valemus, quantum ex sterilibus solummodo nobis missis exemplis.

c. binerviis l. subnerviis. *)

63. *H. umbratum* Ehrh., foliis cordato - triangulo - brevi acuminatis, margine plica reflexis, serratis, subbinerviis; operc. conico. *Hedw. Specc.* t. 67. ff. 10-13.

Ehrh. Decc. n. 66.

In sylv. umbr. alpp. ad terr. (*Herc.*, *Siles.* etc.) Vere. 24.

Folia ab *Hedw.* circumscriptione et margine bene delineata, caeterum maxima trunci saepe uninnervia, nervo evanescente, superne 2 - 3 - fido, plurima tamen binervia (quaedam quoque subnervia videntur.) Semper distinctissima species, ab *HH. tamarisc.*, *prael.* et *splend.* operc. conico, a primo quoque foliis dorso laevibus, ab altero seta laevi, ab ultimo foliorum acumine facillime distinguenda. Tamen *H. splend.* saepe pro nostro sumtum vidimus, ex. gr. ab *Host.*; cui forte confusio- ni ipse *Hedw.* ansam praebuit, *H. splend.* folia integerrima adtribuens.

64. *H. splendens* Hedw., foliis ovato - longius acuminatis, margine

*) *Seta* in tota subdivisione *laevis*.

versus acumen undulatis, serratis, mediotenus binerviis; operc. rostrato.

Dillen. t. 35. f. 13. *Hedw. Specc.* t. 67. ff. 6 - 9. *Engl. Bot.* t. 1424.

Sturm. 2. (*H. pariet.* — mala.)

H. pariet. Sw. et plurim. recentt., *prolif.* Ehrh., Willd.

In sylv. ad terr. Vere. 4.

Pestifera nomen triviale. *HH. prolif.* et *pariet.* inter hoc et *H. tamarisc.* confusio; v. ad ultimum jam Adm. Fide *Smith.* in herb. Linn. pro *H. ejus pariet.* adest *H. Schreberi*, et in Opp. suis utrumque Linnaeus confudit! — Fig. *Hedw.* nostri iusta, praeter quod nervos et serraturas folii neglexerit. — Nitore hoc, opacitate *H. tamarisc.*, quae saepe promiscue crescunt in sylvis, statim dignoscenda.

65. *H. cuspidatum* L., foliis laxis, patentibus, anguste ovato-acuminulatis, acuminulo acuto, margine superne reflexis, integerrimis, basi obsoletissime binerviis, supremis ramorum in cuspidem convolutis; operc. conico, acuto. *Dillen.* t. 39. f. 34. *Engl. Bot.* t. 1425.

In pascuis humidis. Vere. 4.

Cf. Adnn. ad *H. cordif.* supra. — Surculi subcompressi.

66. *H. Schreberi* Willd., foliis arcte imbricatis, erecto - patentibus, late ovato - acuminulatis, acuminulo obtuso, margine inferne plica reflexis, superne inflexis, integerrimis, basi binerviis; operc. conico, acuto. *Dillen.* t. 40. f. 47.

Willd. berol., *H. compress.* Schreb. (non L.), *muticum* Sw., *purum* Ehrh. Decc. n. 311.

In sylv. Vere. 24.

Surculi subcompressi. — *H. puro* habitu simillimum, characteribus distinctissimum, *H. cusp.* habitu dissimillimum, characteribus proximum. „Pro *H. cuspidati* varietate habuerunt Weissius et alii; ab hoc autem colore stramineo, siccitate magis splendente, foliis obtusiusculis appressis, extremis nunquam convolutis, dignoscitur” ita egregie habet *Turn.*, ut, quod addamus, non videmus.

67. *H. molle* Dicks., foliis laxè imbricatis, ovato - subrotundis, obtusiusculis, concavissimis, margine planis, integerrimis, ad $\frac{1}{3}$ usque binerviis; operc. conico, obtuso. *Dicks.* t. 5.

f. 8. (mala, praeprimis nervo singulo
excurrente fol. sistens.) *Hedw. Specc.*
t. 70. ff. 7 - 10.

H. rupestre Schleich. Cent. 2. n. 47.

In comit. *Glatz.*, *Siles.*, in rup. madid., ad
rip. fluvior. 24.

Folia male enervia exhibent *Brid.*, *Hedw.*,
Smith. — Postquam in helveticis exemplis, cum
Dicksonianis et Silesiacis ad amussim congruenti-
bus; operculum, quod nec unquam Angli, nec
hucusque nostrates viderunt, exacte tale esse com-
perimus, ac in *H. alpestre* Sw. Disp. (*riivulave*
Act. holm.) *Hedw.* depinxit (*Specc.* t. 64.), nulli
fere porro dubii sumus de identitate Dicksoniani
musci ac Swartziani. Fig. Swartz. in Disp. t. VI.
15. vix justa, nec rectius sane enervia Swartz,
quam mediotenus uninervia *Hedw.* folia fecit.
Sunt ut in *H. molli* genuino ad $1/3$ usque binervia,
forma quoque cum illa exacte convenientia. Solum-
modo Swartziana exempla differunt, quod folia pa-
rum, uti videtur, longiora, quodque stirps, pro-
cul dubio quia in locis humidiorr. crescebat, ma-
gis stygium habitum aemuletur. — Suam speciem
Swartz cum *H. scorp.* comparat, cui sane affinis,
foliis non circinall. et basi evidenter 2-nerviis prae-
ter staturam dissimillimam distinguenda. — Ne
quoque cum *H. palustri* L. nostrum confundas cave.

* 68. *H. rufescens* Dicks., foliis erecto-patentibus, subulatis, integerrimis, basi obsolete binerviis, striatis; sporang. subaequali; operc. conico. *Dicks. t. 8. f. 4.*

In rupp. udis *Germ. infer. 24.* (Specimm. germm. certe uspiam vidimus, non meminimus ubi. In *Helv.* satis frequens stirps nec raro fructif.)

Cur in suam subdivis. „*Capsulis erectis*” (aequalibus, ex terminologia Hedw.) *Smith* non receperit, vix capimus. — Habitu stirps *H. nit.* proxima, aliena ab omnibus cohortis hujus nostrae.

69. *H. incurvatum* Schrad., foliis lanceolato-subulatis, margine subreflexis, integerrimis, basi obsoletissime binerviis; sporang. obovato, cernuo, operc. conico-acuminato s. subrostrato.

Schrad. Samml.

Ad rup. *Herc.* Schrad.; e duc. *megap.* nuperime mis. *Bland. Aestate. 24.*

Stirps adhuc parum nota, bene distincta species omnino censenda. Ab insequente enim *H. Siles.* multo magis differt, quam verbis facile exprimendum, et ab *H. palustri* L., quocum *Brid.* compa-

rat, toto habitu (qui nostro Hypnorum repentium, minorum), nec non characteribus, imprimis *operc.* alienissima. — Folia laxa, inferiora undique patentia, suprema homomalla, non enervia, quod perhibuit auct., cuius caeterum verba integra asseramus: „*H. incurvatum*, surculo repente: ramis pinnatis decumbentibus apice incurvatis, foliis lanceolatis concavis acutis enerviis, capsulis ovatis cernuis: operculo rostrato. — Surculi elongati, inaequaliter pinnati; rami simplices vel subdivisi. Folia integerrima, saepius heteromalla. Operculum brevirostrum”.

70. *H. Silesianum* Pal. de Beauv., foliis laxis, lanceolato-subulatis, margine planis, serrulatis, basi obsolete binerviis, patentissimis, supremis subhomomallis; sporang. subcylindraco, subcernuo; operc. conico, brevi.

Lesk. Seligeri Brid.

In *Siles.* Selig.; m. *pinif.* Franc. Funck. 24.

Annulus praesens. Ut *Hypn.* sit, jam in *Arch. f. d. syst. Naturg.* l. 1. p. 191. t. 5. f. 2. comprobavimus. Habitus fere insequentis speciei.

* 71. *H. pulchellum* Dicks., foliis ovato-lanceolato-acuminatis, integerrimis, basi obsoletissime binerviis, pa-

lentibus, supremis subhomomallis;
sporang. obovato, subcernuo; operc.
conico, brevi. *Dicks. t. 5. f. 6.* (fol.
c. pessume.) *Hedw. Specc. t. 55. ff.*
7-12. (*Lesk. pulch.*)

Lesk. nitida Wahlenb. mst. olim.

In sylv. 24. E *Siles.* miserunt Starke et Selig.

Annulus praesens. Processus perist. int. majores cum dentt. per. ext. alternantes carinati, subperforati; interjecti minores filiff. tenuissimi, singuli l. bini. — H. *Siles.* quidem proxima, sed certo certius distincta species. Totus habitus diversus. Magnitudo duplo minor. Sporang. quoque multo brevius, foliorum forma, margo integerrimus et nervorum vix unquam acquirenda vestigia bene distinguunt. — Silesiaca exempla per aliquot annos jam habuimus sub nomine *Lesk. pulchellae* transmissa. Holmiae cum Swartz. ea communicavimus, et jam tum bene observavit egregius ille amicus, comparanda ea esse cum *Lesk. nitida* amiciss. Wahlenb. e *Lappon.* relata. Dein germanicam plantam non *Leskiam* esse, sed *Hypn.* comperimus. Denuo a nostro Swartz. inquisivimus, num H. *pulchellum* Dicks. s. *Lesk. pulch.* Hedw. ei nota sit, et rescripsit: „est, uti suspicati estis, ipsissima *Lesk. nitida* Wahl.” Nunc demum Wahlenbergianae stirpis peristemium examinavimus

et exacte tale esse invenimus, quale in Silesiaca planta supra descripsimus, ergo veri *Hypni*! Ad amussim itaque congruentes jam olim videntes hancce Wahlenbergianam Lesk. *nitid.* cum Hedwigii Lesk. suae *pulch.* icone et descr., nil amplius de ambarum identitate dubitavimus; et iterum iterumque Silesiaca nostra exempla cum Wahlenbergianis quod ad omnes partes conferentes, nec levissimum etiam inter haec discrimen reperivimus. Certo certius itaque *H. pulch.* anglic., Lesk. *pulch.* Siles. et *L. nitida* Wahl. una eademque stirps! Revera ita difficiliter minores processus filiff. perist. int. observandi, ut vel tales viros, quales *Wahlenb.* et *Hedw.*, effingere potuerint. Monendum quoque, non ea magnitudine nec ea ratione, quibus in *Stirpp.* solebat, Lesk. suae *pulch.* perist. int. Hedwigium delineasse. — Sed vix juste speciem inter eas „*Capsulis erectis*” (aequalibus *Hedw.*) posuerunt *Turn.* et *Smith.* — Stirpem, qua vix ulla alia ei dissimilior in Cent. 5. n. 26. pro nostra dedit *Schleich.*, sed pro more absque fructu, ut ejus determinatione facile supersedeamus.

72. *H. sylvaticum* Huds., foliis oblique *) lanceolato-acuminatis, in-

*) Folia inaequilatera s. *pterygoidea* Hedw.

tegerrimis, basi binerviis, anticis et posticis appressis, lateralibus patentibus; sporang. erecto-cernuo; operc. conico. *Dillen.* t. 34. ff. 5. (H. *denticul.* Auctt.) et 6. (H. *sylvat.* Auctt.) *Hedw. Stirpp.* IV. t. 31. (H. *dentic.* Auctt.) *Engl. Bot.* t. 1260. (H. *dent.* Auctt.) *Turn. hib.* t. 12. f. 1. (H. *sylv.* Auctt.) *Brid. musc.* II. 2. t. 1, f. 5. (H. *sylv.* Auctt.)

H. *denticul.* L. (absque fere dubio, tamen Hudson. nomine, uti certiore, a nobis retento), H. *contextum* Schleich. Cent. 3. n. 49.

In sylv. ad radd. arbb., locis humidiuscc. Vere. 4.

Conveniunt tandem quoque Angli (cum *Hedw.*, *Schrad.*, aliis), ut HH. *denticul.* L. et *sylv.* Huds. (Dill. 5. et 6.) specie minime discrepent; sane recte. Hoc non simplex, sed ramosum, nec basi, sed medio fructif. solummodo discernitur. Figurae *Hedw.* optima, sva jam geminos folii basi nervos exhibente! — H. *denticul.* Web. Spic. ex ipsius herb. revera H. *dent.* Hedw., ut exinde dubia tollenda Hedwigii in Specc. Muscc. p. 239. expressa: H. *serrulatum* Hedw. toto coelo distinctissima species, foliis non pterygoideis sed aequilateris gaudens.

H. dentic. 7. obtusifol. Turn. hib. t. 12. f. 8. quidem nondum vidimus, sed ex fig. et descript. certe non huj. loci esse videtur. Folia ovata, obtusa, mediotenus uninervia, undique circa surculum imbricata exhibentur! Pace quoque tanti viri, vix ex Turneri effato *patagon.* Dillenii *Hypn.* t. 34. f. 9. (*H. ornithopodioid.* L.); quod in herb. Dill. fructu omnino carere dicitur, et cujus duo specimm. A. et B. jam olim Dillen. forte diversa censuit, *H. sylvatici* synonym. putaremus.

73. *H. lucens* L., foliis oblique ovatis, obtusis, integerrimis, subnerviis, anticis et posticis appressis, lateralibus patentibus, operc. rostrato. *Dillen.* t. 34. f. 10.

In udis sylvos. subalpestr. Vere. 24.

Folia pterygoidea s. inaequilatera, more eorum in *Sphagnis* obviorum reticulata. Vix in quibusdam basi gemellorum nervorum omnium obsoletissima vestigia arripienda. Calyptra ut in *Trichostst.* nostris. Sporang. aequale, nutans. *)

*) Angli certe Hedwigii phrases male intellexerunt, sporangium (aequale s. aequilaterum) *nutans* et sporang. *cernuum* Hedw. semper confundentes, ut hanc quoque speciem inter

Operculi rostrum rectum. Perist. int. membrana-
ceo-laciniatum, laciniis 16 majoribus, carinatis,
perforatis, cum dentt. perist. ext. alternantibus,
interjectis minorr. singulis binisve filiformm. Est
itaque ex peristomio bonum *Hypnum*; nec ca-
pimus, quid sibi velit *Smith* dicens: „perist. inter.
membranaceum, plicatum, retusum, integrum,
margine denticulatum”, et addens: „ad normam
Hedwigii novum genus ex hac specie formari po-
tuerit, quod habitus confirmaverit.” Certe habi-
tus, quod dicitur, sui generis et ex calyptra quo-
que *mitraeformi*, jam a *Dillen.* observata, cum
pluribus aliis speciebus forte posthac nostra sepa-
randa a genere vastissimo, difficillimo.

74. *H. undulatum* L., foliis ova-
tis, acutis, superne transversim pli-
catis, basi binerviis, anticis et post-
cis appressis, lateralibus patentibus;
operc. brevirostro. *Dillen.* t. 36. f. 11.
Engl. Bot. t. 1181.

In sylv. subalpestrium ad terr. Vere. 24.

Surculi compressi, splendentes. Folia margine

eas „capss. cernuis” ponant. Sed, mirum!
ipse *Schwaegrichen* eandem confusionem susti-
net. V. *Hedw. Spec.*

plana, subintegerrima. Sporang. cernuum, sulcatum. Annulus praesens. Perist. ext. dentes linea longitudinali medio notati, inter. process. majores carinati, perforati, interjecti minores bini filif.

Huj. subdivis. *Hypn.* videtur *Jungerm. setacea* Web. Spic., ex ipsius herb., fructu vero carens. Folia non gemina, quod auctor habet, sed laxius disposita, subpatentia, subulata, enervia omnino visa, integerrima. *Jungermannia* nullo modo est. Vix unquam teneriorem speciem vidimus.

†† foliis anacampylis s. recurvis. *)

a. uninerviis, nervo evanescente.

* 75. *H. chrysophyllum* Brid., foliis e cordata basi longe tenueque subulatis, subintegerrimis, nervo superne evanescente. *Brid. musc.* II. 2. t. 2. f. 2. (fol. fig. a. certe pessima.)

In Siles. Mis. Starke. Aestate. 24.

Helvetica nostra ab ipso Brid. et a Funckio specimina cum Starkianis prorsus congruunt. Non

*) In omnibus huj. subdivisionis speciebus *seta laevis*, operculum conicum.

solum habitus, sed et singulae musci partes prorsus eadem, ac in *H. stell.* Sed nervus distinctissimus, singulus, supra medium egrediens optimam praebet notam diagnosticam.

b. binerviis l. subnerviis.

76. *H. stellatum* Schreb., foliis laxis, e cordata basi longissime tenuissimaeque subulatis, margine inferne subreflexis, integerrimis, basi obsoletissime binerviis; sporangio subcylindraceo, cernuo, erecto. *Dillen* t. 39. f. 35. *Dicks.* t. 1. f. 7. (mala.) *Brid. musc.* II. 2. t. 6. f. 2. (mala), t. 2. f. 3. (*H. protensum*—mala.) *Hedw. Specc.* t. 66. (*H. polymorphum*.)

Schreb. lips.

In humidiusculis sylv., palustribus. Vere, aestate. 4.

Folia enervia quidem dicta, tum in genuino *H. stell.*, tum in speciebus, quas ei associavimus, quod scimus ad omnibus auctt., praeter *Brid.*, qui „ductulorum fasciculo tenuissimo instructa” in *H. stell.* nuncupat. Revera basi obsoletissime binervia, nervorum vestigiis illis statim evanescentibus et interdum vix visibilibus, ut vel subnervia di-

cenda. — *H. protens*. Brid. optime jam sagaciss. *Schrad.* in *Diar. bot.* 1801 I. p. 201. nimis affine *H. stellato* censet. Ab ipso Brid. accepimus (aliaque multa exempla, v. gr. pro *squarrosi* forte var., novo tamen habito ab Hedw. patre a *Stark.*, pro *H. chrysoph.* Brid. a Spreng. ei misso a Swartz.), nec l. levissimum discrimen essenziale invenire potuimus. (Ab *H. squarr.*, quocum Brid. comparat, longe sane alienissimum.) — *H. polym.* *H.* ab ipso acceptos ramulos benigne noster Swartz communicavit, et prorsus identicos eos vidimus cum Bridelianis exemplis *H. sui prot.* (Fig. fol. Hedw. b. satis quoque bona, sed basi parum nimis angusta nervorumque rudimentis carens.) Sed mirandum! Ab ipso *Wulfen.*, *Mertens* noster specimina complura accepit pro *H. polym.*, quae nil nisi *H. sylvat.* Huds.; et „nuperrime in *Angl.* lect. *H. polym.*” misit amiciss. *Turn.*, cui evidentissimus *nervus singulus excurrentis*, quodque *H. serp.* quidem simile, tamen diversum nobis videtur. — Num *H. protens.* *Turn.* hib. verum?

β. minus. *Brid. musc.* II. 2. t. 4. f. 2. (*H. squarrosulum* — pess. fol. fig. a.)

In sylv.

Nec hoc, quod quoque ab ipso auct. habemus, ac *Goett.* copiose olim cum *Schrad.* legimus (vidimus etiam sub nomine „*H. ambigu* Botanicis *Goet-*

tingenss."), ullis aliis notis, nisi omnium partium duplo minore mole, distinguere valemus. Sporangii forma certe non alia ac in *H. prot.* Brid. et genuino *H. stell.*, contra Brid. in *Musc.* p. 150. — Operculum vero nondum visum. — Ab *H. squarr.* onge distinctissimum.

77. *H. Halleri* Sw., foliis arcte imbricatis, cordato-acuminatis, margine plica reflexis, subserrulatis, basi binerviis; sporangio subcylindracco, cernuo, erecto. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 21.

Linn. fil. et Swartz. Meth.

In rupp. madid. alpestrium, *Salisb.*, *Carinth.*, *Austr.*, *Bavar.* etc. Vere. 24.

Caules decumbentes. Rami erecti, breves, subsimplices. Habitu multoties distinctius ab *H. stell.*, quam e charactt. forte apparebit. Folia arcte imbricata, nec laxè disposita, multo breviora, subserrulata, non quasi geniculo medio reflexa, sed linea spirali a basi ad apicem recurvata, acuminibus non horsum vorsum flexis, statim tamen distinguunt. Ramulorum cum foliis suis recurvatis fere habitus ut *H. Paludellae*. — Folia male prorsus enervia hucdum dicta.

78. *H. squarrosus* L., foliis
laxis, e cordata amplexante basi lon-
gissime subulatis, subserrulatis, basi
obsolete binerviis; sporangio ovato-
subgloboso, cernuo, nutante. *Dillen.*
t. 39. ff. 38, 39.

In humidiuscc. sylvv. Vere. 24.

Nec Angli *Dill.* t. 39. f. 39., nisi minoris var.
lege, distinguunt, uti jam olim ab aliis musculo-
gis factum est. Citat quoque Cel. Smith ad hanc
var. *minorem*: *Ehrh. Decc.* n. 36., quod sane nec
levissimis a communi *H. squarr.* differt.

79. *H. loreum* L., foliis lanceo-
lato-subulatis, serrulatis, basi biner-
viis, inferioribus recurvis, supremis
subhomomallis; sporang. ovato-sub-
globoso, cernuo, nutante. *Dillen* t.
39. f. 40.

In montosis sylvatt. Vere. 24. (ex *Hispan.*
quoque accepimus.)

Male folior. serraturas contra Brid. denegat
Turn. Distinctissimum foliorum forma, summo-
rum directione a praeced., quo etiam duplo ma-
jus, ut injuste olim in *Spic.* ambas stirpes con-
junxerit *Web.*

80. *H. triquetrum* L., foliis cordato-triangularibus, acutis subacuminatisve, serratis, mediotenus binerviis; sporangio ovato-subgloboso, cernuo, nutante. *Dillen.* t. 38. f. 28.

In sylvis vulg. Vere. 24.

β. minus, duplo minus, tenerius, foliis acuminatis.

H. brevirostrum Ehrh. Decc. n. 85.

In sylv. ad saxa et arbb. Vere. 24.

Male, jam *Roth.* adnotante, *Hoffmann* conjunxit *HH. longir.* et *brevir.* Ehrh.; sed magis infelici sane ave, praeunte *Brid.*, *Smith* ultimum associavit *H. rutab.* Ab utraque dicta specie *H. brevir.*, quod parum adhuc exteris notum videtur, foliis mediotenus bi-, nec uniperviis, distinctissimum, ab *H. longir.* praeterea operc. conico, nec rostrato, ab *H. rutab.* seta laevi, nec scabra. Perperam enim „ad lentem tuberculis exasperatas setas” et nostro *Roth.* adcribit. Memorabile tamen est, ipsum sagaciss. Ehrhartum olim (certe longe antequam *Decades* evulgaret) suum hunc muscum pro *H. rutab.* dedisse, quod specimen in herb. nostro comprobat. — Num vero ipsi recte fecerimus, *H. brevir.* var. lege subjungentes *H. triquetr.* admodum dubii haeremus. Plantae ha-

bitu longe dissimillimae, ut lubentius eas distinctas proposuissimus. Folia vero, seta, sporang. et operc. ita omnibus convenientia, ut vix rite ex hisce duae species secernantur. — Magis tamen acuminata videntur *H. brevior.* folia et versus acumen margine undulata sunt. Hoc vero quoque valet de superioribus *H. triq.* foliis. Operc. quoque quasi brevissime rostratum (tamen conicum dicendum) in *H. brevior.*, obtuse conic. in *H. triq.* Gaudemus igitur, ut in tanta rerum ambiguitate certe e nostris partibus habeamus acrem *Turn.* Var. enim *H. triquetri*, cujus in musc. hib. p. 187. mentionem fecit vir amiciss. „in arenosis lecta, caule plus duplo brevior et graciliore, ramisque confertis insignis“, ex specim. transmissis omnino nostrum *H. brevior.* est. — Litem dijudicent peritiores.

††† foliis circinalibus *)

a. uniuersis, nervo excurrente.

81. *H. filicinum* Hedw., foliis cordato-acuminatis, serrulatis. *Dillen.*

*) In omnibus huj. subdivis. speciebus seta laevis, et, excepto *H. cupressif.* cum affinn. *H. nigrovir.* D. ac *Lesk. plum.* Sw., etiam operc. conicum.

t. 36. f. 19. A. E. F.? *Hedw. Stirpp.*
IV. t. 26. ff. A. B., *Specc.* t. 76. ff.
5-10.

H. filic. L., fide Anglor., *extricatum* Hoffm.,
dubium Schleich. Cent. 2. n. 45., *glareosum*
Schleich. Cent. 4. n. 30., *Seligeri* Schleich. Cent.
4. n. 29.

In palustribus. Vere. 24.

Stirps a sequente foliorum nervo excurrente,
reliqua ut taceamus, distinctissima. Folia satis be-
ne Hedw. delineavit, tum in *Stirpp.*, tum in *Specc.*,
sed acumen justo parum brevius fecit, et levissi-
mas quidem serraturas omisit. — Ex *Smith.* et
Turn. huj. l. *Dill.* figg. citt., quae vetustioribus
botanicis (his una cum B-D.), immo ipso nostro
Hedw. magis quadrare videbantur cum *H. Crista*
castr., quod sec. Angl. in *Dillen.* op. plane non
occurrit. Cf. ad seq. speciem Adnn. — *H. filic.*
var. *pendula* Schultz. starg. ex specimm. ab ipso
certe ad nostrum pertinet. Parum habitu, vix
character., diversa, sed sterilia, exempla *Bland.*
misit, monens, sibi et *Brid.* distinctae speciei (*H.*
penduli) videri.

b. uninerviis, nervo evanescente.

82. *H. commutatum* Hedw.,
foliis e cordata basi longe acuminatis,

marginē plica reflexis, serrulatis. *Dillen.* t. 36. f. 19. B - D. ? *Hedw.*
Stirpp. IV. t. 26.

HH. *commut.* et *affine* Hoffm. Fl., *dubium* et
diastrophyll. Sw. *suec.*, *commut.* Schleich. Cent.
2. n. 43. et *filic.* Ejusd. Cent. 4. n. 31.

In palustribus. Aestate. 24.

Habitus filicoideus, quo in sua cohorte facile
dignoscitur et accedit H. anteced. *filic.* et HH.
Cristae castr. et *mollusco.* Serraturas Hedw. quidem
neglexit, caeterum folia bene delineavit. — Fide
Turn. et *Smith.* huc referendae *Dill.* figg. citt.,
quas Hedw. sui H. *filic.* censuerat, sane melius
ex habitu figurarum, cum potius A. E. F., ab
Anglis ad H. *filic.* laudd., huic respondere videan-
tur. Num denno Angli HH. *filic.* et *commut.* con-
funderint cum *Turn.* sub illo Swartzii HH. *dub.* et
diastroph. alleget, quae ipso auct. et Schrad. ex
specimm. testibus, omnino ad hoc pertinent? —
Ex differentia, quam Hoffm. desumtam ab Hedw.
tradit sua inter HH. *commut.* et *affine*, ultimum
pro *filic.* Hedw. sumendum esset; est vero sec.
specim. nil nisi ipsissimum *commut.* — An demum
ad nostrum pertineant quoque *Hedw.* *Stirpp.* IV.
t. 22. folia sub a. b., cum Swartz. ea alleget ad suum
H. *diastroph.*? — Sub nomine „H. *diastroph.* Bri-
delio nov.” etiam nostrum sterile accepimus a Bland.

83. *H. uncinatum* Hedw., foliis e latiuscula basi longissime subulatis, uncinatis, plicis pluribus longitudinalibus notatis, serrulatis, nervo versus apicem evanescente. *Hedw. Stirpp. IV. t. 25.*

In montos. udis. Aestate. 2l.

Distinctissimum longissimis et ad basin usque recurvis, striatis et serrulatis foliis tum ab *H. adunco*, tum ab *H. cupress.*, a quo ultimo quoque nervo singulo evidenti et operculo differt.

84. *H. fluitans* L., foliis elongatissime subulatis, concaviusculis, margine planis, serrulatis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanescente, inferioribus subdivergentibus, supremis homomallis. *Dillen. t. 38. f. 33. Hedw. Stirpp. IV. t. 36.*

In aquis. Aestate. 2l.

Folia dissita, praeter suprema undique subdivergentia, suprema erecta, homomalla, quasi cuspidem formantia (rami tamen acuti). — Foliis subulatis, elongatioribus, serrulatis (satis evidenter toto margine! — licet figg. Hedw. integerrima sistant), inferiorr. non falcatis et homomallis, su-

premis in cuspidem, acutiusculum tamen, convolutis ab *H. adunco* β . differt. Cur cum *H. cordif*, nec cum *adunco* Angli seponant, non capimus. — Swartz in Disp. tum ad *H. adunc.*, tum ad *H. fluit.* Hedwigii *adunc.* citat, et insimul ad *fluit.* suum quoque *fluit.* Hedw. Certe apud *fluit.* ex errore quoque *aduncum* *H.* laudatum.

* 85. *H.?* *falcatum* Brid., foliis lanceolato-subulatis, homomallis, margine subplanis, subintegerrimis, nervo superne evanescente. *Brid. musc.* II. 2. t. 1. f. 6.

In alpp. *Carinth.* Schwaegr. 24.

Aegerrime speciem inter nostras recipimus, cum sane nullum adferat utilitatem, dubiis et vexatis speciebus numerum praesertim palustrium muscorum tot tantumque ludentium adaugere; tamen eam prorsus omittere vix licitum putavimus. Fructus nec unquam visus, itaque genus incertum. Foliorum forma, nervus, margo prorsus ut in *H. adunco*; solummodo magis in *H. adunco* folia falcata (tamen magis in nostro reapse quoque folia falcata, quam Brid. ic. exprimit), et nostro habitus luridus. Ex hoc facies externa longe alia ac in *H. adunco*. Tamen ei maximopere affinis species, nunquam confundenda cum *H. filic.*, quocum

Brid. comparat (H. enim *dub.* Brid., teste *Schrad.* in *Diar.* 1801. 1. p. 200., ad hocce referendum). Jam ipso nervo ante apicem evanescente (non excurrente, quod Brid. vult), foliorum formam ut taceamus, facile distinguitur. A consimilibus quoque aliorum generum speciebus, v. gr. *Gymn. aquat.*, *Trichost. fontin.* et *Font. falcata* tum forma foliorum, tum nervo evanescente margineque subintegerrimo longissime differt.

86. *H. aduncum* L., foliis laxis, lanceolato - subulatis, sulcatis, margine subplanis, subintegerrimis, nervo ad $\frac{2}{3}$ evanescente, omnibus falcatis. *Dillen.* t. 37. f. 26. *Swartz. suec.* t. 7. f. 14. (*H. revolvens.*)

H. adunc. α . *Turn. bib.*, *ambiguum* *Schrad.* *mst.*, *flavescens* *Schleich.* *Cent.* 4. n. 34. (s. fr.)

In paludos.. Aestate. 24.

Suum *H. adunc.* α . *Cel. Turn.* misit, admonens forte esse distinctum ab *Hedwig.* stirpe. Non tamen quibusdam essentialibus differentem videmus; cf. mox *Adnn.* ad var. β . — *Swartzii* *H. revolu.* tum ab ipso, tum e *Germ.* accepimus a *Schrad.*, *Stark.*, *Bland.*, *Schwæegr.*; etiam *Upsal.* ipsi legimus. Sed nullo modo ab *H. ad.* α . *Turn.* distinguere valemus; et forte *Swartz* commotas, ut

propriam speciem effingeret, quia solummodo *H. adunc.* β . Turn. pro genuino *H. ad.* habuerit. Hocce enim, uti Turnero, sic et nobis olim misit pro suo *H. ad.* In suspicionem Turneri, scil. de *H. revolv.* cum *H. ad.* conjungendo, itaque certi abimus. Swartz tum folia, tum sporang. suae stirpis minus juste descripsit, immo de hoc et illis contraria habens in Diagn. et Descr. — Nec quomodo vel *H. ambig.* Schrad. mst., in paludd. *des Leesumer Moors* pr. *Brem.* copiose lect. ab amm. *Rohd.* et *Trevir. jun.*, l. *H. flavesc.* Schleich. a nostro discernamus, videmus. Illi habitus stygius, qui quoque *H. revolv.*, hoc laete viride, et eo magis inter veras species omittendum, cum etiam fructus adhuc desit. *H. adunco* genuino color mox laetius viridis, mox in stygium magis vergens, prout loci natalis differentia efficit. Foliorum forma, nervus, margo sane prorsus eadem in *HH. ad.* genuino, *revolv.*, *amb.*, *flavesc.*

β . *tenuis* Turn., caule graciliori, elongato; foliis dissitioribus, longioribus, minus falcatis. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 24. (*H. adunc.*)

H. adunc. Swartz. suec., *longisetum* Schleich. Cent. 4. n. 33.

In aquosis.

Non aliter differt ab α ., quam in charact. adjuncto diximus. — Ab *H. fluit.* distinguitur, quod folia tamen omnia falcata et subintegerrima. —

Suam plantam Hedwigii *H. adunc.* esse jam ipse Schleich., bene hac vice, suspicabatur.

87. *H. rugosum* L., foliis imbricatis, late lanceolato-subulatis, canaliculatis, margine subplanis, subintegerrimis, nervo ad summum apicem evanescente, omnibus falcatis. *Dillen.* t. 37. f. 24.

H. rugos. Turn. hib. sub *H. scorp.* p. 188., Smith., *scorpioid.* Schultz. starg.

In paludd. sylvv. duc. *megap. starg.* „pr. *Neobrand.* auf der Kuhweide im Brüderbruch et ad pag. *Eichhorst* auf der Pfarrwiese, frequens. Jul.” *Schultz.* 24. (certe plurr. locis vulgare, cum *H. scorp.* commutatum.

Stirps omnino faciem aemulans *H. scorp.*, bene mon. Turn. „foliis longiorr., apice subulatis,” et, quod addamus, evidentissime uninerviis differens. Characteribus multum convenit cum *H. ad.*, ut verbis difficiliter ab eo distinguatur. Tamen summo opere distinctum est, omnibus partibus duplo majorr., foliis basi latioribus, arctius sibi incumbentt. et aspectu dissimillimo. Totum quantum enim stygio colore imbutum est, apicibus solummodo ramulorum aureo-nitentibus, ut in *H. scorp.* — Ut haec stirps *H. rugos.* verum *Dillen.*

et *Linn.* sit, Anglis fidamus. Certe ex descr. *Diff.* eius figg. A. B. omnino ad *H. rugulos.* nostrum pertinere videntur! Sed et *Sueciae* Botanici forte hoc *H. rugos.* credunt. Swartzii quidem plantam nondum ipsi vidimus; indubie vero eam ad suum *H. rugos.* Smith allegat, et sporangiorum quantum scimus a nullo mortalium in *H. rugul.* observatorum, mentionem Swartz facit. *Wahlenb.* autem pro *H. rugoso* e *Lapp* allata sterilia dedit exempla, procul dubio non omnia eadem, quaedam majora satis bene cum *H. rugoso* Angll. convenientia (solummodo folia parum breviora, nervus parum prius evanescit), minoraque commixta, *H. rugul.* satis similia. Num haec et illa vir amiciss. identica putaverit? — Cl. *Schultz* l. c. laetatus de *H. scorp.* fructif. demum lecto, sane magis laetitia adfectus fuisset, si scivisset, se plantam legisse certe fere omnibus Germaniae muscologis hucdum prorsus ignotam et solummodo suo merito nostrae Florae usque nunc adnumerandam. Sedulo autem ipsi comparavimus anglica ab ipso *Turn.* missa, tamen sterilia, et *Schultziana* nostrae speciei exempla, ut de ambarum stirpium identitate prorsus certi simus.

88. *H.?* *rugulosum* Web. et Mohr., foliis ovato-lanceolatis, falcatis, concavis, margine plica reflexis,

serratis, nervo supra $\frac{1}{2}$ evanescente. *Hedw. Stirpp. IV. t. 23. f. A. (fol. — H. rugosum.)*

H. rugos. Ehrh. Decc. n. 291., Schrad. Spic. et omn. certe German. auctt.

In apricis montos. (quod scimus nunquam fructif. lect.) 24.

Nervus rarius bicranus, saepe flexuosus. Folia praeter serraturas bene ab *Hedw. picta.* — Qui perlegat Dillenii de Hypni sui t. 37. f. 24. praepriis A. et B. verba, an unquam Anglis crederet, dictas figg. non heic, sed ad praecedentem longe diversam speciem pertinere, vix scimus. In montt. apricis etiam suas plantulas Dillenius legisse affirmat, et sane nunquam *H. rugos.* antecedens non paludosum reperietur. Sed, dum oculatior quis ex herb. Dill. litem componat, contrarie agere Anglis noluimus. — Nostro caeterum facie valde simile *H. plicatum* Schleich. Cent. 4. n. 27., „ad rupes in m. la Varaz” fructif. lect. ab auct. Dignoscendum erit: *foliis ovato-lanceolato-longius acuminatis, subhomomallis, margine plica reflexis, striis l. plicis pluribus longitudinalibus notatis, integerrimis, nervo superne evanescente.* Patet exinde, ab *H. rugul.* bonam hanc speciem praepriis differre: 1) foliis in multo longius acumen attenuatis; 2) omnino integerrimis; 3) nervo

multo altius tantum evanescente. Ab *H. rugoso* autem: 1) toto habitu; 2) foliorum forma, plicis pluribus; 3) foliis homomallis quidem, non tamen falcatis — longe diversa est.

89. *H. palustre* L., foliis ovato-acuminatis, homomallis, margine superne inflexis, integerrimis, nervo supra $\frac{1}{2}$ evanescente. *Dillen.* t. 37. f. 27. A., fide *Smith.* *Hedw. Stirpp.* IV. t. 38. (*H. luridum*)

H. lurid. Sw. snec., Schleich. Cent. I. n. 41.; *adnatum* Turn. hib., Smith.

In lignis putrid., sax. udis. Aest. 24.

Habitus luridus. Stirps valde polymorpha, foliorum forma (ab ovato-lanceolata per ovato-acuminatam ad ovali-acuminulatam ludente), directione non semper in omnibus homomalla, margine mox superne inflexo, mox vix l. non, inferne planiusculo l. subreflexo, nervo demum. Hoc quidem prorsus destituta folia declararunt Hedw. et auctt.; reapse tamen rarius basi gemelli nervi adsunt, plerumque singulus, superne, circa medium, evanescens. Utriusque normae folia in uno eodemque ramulo saepe invenienda. Sub omni vero foliorum forma ac ratione directioneque ab *H. murali* nostrum operc. conico facile distin-

guitur. — Dill. t. 37. f. 27. olim tota quanta huc laudabatur. Fide *Smith.* tantum A. huj. l., B. vero ad *Lesk. palud.* pertinet. — De *H. lurido* Sw. suec. *Smith* putare videtur, ne verum nostrum sit, sed *H. fluviat.* Sw. var. Ipse autem Swartz caespites nobis dedit, quos transientis *H. luridi* in *H. fluv.* dixit (v. ad *H. fluv.* supra Adnn.), quorumque certe plurimi surculi revera *H. pal. s. lurid.* genuinum sunt, immixtis plantulis *H. fluviatilis.* Quoque Hedw. in Stirpp. testatur, se suum *H. lurid.* a Swartz accepisse! — Schleicheri planta habitum quodammodo alienum prae se fert, revera tamen nostri synon. Sed non capimus, cur ad hocce suum *H. lurid.* et aequae ad suum *H. subsphaerocarpum* Cent. 2. n. 46. Schleicher citet *Hall.* n. 1738. Ad *H. lurid.* sane Halleri synon. a reliquis laudatur. Diversissima vero stirps videtur Schleicheri *H. subsphaerocarpum*, habitu quidem quoque lurido et satis nostro simili facie gaudens, etiam foliorum generaliori forma, directione et margine, uti ipso sporangio et operculo satis bene cum nostro quadrans, tamen foliis nervo excurrente instructis insigne. *H. adnatum* Turn. hib. foliorum forma quam maxime diversa, mole triplo majori statim diversissimum apparet ab *H. adnato* Hedw. pensylv. Sed vix ac ne vix quidem ab *H. palustri* distinguere valemus. Foliorum sane eadem forma. Sunt oblongo-brevi acu-

minata, margine integerrima; nec semper *H. palustris* folia insigniter homomalla (quod sane in Turneri pusilla planta vix occurrit), jam bene Hedw. adnotante. Enervia quidem Turn. folia dicit, uti ipsius *H. pal.* folia enervia dicta sunt; sed reapse in exemplis Turnerianis, ut in ipsissimo *H. pal.*, mox singulo supra med. evanido, mox bicrano, quoque mediotenus l. ante medium evanescente nervo instructa folia invenimus. Operc. conicum (quod, recte mon. Turn., ab *HH. abbrev.* et *mur.* distinguit) demum idem ac in *H. pal.* — Jam detecto in *H. pal.* folii nervo mediotenus evanido, comparatis Hedwigg. iconn. hujus in Stirpp. et *H. flagellaris* in Specc. t. 73. ff. 1-3., hocce ultimum tandem summopere affine demonstratur nostro *H. pal.* Et revera summopere affine est, foliorum forma generaliori, directione, sporangio et operc. ambobus prorsus iisdem. Tamen diversum censendum videtur foliis in multo longius acumen productis, hoc ipso acumine summis lentibus subserrulato, nervo evidentiori, altius producto. Dignoscendum forte: *foliis lanceolato-longius acuminatis, margine subplanis, subintegerrimis, nervo superne evanescente.* Hocce Hedwigii *H. flagell.*, prout scimus, in Germ. nondum lectum*),

*) Citatur quidem, tum a *Dicks.*, tum ab *Hedw.*: *Dill.* t. 39. f. 42. et *Hypn. stellatum* Web.

Angli nunc *H. alpinum* vocant. Non enim *H. flagell.* Dicks., sterile solummodo hucdum lect., esse dicitur; sed habet *Smith* in Fl. sub *H. alp.* p. 1331.: „hujus exemplaria fructifera cum *H. flagellari* suo, capsulis orbato, legit et confudit Cel. Dicksonus; hinc procul dubio *hallucinatus est* Hedwigius, qui verum *H. flagellare* nunquam vidit” (dicere debuisset *Smith*: „*hallucinatus est* Dicksonus, scil. mittens fructifera *H. alpini* et sterilia *H. flagell.* sui specimina commixta!).

c. binerviis l. subnerviis.

90. *H. Crista castrensis* L., foliis lanceolato-subulatis, plicis pluribus longitudinalibus notatis, serrulatis, basi binerviis. *Hedw. Specc.* t. 76. ff. 1-4.

H. Cr. castr. Ehrh. Decc. n. 6., *filicinum* Hoffm. Fl.

Spic., illud „ad saxa fontium in sylva *Schiffenbergensi* pr. *Giss.* copiose,” hoc in *Hercyn.* rarius observatum. Ambae vero stirpes procul dubio ab *H. alpino* excludendae, et oblivioni prorsus tradendae! *Dillenianae* enim nec in ejus herb. ulla specimina, teste *Smith.*; nec in herb. *Web.* specimina invenimus plantae in *Spicil. descriptae.*

In abiegnis, locis humid. Vere. 24.

Hedw. fig. foliorum satis male sistitit. — Licet e nuperioribus Anglor. effatis vix certi facti simus de *Dill.* t. 36. f. 19., quaenam scil. ejus litt. ad *H. filic.* et quaenam ad *H. commut.* pertineant (cf. supra ad has species Adm.), tamen hoc comperimus, prorsus non ad *H. Cr. castr.* Dillenii stirpem allegandam esse. Nec in *Angl.* hucdum lectus esse dicitur hic apud nos et in *Suec.* minime rarus muscus.

91. *H. molluscum* Hedw., foliis e lata cordata basi longissime subulatis, estriatis, serrulatis, basi obsolete binerviis. *Dillen.* t. 36. f. 20. („vix B.” — *Smith.*) *Hedw. Stirpp.* IV. t. 22.

H. Crista castr. Huds., Hoffm., alior., *H. Halleri* Timm. megap.

In sylv., ad rup. Aestate. 24.

Praecedenti omnibus partibus duplo minus, intensius, nec flavo-, viride. Nervorum gemellorum ad basin vestigia obsoletissima, quae in *H. Cr. castr.* evidentiora. Figg. Hedw. foliorum bonae, tamen serraturas omittentes. *H. Halleri* Timm., quod Hoffmann in Fl. p. 65. sub *H. Hall.* propriam

speciem censere videtur, inde inducens *Bridelium*, ut *H. Timmii* conderet, ex specim. originall. ab am. Bland. benigne transmissis prorsus non a nostro differt, uti jam ante multos annos quoque Schrad. nos edocuit. Sed cur nomen *H. Timmii*, recte caeterum rem habens, elegerit Schultz in Fl. starg., non capimus. — A Selig. Hypnum accepimus sub nomine *serrulati*, ad amussim reliquis omnibus cum nostro congruens, sed nervis basi multo evidentioribus, satis alte productis gaudens. Certo certius non nisi var. censenda.

92. *H. cupressiforme* L., foliis ovato-lanceolato-acuminatis, margine reflexis, subintegerrimis, basi obsoletissime binerviis. *Dillen.* t. 37. f. 23. *Hedw. Stirpp.* IV. t. 23. *Sturm.* 2. (maia.)

H. cupress. et *decipiens* Hoffm. Fl. et Crom. Samml. n. 38. et n. 85.!

In terra, arb., saxis. Vere. 24.

Operc. subrostratum. Annulus adest, quamquam denegatus ab Hedw. — Species summo pere ludens, fucum et versatissimis in hisce faciundi certe apta. — E specim. ab ipso datis jam olim nobis testis fuit Schrad. de *H. decip.* Hoffm. nostri mera var.! En etiam Crom. talem dedit

pro *H. decip.* Sed cur hic ipse in *Hopp. Taschen.* 1805. p. 38. hocce suum *H. decip.* accuratius distinguere ab „*HH. plum., seric. et velut.*” laboret, non capimus. Nonne haecce omnia toto coelo distinctissima? — *H. nigro-viride* Dicks. (*Dill. t. 41. f. 53.*) vix aliter differt ab *H. cupress.*, nisi quod folia minus insigniter homomalla (forma et margo eorum, uti reliquae musci partes, plane eadem!) Bene itaque jam optimus Turn. monet: „Dillenium hunc muscum *H. myosuroidi* proximum collocasse, Hudsonumque pro varietate illius habuisse” (*H. myosuroid* J. Huds.) „sane miror; mihi enim *H. cupressif.* magis affinis videtur, et ne cum ejus stirpis varietatibus commisceatur est cavendum.” *H. mutab.* Brid. distinctissima species; v. Adnn. sub *H. popul.*

β. compressum. Turn. hib. *Dillen t. 36. f. 22.*

H. compress. L., Huds., Sw., Schultz. starg.

Facile optime Turn. verbis subscribimus: „Var. *β.*, quam, nisi pro specie distincta ab auctoribus censeretur, et ut Dillenii iconem, ab Hedwigio perperam ad *H. molluscum* relatam, suo in loco citarem, vix enumerassem, non, nisi colore pallidissimo, caule gracili, magis composite pinnato, capsulaque ovata differre videtur.” Hisce notis bene quadrat *H. compress.* Schultz. ab ipso benigne transmissum, fructu quidem carens, nullo vero modo specifice ab *H. cupress.* distinguendum.

93. *H. scorpioides* L., foliis ovato - subrotundis, acutis, falcatis, concavis, integerrimis, subnerviis. *Dillen.* t. 37. f. 25.

H. erassum Schum. Saell., *fuscum* Schleich. Gent. 4. n. 24., *scorpioid.* Crom. Nachlief. 2. n. 22. c. fr.!

In paludd. turfosis. Aestate. 24. (rarius fructif.)

Species distinctissima, licet forte Diis minoribus inter muscologos fucum fecerit, quod jure monere videtur amiciss. Turn. Sic meminimus, magno gaudio cryptophilum quendam Germaniae a nobis accepisse Upsaliae lecta exempla (quae exacte quadrant cum Turnerianis, Swartzianis nec non HH. *crasso* Schum. et *fusco* Schleich.) asseverans insimul, se haec vera putare. Idem, ni fallimur, cryptophilus publice laudavit fig. *Engl. Bot.* t. 1039. uti egregie sistentem *H. scorp.* Conveniunt autem Smith et Turn., ut mala sit, immo hic ab *H. puro* forte eam esse desumtam suspicans! — Var. autem insignem, sterilem tamen, nostrae speciei Upsal. quoque legimus in *Wittulfsbergsumpf*, in consortio degentem cum genuina stirpe et HH. *cordif.*, *trif.* et *stram.* Folia infima eadem ac in vulgari musco, suprema angusta, basi evidenter binervia!

Hypnorum germanicorum ignoramus:

H. carinatum Scop. carn. ed. 2. n. 1337.;

H. implexum Brid. musc. II. 2. p. 150. t. 4. f. 3.,
absque fr. tantum hucusque lect., caeterum in
Alpp. Germ. minime rarum, teste *Schrad.* in
Diar. bot. 1800. I. p. 203.;

H. chryseon Schwaegr. in *Schult. Reise n. d. Glock-*
ner. II., quod *H. rufescenti* habitu simile dicitur.
Lect. est sec. Schwaegr. „in nivall. rupp. *Austr.*
infer., Breyn, in *Heiligenbluter Tauern* ad
terr., in *Gösnitzalpe*;

H. cirrosum Schwaegr. l. c., „lect. in terra alp.
Brennkogel sine fr.” *H. alpestri* Sw. proximum
dicitur.

Haec omnia non ita descripta, ut inter nostra
recipere ea audere potuerimus.

41. *Diplocomium* Web. et Mohr.
It. suec. p. 177. (*Timmia* Willd.)

Cilia distincta, per paria approximata.

1. *D. longisetum* Web. et Mohr.
Hedw. Stirpp. l. tt. 21. 22. (*Meesia*)
(in Tab. nostra IX. f. 5. perist. pars).

Mnium triquetrum L.

In paludibus. Aestate. 24.

Folia tristicha. Seta longissima.

42. *Meesia* Willden. in Diar. bot.
Schrader. 1799. 2. p. 15.

Cilia distincta, opere reticuloso connexa.

1. *M. uliginosa* Hedw., foliis
obtusis. *Dillen.* t. 49. f. 58. *Hedw.*
Stirpp. l. tt. 1. 2. (in Tab. nostra IX.
f. 4. peristomm. $\frac{1}{4}$.)

Bryum trichodes L.

In uliginosis, turfosis. Aestate. 24.

β . *minor* (Mees. *minor* Brid. musc. II. 3. t. 2.
f. 13. a - d).

Hinc inde in similibus locis cum priori.

Peristom. stirpis internum, si quid vidimus,
male intellexit summ. Hedw., in *Fund.* II. p. 39.

t. 9. f. 57. aequae ac in *Stirpp.* contendens, inter binos dentium perist. exter. bina adesse filamentosa cilia, apice connata, reticulosum opus expandentia. Revera tantum adest *singulum* cilium, carinatum, perforatum, ut ciliorum et dentium aequus numerus, quod jam in *Specc.* b. vir bene perspexisse videtur, habens in char. gen.: „peristom. exter. dentt. *sedecim* — interior ciliis *totidem*.” Cf. fig. nostr. laud. Etiam in hac specie, ut in sequente, contra Hedw. nervus folii ante apicem evanescit, non excurrit. — Var. β . statura, seta duplo, triplo minoribus; foliis forma, apice, nervi ratione cum iis var. α . bene convenientibus; nec sporang., operc., peristomiis revera differentibus. Speciem propriam habere nequimus. Folium pessime Brid. delineavit.

2. *M. dealbata* Sw., foliis acuminatis. *Dicks.* t. 5. f. 3. (*Bryum*). *Swartz. suec.* t. 5. f. 10. *Hedw. Specc.* t. 41. ff. 6-9.

„Non solum in turfosis, sed etiam in glareos. argillos. pr. *Waren*” duc. megap. „frequens.” *Bland.* Aestate. 24.

Folia apice subserrulata. — Peristom. inter. in hac parum abnorme (tamen recentem plantam nondum observavimus), ei *Pohliae* auctt. potius

accedens visum; scil. rete vix ullo conspicuo, ciliis [perforatis cum dentibus alternantibus humili membrana infra evidenter connexis. Attamen ob insignem habitum stirpem a naturali sua sede amovere dubitavimus.

43. *Fontinalis Hedw.*

Peristomium interius conus reticulatus.

1. *F. antipyretica* L., foliis ovatis, acutis, complicatis. *Dillen.* t. 33. f. 1. *Hedw. Fund.* I. t. 5. f. 27., II. t. 1. f. 5., t. 4. ff. 14. 15., t. 9. f. 53-55. *Engl. Bot.* t. 359. (in Tab. nostra X. f. 7. perist.)

In fluviis et stagnis. Aestate. 2.

Folia in hac specie et insequente trifaria, nervia, integerrima, sporangium perichaetio immersum, operc. conicum, calyptra mitraeformis, ut in *Trichost.* Cur in nostra *Turn.* et *Smith* operc. „conicum, acuminatum” s. „conico-subul.” vocant, non videmus. Jam figg. *Hedw. Fund.* II. t. 4. ff. 14. 15. conicum, obtusum bene sistunt.

2. *F. squamosa* L., foliis lanceolatis, acutis, concavis. *Dillen.* t. 33. f. 3. *Hedw. Stirpp.* III. t. 12.

Fontin. *minor* Web. spic.

In rivulis alpp. Aest. 24 (rar. fructif.)

Foliis anguste lanceolatis, non complicatis, sed concavis solummodo, toto habitu tenuiore, graciliori facile a prima distinguenda.

44. *Diphyscium* Mohr. Obs.
p. 34.

Peristomium interius connis membranaceus,
plicatus.

1. *D. foliosum* Mohr. *Dillen.*
t. 32. f. 13. *Schmid. Buxb.* t. 1. ff.
I - XIV. (*Buxbaumia sessilis* —
opt.!) *Hedw. Fund.* II. t. 9. f. 51.,
Theor. ed. 2. t. 12. ff. 4 - 12., t. 13.
ff. 1 - 3. *Fl. dan.* t. 249. fig. super.
(mala). *Swartz. Meth.* t. 1. t. 4.
(*Buxb. foliosa*) *Engl. Bot.* t. 329. (in
Tab. nostra XI. f. 1. perist.)

Mohr. l. c., *Webera Diphyscium* Ehrh.
Beitr. .)

In sylv. montos. Aestate. Autumno. ☉.

Habitus *Phasci*, pro quo *Muell.*, *Lightf.*,
Huds., alii vetustiores salutarunt. Caulis sub-
nullus. Folia infima parva, reflexa, lineari-lir-

gulata, obtusa, integerrima, uninervia, nervo subexcurrente; reliqua erecto - patentia, media lanceolato - subulata, integerrima, uninervia, nervo subexcedente, intima ejusdem fere formae, nervo longissime excedente, superne serrato - ciliata. Seta brevissima, subnulla. Sporang. ovatum, gibbum, totum quantum immersum. Calyptra mitraeformis. Operculum elongate conicum, rectum. Perist. ext. vix ullum. Marginem oris crenulatum pro tali sumsit Hedw., Ehrh. denegavit. — A Buxb. *aphylla* haec *foliosa* species peristomio summo opere discrepat, quo commotus Ehrh. proprium genus construxit.

** dentibus obliquis

45. *Funaria Schreb.* (*Koelreutera* Hedw. olim.)

1. *F. hygrometrica* Hedw., foliis ovato - brevi acuminatis, nervo excurrente, integerrimis; seta arcuata; sporang. oblique sulcato; operculo convexiusculo - umbonato. *Dillen.* t. 52. f. 75. *Engl. Bot.* t. 342. *Fl. dan.* t. 648. f. 2. *Sturm.* 2. *Hedw. Fund.* I. t. 5. ff. 21-26. (partes flor. utriusq.), II. t. 3. f. 11. (operc. c. annulo), t. 5. ff.

25. 26. et t. 6. f. 27. (plantae e semine propullulant.), t. 10. ff. 58-61. (sporang. matur. c. perist. et semin.). (in Tab. nostra IX. ff. 6-8. perist. partes).

Mnium L.

In loc. udis, areis carbonar. derelictis; vulg. Vere. ☉.

Calyptra, dum a vaginula nondum soluta, inflata, posthac 4-angula musci peculiarem faciem sistit. Perist. int. nuperrime (mirabile dictu!) prorsus denegavit Cel. *Belvis.* et in *Fl. d'Ow. et de Ben.* p. 9. non parum triumphat Hedwigium, qui falsam heic in rebus nudo oculo visibilibus (?) observationem fecisset! — Sed vix summ. Hedw. partes perist. int. dentibus perist. ext. oppositas, basi connexas, quales nostra fig. 8. eas exhibet, attigit, ut non cum *Orthotr.*, *Neck.*, *Diplocom.* et *Mees.* ratione perist. int. genus comparandum, sed potius cum *Lesk.* et *Timm.* Ex sexu ad Hedwigianam *Pohl.* sese habet, uti *Mnium* Hedw. ad *Bryum* ej. Nec vero etiam si negligeres dentium perist. ext. obliquitatem, cum *Lesk.* unquam esset confundenda, quia processus perist. int. non cum dentt. perist. ext. alternentur, nec carinati sint, sed oppositi reperiantur; quo eodem modo ac *Tim-*

mia et hocce genus a *Lesk.* distinguitur. *Fun. flavicans* Mich. bor. - am., optime auct. mon., statuae nostrae est, nec nisi foliis setaque et sporang. pallide flavescentibus, foliorumque acuminibus longioribus „setaceis” differt. Specimina e variis Am. bor. regionn. saepius accepimus. — Quoque novam possidere *Funariae* speciem ex ins. *Hispaniola* Cel. Smith., ipse in Fl. brit. nec non *Turn.* in musc. hib. adnotarunt. Hanc ex eadem patria allatam jam diu habuimus, et nuperrime quoque Cel. *Smith* complures misit surculos; sed in omnibus, quos vidimus, folia ita depravata sunt, ut de specifica musci differentia nil enucleare valeamus. Statura, sporang. et operc. certissime *F. hyg.* et *F. flavic.* — Vulgaris vero nostra species quoque multum ludit (magnitudine et externa facie insequentis e *Suec.* habemus), et in dissitissimis terrae regionn. provenit. Ex ins. *Maderae* eam possidemus, et e *Cap. b. sp.* (*Fun. hyg.* *Thunb. Pr. cap.*).

2. *F. Muehlenbergii* Hedw. fil., foliis ovato-longius acuminatis, nervo in plurimis superioribus evanescente, serratis; seta recta; sporang. laevi; operculo subconico. *Wahlenb.* in *N. A. Holm.* 1806, t. IV. f. 2. (*F. calcarea*).

Hedw. fil. inst. — *Turn. in Ann. of Bot.* II. p. 198. et in *Bot. Guide* p. 730. — *Schleich. Cento* 1. n. 27., *dentata* *Crom. Nachlief.* 2. n. 12.

„In collib. arenos. in via ad *Zippendorf* pr. *Suerin.* Jun.” *Crom.* 24.

Distinctissima species, vix bene hisce definita a *Turn.* in *Ann.*: „subacaulis; foliis ovatis, acutis, conniventibus, concavis, piliferis; capsula pyriformi, obliqua; operculo convexo-conico.” Primum ex *Am. bor.* a *Muehlenb.* accepit *Hedw. fil.*, dein a *Schleich.* lecta in *Helv.*, a *Wahlenb.* in arenos. pr. *Wisby* ins. *Gothland* *Suec.* et tandem a rev. *Dalton* in *Angl.* comit. *York* pr. *Copgrove.* — Etiam peristomia et calyptra prorsus congruunt cum iis reliquarum specierum; nec levissima discrimina detegere potuimus in exemplis amer., suec., helv. et megap. Pulcherrimus muscus, hand leve nostrae Florae decus.

3. triplici.

46. *Buxbaumia* *Ehrh.* in *hann. Mag.* 1779. p. 257. ex anthithesi, tacite.

1. *B. aphylla* *L. Dillen.* t. 68. f. 5. *Schmid. Buxb.* t. 1. ff. 1 — 25. (*Buxb. caulescens* — opt.!) *Hedw.*

Fund. II. t. 3. f. 10., t. 9. f. 52. *Fl. dan.* t. 44. *Sturm.* 3. (in Tab. nostra XI. f. 2. perist.).

In pinetis. Per totum fere annum. ☉.

Singularissimus muscus, tum quia foliis caret, tum ob sporangium dimidiatum, scil. altero latere planum, depressum, altero convexum, insolitae magnitudinis, tum demum ob peristomium reapse triplex. Hocce vix hucusque bene descriptum atque delineatum exstitit. Ut enim Sprengelii hallucinationes, jam in *Web. Br.* p. 95. reprobatae, hoc loco praetereamus, haecce habet in *Fund.* II. p. 96. candidiss. Hedw.: „quasi triplicatum peristoma habere videtur, cum extimum constet dentibus 16 truncatis, eminet abinde coronae imago, e numerosissimis succulentis processibus exstructa, quos dentibus quasi adglutinatos reperi, cum horum unum alterumque de sua sede solve-rem. At fere suspicor, hunc filamentoso-succulentum apparatus, annuli loco esse.” Certe nec rite observavit insignem hanc partem inter perist. ext. dentium truncatorum et int. tubulosum, plicatum adentem summ. vlr, nec bene cum annulo muscorum eam comparavit. Minime *corona processulorum* est, uti in *Fund.* II. t. 9. f. 52. eam exhibuit, sed reapse *membrana* (uti omnia alia peristomia interiora membranacea) coronae ad ima-

ginem superne effigurata, inter exterius et intum peristomium affixa, et revera interius peristomium vocanda, nec ullo modo cum *annulo* s. *funbria* in muscis obvia comparanda. *Annulus* enim externe ante omne peristomium, inter operc. et sporangii orem invenitur, nec persistens est pars, sed fugax, plantae nostrae autem intermedium peristomium post dentes peristomii exter. repertum, nec unquam, nisi ipso sporangio putrescente, dissolvitur et aufugit. Cf. fig. nostr. laud.

β. operculo (dentium apicibus) adnato.

47. *Andreaea* Ehrh. hann. Mag. 1778. *)

1. *A. alpina* Hedw., caule ramoso; foliis lanceolatis, enerviis, undi-

*) Peristomii dentes valvulae quatuor fructus *Andreaeae* vix nuncupari possunt, quoniam prominulus nullus sporangii inveniatur margo, post quem insertae sunt. Potius sporangium medio quadrivalve dicendum, basi atque apice integrum. Censet caeterum summ. *Hedw.*, genus muscis frondosis, nec hepaticis „1) ob calyptram sursum latam; 2) ob columellam; 3) ob defectum machinularum elasticarum, sporulas excutientium” adnumerandum esse.

que patentibus. *Dillen*. t. 73. f. 39.
Hedw. Specc. t. VII. fig. p. (folia).
Sturm. 3. (in Tab. nostra XI. f. 3. ramus et 4. folium).

Jungermannia L., *Andreaea petrophila* Ehrh.
In rupibus subalpinis. Aestate. 4.

2. *A. rupestris* Hedw.? caule
ramoso, foliis lanceolatis, apice curva-
tis, enerviis, homomallis. *Dillen*. t.
73. f. 40. *Hedw. Specc.* t. VII. f. 2.
g-o? vix bona! (in tab. nostra XI.
f. 5. surculus et 6. folium).

Jungermannia L. — Web. Spicil.

In iisdem cum praecedente locis; tempore eo-
dem. 4.

Licet semper VV. Cell. *Ehrhart* et *Schrader*
testarunt, nam tantum in Hercyn. *Bruct.* prove-
nire *Andreaeam*, magis tamen oculis nostris, quam
summorum virorum auctoritati fidem habere debe-
mus. *Spic. Fl. Goett.* auctor in Herb. ambas
nostras stirpes in ipso *Bruct.* ab eo lectas asserva-
vit, quae in Herbariolum nostrum nunc transmigra-
runt. Non tamen diffitendum, foliis *AA. alp.* et *rup.*
non differre, nisi quod in hac apex folii lateraliter
curvatus sit, ex quo insigniter homomalla in caule

folia evadunt. Injuste Hedw. *A. alp.* folia *dorso laevia*, *A. rup.* folia „*dorso muricata*” s. *papillosa* tribuit (quod fideliter pro more exscripsit *Brid.*); sunt reapse in utroque musco summis lentibus dorso levissime papillosa. — Certo certius haec planta Dilleniana, omnibus numeris conveniens, et cum a Dillenio abinde plurimi, et nuperrime denuo *Cell. Turner* ac *Smith* duas distinxerint species, non aliter agere ipsi volumus, licet forte differentiae solummodo pendeant e diverso loco natali. Quod ad Hedwigianas duas *Andreaeas* adtinet, ex verbis et figg. immort. viri certe amiciss. *Turn.* sententiam amplexi essemus, ambas stirpes unam eandemque speciem censentes, et veram *Andr. rup.* Hedwigio ignotam putantes. Ex ipsissimi vero *Herb.* filius benigne speciminula nobiscum communicavit, quae quidem summopere similia invenimus, et vix in *rup.* specie folia ita luculenter homomalla, quam in exemplis *Weberianis*. Tamen, apex foliorum et in his ad latus curvatur, et cum *alp.* species Hedwigiana certo certius etiam nostra, vir summ. autem alteram utique diversam censuerit, rectius egisse putamus *Smith.*, *A. rupestrem* Hedwigii ad suam et *Dillenianam* citantem. Praeter enim curvatum apicem utriusque stirpis folia diversa vix invenimus, nec cum *Anglis* itaque „late ovata” folia primae spe-

ciei tribuere possumus; nisi forte haec dicta habenda sint a multo majoribus surculis, Dillenianis figuris omnino magis convenientibus, qualia pro vera Jung. alp. L., e Lapponia ab ipso allata, amiciss. Swartz nobis dedit, insimul vulgarem nostram Ehrhartianam Andr. *petrophilam* — *rupe-strem* nuncupans. Haec certe lapponica foliis pa-rumper latioribus et ita ovatis dicendis utitur, nec tamen specie nobis dignoscenda videtur. Haec de vexatis nostris *Andreaeis*. Stirpium a nobis de-scriptarum figuras addidimus, ne, quae habueri-mus, lector haesitet.

3. A. Rothii Web. et Mohr., caule simpliciusculo; foliis lanceolato-subu-latis, nervosis, homomallis. Tab. no-stra XI. ff. 7. 8.

Andr. *rupestris* Roth. Neue Beitr. I., excell. sy-nonn. — Web. in Web. et Mohr. Arch. p. 125. t. IV. f. 2.

In cippo sepulcrali ethnicorum in duc. Brem. inter *Hagen* et *Meyenburg*. Roth.; aestate. 24.

Certe distinctissimam esse speciem, postquam fructus visus est, nunquam ullus negabit. Opti-mum inventum, quo pauperrimum hucusque ge-nus egregie ditatum est, et quidem specie, propter nervum folii, a detectore praetervisum, memora-

bilissima. Completum specimen, quod pictum esse curavimus, nuperius ipse Cel. Roth. benigne nobis condonavit. — Folia „setacea falcata” suae A. rup. amiciss. Turn. cum adscribat, novam nostram ut prae oculis ille habuerit, propemodum censes.

B. Deoperculatae.

a. receptaculo fructus communi instructae.

48. *Marchantia* (*Marchant.* fil. in Act. Gall. 1713. t. 5.) L.*)

(*Receptaculum* fructus commune pedunculatum, inferne fructus gerens deorsum spectantes. *Sporangium* apice dehiscens, dentt. sub-8.)

1. *M. polymorpha* L., receptaculo femineo radiato, masculo pedunculato, peltato. *Act. gall.* l. c. *Mich. gen.* t. 1. (ff. 1-3. fem., 5. et sec.)

*) Plantae l. monoicae, l. dioicae. Receptaculum fructus commune loculis l. sub-1-, l. multifloris. Nec tamen hoc, nec dicti receptaculi forma, l. receptaculis masculis varie figuratis, et l. sessilibus, l. pedunculatis, plura genera constituenda ex uno naturalissimo nec specierum tanto numero gaudente; uti fecerunt *Michelius* (*Marchantia*, *Lunularia*, *Hepatica*), *Hillius* (*Conocephalum*) aliive.

Dillen. uti senex etiam 4. masc. pl., 6. ex Marchant. repetita fem.). *Dillen.* t. 76. 77. f. 7. (in utraque mas et fem.). *Schmid. Icc.* t. 9. mas et 29. fem. (optimae!). *Bull.* t. 291. *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 26. 27. ff. 1. 2. (utriusq. fructificat. et scyphulor. anal.). *Sturm.* 3. (utriusque sexus stirps absq. anal.) (in Tab. nostra XII. ff. 1 - 3. fructus analysis.)

Ad font., scaturig. et in loc. udis sylvat. Vere, aestate. 24.

Receptaculum femin. 7 - ad 10 - radiatum, loculis tot, quot radii alternis, sub 5 - floris. Receptac. mascul. in diverso individuo, pedunculatum, peltatum, 6 - 9 - crenatum. *Scyphuli*, s. *cyathi*, s. *cupulae*, *propagines* continent, in utriusque sexus fronde sessiles, margine dentatae. Frondes terrae adpressae, varie lobatae, sinuatae.

2. *M. hemisphaerica* L., receptaculo femineo subintegro, subhemisphaerico, sub-4 - angulato, masculo pedunculato, peltato. *Mich. gen.* t. 2. f. 2. (fem.). *Dillen.* t. 75. f. 2. (solummodo fem.). *Schmid. Icc.* t. 34. (mo-

noica — opt.). *Fl. dan.* t. 762. (fem. — mala). *Scop. carn.* ed. 2. II. t. 63. (March. *quadrata* et *M. triandra* [*triloba* Schrank.]).

March. *conica* Schleich. Cat. pll. helvv., ex specim. misso.

In loc. udis rupestr. montosar. region. Vere. 21.

Receptaculum femineum 4-l. pluries locale, oculis sub-1-floris. Calicis proprii laciniae obtusae, non exsertae. Receptaculum masculum in eadem l. diversa stirpe, pedunculatum, peltatum, sub-4-angulatum. Frondes subdichotomae, varie lobatae crenataeque. — *Schmid.* receptacula duo observavit androgyna, s. utriusque sexus flores continentes; v. ej. figg. l. c. XXXI-XXXIV. — March. *quadrata* Scop. l. c. absque ullo fere dubio eadem, et quidem feminea stirps. Etiam specimen dubie pro *M. quadrata* a rev. *Selig.* missum vix non pumila *M. hemisph.* videtur. *M.* vero *quadr.* Web. Spic., ex specimine, nostra mascula. *M.* demum *triandra* Web. Spic. etiam minuta mascula *hemisph.* ex specim. videtur, et Scopoliana hymonyma l. c. l. mascula, l. parva feminea eadem stirps omnino censenda.] Cf. *Ehrh. Beitr.* III. p. 120. — Sed bene distincta videtur a nostra altera species a nobis cum amiciss. *Wahlenb.* Upsal. lecta prope *Gottsundam*, frondibus multo minori-

bus, pedunculo femineo duplo longiore, receptaculo ipso duplo minore, inprimis vero calicum priorum laciniis 3-5 lanceolato-subulatis, longis, exsertis satis insignis. Forte eadem species est a *Ludwig.* in *Siles.* collecta et a *Sprengel.* nobis communicata, ab hoc *dichotoma* inscripta, quod censemus, ex errore, ob dichotomas *Ricc. glaucas* frondes commixtas. Nil enim dichotomi in ipsa planta. Caeterum specimina non talia, ut certi quid ex iis determinare valeamus.

3. *M. conica* L., receptaculo femineo integro, ovato-conico, subangulato, masculo sessili. *Vaill. bot. par.* t. 33. f. 8. (masc. pl.). *Mich. gen.* t. 2. f. 1. (monoica pl.). *Dillen.* t. 75. f. 1. (uterque sexus). *Schmid. Icc.* t. 31. (uterque sexus — opt.). *Fl. dan.* t. 274. (fem.). *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 27. ff. 3-5. (masc. pl. c. anal.) t. 28. (fem. fructificat. anal.).

March. androgyna Web. Spic., excell. synn., ex specimine, hujus var. sterilis; cf. quoque *Ehrh. Beitr.* 5. p. 56. n. III. et *Hoffm. Fl.*

In humid. nemorosis montoss. region. Vere. 24.
Receptaculum femineum 4- ad 6-loculare, loculis 1-floris, pedunculo basi *antro* fuso, caeterum

nuda. Calix proprius nullus? — certe non exsertus. Receptaculum masculinum in diverso l. (ex *Mich.* et *Schmid.*) eodem individuo, sessile, infra hemisphaericum, supra planum. Frondes dichotomae, lineares, sinuatae. — Ex *Micheliana*, *Schmidiana* ac *Hedwigiana* analysi calix femineus proprius huic speciei deesse videtur. Ipsi recentem plantam nondum examinavimus, nec ex paucis madefactis exemplis quid eruere valuimus. Rem caeterum a nullo non auctore intactam vidimus. — Differt ab hac *March. fragrans* (Balbis.) Schleich. Cent. 3. n. 64. (*M. hemisphaer.* ej. Cat. pl. helvv.): frondibus minutis, pedunculo femineo duplo brevior, basi villo albido obsito, calicibus propriis magnis, inflatis, exsertis, multifidis, laciniiis apice cohaerentibus. Vix, quod scimus, in Germania haec hucusque lecta, copiosa in *Helv.* et *Ital.* super.

b. receptaculo fructus communi nullo.

49. *Targionia* (*Mich.*) *L.*

Calix 2-valvis. *Sporangium* apice dehiscens? (dentt. 4. s. pluribus?)

1. *T. hypophylla* *L.* *Mich. gen.*
t. 3. *Dillen.* t. 78. f. 9. *Schreb. in*
Naturf. XV. t. 5. ff. 1-17. optt.

Sturm. 3. (figg. Schreb. l. c. bene repetitae, praeter 6. 7. 10. 16.) *Sprengel.* in *N. act. holm.* 1802. t. IV. et in *Bull. des scienc.* T. III. n. 52. t. I. f. 2. Tab. nostra XII. ff. 4-6.

In rupp. (*Dresdae*; Schreb. — *Halae Sax.* ap. *Kröllwitz*; Spreng. — in princip. *Baruth.* ap. *Gefraes* et *Culmbach*; Funck. et, ni fallimur, in *Belg.* am. *Delavigne.* Vere. 24.

Fronde minutae, obovatae, apice emarginatae, terrae adpressae, iis *Marchantiarum* similes, inferne ad venas secundarias membranulis auctae (v. fig. nostr. 4.) — Cur *Sprengel.*, exsultans quasi, *Schreberum* plantam tantum desiccata[m] vidisse et examinasse, teneat? Num unquam egregiam illam dissertatiunculam in *Naturf.* exhibitam propriis suis oculis lustraverit, l. forte eam solummodo ex *Genn. plantt.* l. *Sturm. Fl.* cognoverit; nullo enim loco (nec in *Anleit.*) *Schreberi* figg. laudat, quippe quas nec *Sturm.* se mere repetiisse commemorat? Nonne claris verbis optimus *Schreb.*, se plantam recentem ipsum legisse, et iteratis vicibus per decennium fere ab aliis adportata diversissimae aetatis specimina habuisse testetur? Quid vero *Sprengel.* analysi *Schreberianae* addiderit? Calicem bivalvem e duplici membrana consistere docuit (non enim, uti in *Act. holm.* ipse dicit, has

duas membranas (Schreb. observavit), exteriore opaciore, interiore albidula, tenuissima. Has vero membranas uti ab invicem distincte separatas figg. citt. si exhibet, a veritate alienum hocce factum est. „Duplici” vero „membrana structum” etiam jam Cel. *Hoffm.* in Fl. calicem pronuntiavit. Tum in interiore membrana areolis hexagonis reticulata, corpora glandiformia in anastomosibus venularum obvia demonstravit (v. fig. nostr. 6. l. c.), eaque primo masculos flores nuncupavit ex male putata eorum identitate cum organis masculis *Jungermanniarum* aliquot acaulium, *Marchantiarum*, *Anthocerotis*, *Blasiae*, *Ricciae*. In *Anleit.* vero partes fructificationis amplius non censet; nec sane ipsi censemus; sunt enim potius puncta connexus inter duas calicis membranulas, omnino arcte cohaerentes, nec sane nisi simplicem calicem constituentes. Porro organa feminea abortiva plura circa unicum grossificatum, more muscorum frondosorum et plurimorum hepaticorum, adentia primus revera quidem vidit (cf. fig. nostr. 5.). Demum vero multo probabilius organum masculum Schreberianum, si contrahenti procul dubio interpreti gallico in *Act. Soc. philom.* fides habenda, nec ipse satis intellexisse videtur („la verrue purpurine, qui est à la base „(?)” de la membrane interne du calix”). In genere autem nullo ll. cc. sua perspicue protulit, ut non nisi iterata propria

analysi tandem verba et figg. Ejus intelligere et cum luce clariore Schreberiana dissertatiuncula rite comparare valuerimus.

50. *Jungermannia* (Rupp. Fl. Jen.) L. *)

Sporangium 4-valve.

- *) Calix 1-phyllus varie formatus in plurimis adest, in *acaulibus* (praeter *furcata* specie et quibusdam affinibus exoticis) fere deficit, perisporangio styligero (calyptra) ejus vices gerente. Num ex hoc, suadente Schrebero, diversi generis character desumendus, si antea *furcatae* speciei et affinium femineus flos melius notus evaserit? Multo sane majoris momenti ad dividendum vastissimum (tamen naturalissimum) genus essent, monente quoque Schrebero, *helices*, quibus sporae adhaerent, l. *fundo*, l. *apici*, l. *disco*, l. *margini* valvarum adfixae. Dolendum autem, non solum fructum generatim rarissimum, sed et dictarum helicum, s. elaterum, insertionis locum in speciminibus desiccatis, immo vivis post maturitatem fructus, ubi statim laudatae partes aufugiunt, difficillime determinandum esse. Nec Hedwigium sequeremur autumantem, ex perigoniorum s. calicium, atque spermatocystidiorum diversis rationibus plura forte genera constituenda esse; nec demum Cel. *Belvisium* (Palisot de Beauvois), qui, pro invertendi suo, et a contraria parte sumendi omnia de plantis cryptogamis hucusque statuta et satis bene comprobata mo-

• Foliosae.

† amphigastriatae (s. foliis tegentibus supinis [*stipulis* Schreb. lips., *amphigastriis* Ehrh. Beitr. III. p. 80., *foliis accessoriis* Swartz. Fl. Ind.

re, in *Flora d'Oware et de Benin* F. III., sub *Carpolepido*, etiam huic generi jam perturbationem potius minatur, quam dilucidationem promittit, singulari sane effato non dubitans fateri, ut abinde a *Michelii* temporibus vix quid in Cryptologia profecerimus. Et heic quadrivalvem fructum omnibus hodie extra dubitationis aleam positum, masculum florem pronuntiat, elateres staminum filamenta, semina vero s. sporas pollinem antherarum efficiens. Pergit tum, ex norma fere a b. *Hedwigio* (quem autem minime ipse allegat) indicata, genus in plura dividendo, si rite eum capiamus (qui enim despicit l. vili pendet recentiorum temporum in hisce detecta, vix ac ne vix quidem tali modo sua profert, ut cum cognitis a nobis ipsis juste ea comparare, mentemque, quam sibi fingit, divinare valeamus), circiter ita:

- 1) *Carpolepidum* genus — quasi: *semina s. fructus sub squamis* — (*Muscoides* Mich., ipso volente — male) ei audiunt species, quae *masculo flore* (ipsi *fructus*) *tali comparato* gaudent, ut p. 157. 158. et tab XVIII. ed. 2. *Theor. gen. et fructif* in Jung. *asplenioide* B. L. *Hedwig* demonstravit. Sunt nimirum pauca, sec. Hedw. 2-3. (sec. *Belvis*. singula) spermatocystidia *Hedwigiana* (semina *Belv.*) heic sub singulis squamis, l. potius foliis, latitantia in rachi

oec. III. p. 1852. Obs.] auctae — *Muscoides* Mich.)

obvia. Hac constructione rami sic floriferi masculi, primum apice, dein, elongatione ex innovatione trunci facta, quodammodo medio *tumidi* evadunt; id quod in characterem sui generis Belvisius quoque suscipit, mediam semper et ab initio insimul intumescentiam illam dicens. Novem exoticis speciebus gaudens hocce genus auctor perhibet, in dubio id relinquens, num *Jung. albicans* L., cui quidem eadem esset fructificatio ipsi feminea, nobis mascula (cf. *Hedw.* l. c. p. 158. medio), cum vix ramulos exinde turgidos acciperet, generi associanda sit, l. potius in proprium conjungenda cum *JJ. platyphylla*, *tamariscifolia*, *dilatata*, quarum adhuc laterent fructus (nobis mares).

2) *Conianthos* genus (*Jungermannia* Mich., uti auctor vult) species concipit vulgarissima masculorum florum (ex Belv. femineorum) ratione, s. glomerulis illis ex innumeris spermatocystidiis Hedwigianis conflatis, in trunci suprema parte, l. foliorum apicibus, utentes; de quibus cf. *Hedw. Theor.* laud. p. 156. 157. tab. XVII. f. 1-5.

3) Sub *Rhizophylli* demum genere *acaules* vocatae species comprehenduntur, s. *Marsileae* Mich., quia *sub epidermide latescentes* illis flores Belvisio feminei, nobis masculi. Cf. *Hedw.* l. c. p. 159-162. tabb. XX. figg. 5. 6., XXI. 4. 5., XXII. 1-4., XXIV. 2.

a. amphigastriorum triplici serie (ex *Muscoid. Mich. Ord. l.*) *)

1. *J. platyphylla* L., foliis imbricatis, ovato-subrotundis, obtusis; amphigastriis integerrimis. *Vaill. bot. paris. t. 19. f. 9. Mich. gen. t. 6. ff. 3. 4. Dillen. t. 72. f. 32.*

Ad arbb., rup., in muris. Vere. 24. (ex Am. bor. Dillen. habuit et Michaux quoque retulit.)

Elaterym tandem, illi filamentorum staminum, diversum in cruciato sic dicto flore situm Cel. auctor quoque indicat, non nunc nos edocens, an etiam ex eo forte in posterum genera plura condere sibi proposuerit.

De reliquo etiam *Jungermanniae* l. monicae l. dioicae.

*) In *Jungg. platyph.*, *laevig.*, *Porella* sic dictae recentiorum *stipulae laterales* vera amphigastria (nec foliorum dorsales auriculae) omnino censendae videntur. Finis quidem lineae insertionis earum exterior in uno eodemque incidit puncto cum fini exteriori lineae insertionis foliorum; sed omnino nullus nexus inter ipsam folium et memoratam stipulam nobis quidem observandus fuit, nec avulsum a caule folium stipula ista sequitur. Tamen non diffitendum, in foliis calicem ambientibus dictam stipulam, prorsus ut in speciebus *tamariscif.*, *dilat. cet.* in lobum anteriorem minorem s. auriculam folii mutari.

Calix 3-gono-subcompressus, 3-fid., laciniis dentatis. Folia saepius reflexa, quod non valet in sequente. Rarissime quoque l. haec l. amphigastria uno alterove dente instructa reperiuntur.

2. *J. laevigata* Schrad., foliis acuminatis; amphigastriis dentato-ciliatis.

Schrad. Samml. n. 104., Jung. acris Wib. werthh.

In rupp. *Herc.*, pr. *Werthh.* (inque *Helv.*). 2.

Fructifera nondum lecta. Obiter Instructa amphigastria media ac lateralia ejusdem fere magnitudinis; reapse haec longiora, angustiora, illa breviora, latiora. — Num *Mich. gen. t. 6. f. 1., Dillen. t. 72. f. 33.* et *Jung. Thuja Dicks.* revera heic pertineat, valde dubium. Nimis fidenter *Roth.* synonyma allegavit.

b. amphigastriorum simplici serie.

α. foliis (inferne) auriculatis (*Muscoid. Mich. Ord. II. et ex O. l.* *)

3. *J. tamariscifolia* Schmid., foliis obtusis, integerrimis, auricula-

*) *Schreb., Ehrh.* et vetustiorum plures bene in hisce speciebus eas partes, quae recentioribus

rum lobo fornicato subhemisphaerico;
foliis calicinis rotundatis, integerri-

(Schrad. in Samml., Rothio, al.) stipulae laterales dictae sunt, pro foliorum appendicibus s. auriculis (Schreb. — stipulis Ehrh.) sumserunt, similibus iis, quae in speciebus simpliciter foliosis (s. examphigastriatis) occurrunt, si lobus folii l. anticus l. posticus inflectitur et reclinatur, ex quo subdivisiones specierum simpliciter foliosarum l. antice l. postice auriculatarum (*Fuugermanniae* Mich. Ordd. I. et II.) originem duxere. Revera enim haec stipula sic dicta *lateralis* caulis dorso quidem quoque affigitur (ut *auriculae dorsales* in speciebus iis gaudentibus), sed pars constituens folii est, atque id a sede sua avulsum una sequitur, vera igitur *auricula*. — Singularis vero huius auriculae conformatio. Constare enim videtur in omnibus speciebus, Europaeis et exoticis (in dilat. vix tamen rite rem observavimus) e lobulo folio propiori (igitur interiori) *fornicato* (s. l. hemisphaerulam l. sacculum inversum, s. infra apertum, sistente) alteroque exteriori (s. caulis dorso propiori), plerumque minutissimo, planiusculo. Illius justam ideam suppeditat fig. *Michel.* t. VI. 6. PP., hicce, quantum scimus, prorsus hucusque neglectus fuit. Ut nil vero is commune habeat cum vero amphigastrio (medio), optime probat ejus praesentia in utriusque lateris auriculis. Quod enim valere nobis videtur de amphigastriis specierum simpliciter amphigastriatarum absque foliorum auriculis, scil. ut omnia opposita sint foliis unius lateris, hoc etiam hic observayi-

mis, auriculis 2-, 3-fidis; amphigastriis calicinis 4-fidis. *Vaill. bot. par.* t. 19. f. 10. *Mich. gen.* t. 6. f. 6. *Dillen.* t. 72. ff. 27. 28. *Schmid. Ic.* t. 67. (excl. omn. synn.).

J. tamariscif. Schrad. Samml. n. 103., Roth., *dilatata* Ehrh. decc. n. 215., Hoffm. et plurim., forte ipsius Linn., *juniperina* herb. Ehrh. (non nisi tenuior forma).

mus, et omnia amphigastria (media) unius lateris foliis opponuntur. Alterius ergo lateris folium cum auricula sua nullum amphigastrium (medium) oppositum sibi habet, et tamen quoque in eo auricula lobulo illo gaudet. Nec deum pro vero amphigastrio laterali, respondente amphigastriis lateralibus specierum *platyph.*, *laevig.*, *Porellae*, laudatus lobulus habendus, quippe qui in Jung. *magellanica* Spreng. in fl. hal. p. 317. (*Dill.* t. 72. f. 34.) satis evidenter pars annexa ipsius auriculae appareat. — Tandem in foliis calicem excipientibus auriculae supra descripta natura valde mutatur (ut in genere *Jungermanniarum* partes calici proximae longe diversam ab ea, quam antea habuere, formam induunt, quod vix hucdum satis observabatur, quodque in *Prodromo historiae muscorum hepaticorum* jam parato fusius demonstrabimus). *Fornicatam* enim nullam amplius partem habet, sed tota quanta planiuscula evadit, integra l. 2-, l. 3-loba (cf. *Schmid. Icc.* t. 67. ff. 5. 6. 8.), lobulorum solummodo marginibus reflexis.

Ad arbb. cortt. Vere. 24. (inter Hypna e *Pensylv.* quoque habemus).

Folia *opaca*, laxius imbricata, auricularum lobo planiusculo minutissimo. Amphigastria minuta, 2-fida, rarius serrulata (*Schmid.* f. 12.). Folia calicina rotundata, integerrima, auriculis 2-, 3-fidis, lacinia prima maxima, omnibus acutis, subserratis, margine reflexis (*Schmid.* ff. 5. 6. 8. egregiis!). Amphigastria calicina 4-fida, laciniiis mediis elongatis, utraque externa minore, omnibus acutis, subserratis (*Schmid.* f. 10. egregia!). Calix 3-gonus, 3-fid., nobis semper papillosus (quod Schmidelio „puculatus”) occurrit, ipso Schmidelio interdum quoque laevis. Sed forte *dilatata* speciem summ. vir cum nostra confudit. Fig. enim Ejus 1. ad illam pertinere videtur. En autem, quantum ex calice et eum excipientibus partibus utraque species diversa! — Amphigastria, ob minutem, a vetustioribus, *Mich.*, *Dill.*, rell. prorsus omissa bene pinxit *Schmid.* (ff. 10-12.). Auricularum vero justa idea ex nulla figg. Schmidelii, nec ex 9. concipienda. Optime contra *Mich.* eas exhibuit sub PP. Heic revera hemisphaerulae infra apertae, s. fornices, uti occurrunt in planta, videndi. Jungermanniam *Dill.* t. 72. f. 28. A. B. (nam *Michelii* adjuncta stirps semper dubia), significante Dillenio, in *Orthth. striato* et *aff. quae-*

sivimus et reperimus, exactissime figg. Dill. respondentem. Sed certo certius nil est, nisi ipsissima Ejus species 27., habitu in stirpe, quae surculis singulis muscos perrepat, omnino quodammodo mutato. Viridiora enim haecce specimina, glaciiora, foliis laxius adhuc dispositis. (Hocce Dillenii synon. Dicksono mox ad suam *J. cineream*, mox ad *serpyllifol.* referente, quid de his duabus speciebus faciendum ignoramus.) — Plantam Schmideli non esse *J. tamariscif.* Schreb. et auctt. primus observasse videtur Schrad. in Samml. Nec ipse Schreb. observavit edens Schmideli opus; quare omnia ab Eo adjecta synonyma delenda. Num autem recte nunc cum Schmidelio hanc *tamariscif.*, nitentem speciem contra *dilatata* nuncupemus, vix scimus. Verosimillimum enim, Linneum contrarium statuuisse. Egimus cum Schradero.

4. *J. dilatata* Web., foliis obtusis, integerrimis, auricularum lobo fornicato clavato, altero minimo l. nullo; foliis calicinis acuminatis, serratis, auriculis integris; amphigastriis calicinis 2-fidis, serratis. *Vaill. bot. paris.* t. 23. f. 10. *Mich. gen.* t. 6. f. 5. *Dill.* t. 72. f. 31.

Web. patr. herb., vix *Spic. ex diagn.*, —
Schrad., *Roth.*, *tamariscifolia* Ehrh. Decc. n. 144.,
Schreb. lips., Hoffm. et rell., forte ipsius Linn.,
nigricans Schleich. Cent. 5. n. 46., *pulchella*
Suecor.

In arbb. et rupp. Vere. 24. (e *Carolina* retulit
Michaux — *J. tamarisci* Fl. bor. - am.)

Folia *nitida*, arctius imbricata, auricularum lobo
planiusculo vix hucdum nobis observato. Amphigastria magna, 2-fida, integerrima, margine reflexa. Folia calicina acuminata, serrata, auriculis margine reflexis, elongatis, integris, acutis, serratis. Amphigastria calicina profundius 2-fida, laciniis elongatis, acutis, serratis. Calix omnino 3-gonus, 3-fidus, ut in affinibus, minime, quod habet *Schreb. in Spic. lips.*, „acute 4-gonus.” Nil quoque monuit *Schreb.* de calice a *Schmidelio* in *J. tamariscifolia* 3-gono exhibito, licet opus *Schmidelianum* edens huic auctoris speciei (quamquam immerito) suum apposuerit synonym. Superficies calicis laevis. — Caeterum cf. ad *J. tamariscif.* Adnn. *Rothii* synonym. confusio sub utraque specie omnium pessuma.

Ad eandem cum *J. tamariscif.* et *dilat.* subdivisionem pertinere videntur species dubiae:

Jung. epiphylaea Schrank. baier. Fl., quae insufficientissime descripta, et ex ipso auct. forte l. *tamariscif.* l. *dilat.* nostra; et

J. cavifolia Ehrh. Beitr. 4. p. 45. *Dilatatae* nostrae responderet, nisi „surculi simplices” dicerentur. Ex *Hercyn.* (et pr. *Upsal.*) Ehrh. collegit.

β. foliis exauriculatis (*Muscoid.* Mich. O. III.)^{*)}.

l. integris (integerrimis, amphigastriis bifidis l. bilobis, integerrimis).

5. *J. pallescens* Ehrh., foliis subrotundis; amphigastriis ovalis, bifidis, laciniis aculis.

Ehrh. Dec. n. 302.

In locis humidis. 2l.

β. *rivularis* „surculo fluitante magis ramoso, foliis atroviridibus” Schrad. Samml. n. 108. — *Mich. gen.* t. 5. f. 3.?

^{*)} De situ amphigastriorum, respectu foliorum v. not. p. 399. 400. Finis alter lineae insertioni amphigastrii fere in idem incidit punctum (l. paulo infra) cum fini dorsali lineae insertionis foliorum unius lateris, alter finis oppositus mediae lineae insertionis foliorum alterius lateris. Anomala *Jung. connata* Sw., indica.

Jung. *fragilis* Roth. Fl., *fluviatilis* (Sw. mst.)
Thunb. Cat. Mus. ups.

In saxis rivulorum, fossis turfosis. 2l.

Amphigastria (praeprimis in β .) admodum fugacia, non nisi in juniore planta observanda. — Licet affirmaverit Cl. Roth., Jung. ejus *fragilem* omni aetate amphigastriis destitutam et ex hoc dignoscendam esse a *J. pallesc.* β . *rivul.* Schrad., tamen in specim. ab ipso datis versus summa ramorum evidentissimas observavimus illas partes, ut asserto Schraderi, ex quo Rothii species delenda et ad Ehrhartianam nostram reducenda, omnino fides habenda sit. — *Mich. gen.* t. 5. f. 3. olim citabatur ad *J. asplenoid.* L., a qua, jam Ehrh. in *Beitr.* 2. p. 172. monente, foliis integerrimis diversissima. Nostrae bene convenire videtur, praetervisis forte a *Mich.* amphigastriis.

6. *J. Trichomanis* Dicks., foliis imbricatis, subrotundis; amphigastriis subrotundis, bilobis, lobis obtusis. *Dillen.* t. 31. f. 5. *Dicks.* t. 8. f. 5. (pessuma).

Mnium Trichomanis L.

In udis sylvarum. 2l.

A *J. pallesc.* praeter minorem molem et folia imbricata, differt amphigastriis subrotundis, bilobis.

bis, lobis obtusis, nec ovatis, 2-fidis, laciniis acutis.

β. minor, omnibus partibus 3plo minor. *Dillen.* t. 69. f. 2. ?

J. serpyllifolia (Dicks. *) *Schleich.* Cent. 5. n. 45., *minuta* Dicks. ?

In *Zillerthal* Flörke.

Planta habitu tam multum recedit a vulgari *J. Trichom.*, ut aegre non ab ea separaverimus; sed essentialia characteres nullos, nec aliquid praeter minutiem reperire valuimus. — Nostrae simillima *Jungermanniae* misera frustula invenimus etiam inter *Spagni Dill.* 3. *groenland.* exempla. Satis bene respondent figg. *Dill.* t. 69. 2. Ex Dicks. quoque haecce species (*Ejus minuta*) „subtus auriculata” (quod erit *amphigastriata*) dicitur. Num igitur reapse *Dillenii* ac *Dicksoni* planta cum nostra identica?

II. divisis.

I. emarginato-bidentatis (cum *amphigastriis* integerrimis).

7. *J. graveolens* Schrad., foliis subquadratis, bidentatis, dentibus acu-

*) De vera *J. serpyllif.* D. dubia v. ad *J. tamariscif.* Adnn.

tiusculis; amphigastriis lanceolatis, bifidis, laciniis elongatis, acutis.

Schrad. Samml. n. 106.

„Goettingae in arenosis ad rupes, saxa, terram. Fl. aestate.” *Schrad. 24.*

Amphigastria inter villum radicularum dorsi difficillime observanda si negligas, bene convenit cum figg. Jung. *bicrenatae* Schmid. Ic. t. 64. I. — Num calices dorso laterales *carnosi*, quos *Schrad.* observavit, veri calices? Certe in nostris exemplis ab ipso *Schrad.* datis et cum eo lectis nullus verus fructus. — Odor caespitum gravis, fere ut *Scand. Cerefolii*, ex quo *Schrad.* nomen specificum elegit, num reapse *plantae* proprius? — Primo intuitu species minoris *J. bidentatae* faciem simulat, sed saturatius, nec pallide viridis.

8. *J. heterophylla* *Schrad.*, foliis subbidentatis (supremis subintegris), dentibus acutiusculis; amphigastriis quadripartitis.

Schrad. Diar. bot. 1801. I. p. 66., J. bidentata Schleich. Cent. I. n. 44.

„Ad trunc. arbb. inprimis emortuarum ubique fere haud infrequens occurrit. Fl. aestate.”
Schrad. 24.

Differt a *bidentata*: foliorum omnium dentibus vix acutis (minime acuminatis), superioribus foliis obtuse tantum emarginatis, supremis subintegris (nec omnibus argute bidentatis). Amphigastriis haec, foliis *J. grav.* magis convenit cum *J. bidentata*; foliis nostra diversa tum a *J. grav.* tum a *bidentata*. — Num heic pertineant synonyma, plerumque ad *J. bidentatam* etiam citata, *Mich. gen.* t. 5. f. 13. *Dillen.* t. 70. f. 12.? Non nisi dubia res remanere potest, cum amphigastria non observata a vetustis auctt.

9. *J. bidentata* L., foliis bidentatis, dentibus acuminatis; amphigastriis quadrifidis. *Vaill. bot. par.* t. 19. f. 8. *Mich. gen.* t. 5. f. 12. *Dillen.* t. 70. f. 11.

J. bidentata Ehrh. Dec. n. 77.

In sylv. ad terr., ubique. Oct. Nov. 24.

Optime Schreb. descripsit in *Spic. lips.*, primus amphigastria observans.

† 10. *J. scutata*, amphigastriis ovato-subtriangularibus, acutis, integris.

Pr. *Jenam* legit Flörke, specialiora non indicans. 24.

Surculi breves, adscendentes, subdivisi. Folia imbricata, concava, oblique subrotunda, emarginato-bidentata, dentibus acutis, conniventibus, integerrima. Amphigastria subappressa, integra, ovato-subtriangularia, planiuscula, acuta, integerrima. Fructificatio nulla visa. -- Bene nostrae respondere videtur *J. supina* Hoffm. Fl., cum „frondes breves, simplices l. parum ramosas, superne depressas, inferne convexas“, „folia imbricata, bidentata“, „stipulas“ demum „imbricatas, appressas, ovato-lanceolatas“ auctor ei tribuit. Sed cur „prona facie stipulata“ dicatur, non capimus.

2. tri-, quadridenticulatis l. totidem partitis.

11. *J. trilobata* Web., foliis oblique ovatis, retusis, apice inaequaliter 3-dentatis, caeterum integerrimis; amphigastriis 2-, 4-fidis. *Mich. gen.* t. 6. f. 2. (opt.!) *Dillen.* t. 71. f. 23. (certissime!), 22. A. B.

Web. Spic., Ehrh. Dec. n. 48., procul dubio et *Linn.*, *J. rasilans* Hoffm.

In sylvatt. subalpestrium. 24.

Flagella ex axillis amphigastriorum. — Variat eximie magnitudine, foliis laxioribus, densioribus, breviorr., longiorr.; et in omni fere globi terra

rum regione provenire videtur. Ex *Am. bor.* etenim jam Dill. habuit et nos quoque accepimus. Porro *Jamaicensis* putanda; non enim distinguere valemus *J. stoloniferam* Sw., huicque prorsus similia exempla (sub nomine *J. tricrenatae*) aliaque parum diversae formae, haec et illa ex ins. *Borbon. Afr.* a *Borio* relata accepimus a *Brid.*

β. minor, omnibus partibus triplo minor.

Jung. triangularis Schleich. Cent. 2. n. 61.

In *Ascib. Ludw.* (a Stark. missa sub n. 18.), in *Gross - Art Salisb. Flörke* (In valle *Saas Helv. Schleich.*).

Licet habitu valde diversa sit a communi *J. trilob.*, tamen nec levissimam notam invenire valuimus, qua specificè discernamus. Accedit, ut diversissimis ipsa haec var. formis iterum ludat, folia mox laxiora, mox densiora, mox infimo dente obsoletiore gaudentia, rarius eo prorsus carentia habens. Fructificationem tamen non vidimus. Forte in hac olim discrimen detegetur.

† 12. *J. Flörkii* Web. et Mohr., foliis inaequaliter tridentatis, caeterum integerrimis; amphigastriis 2-partitis, laciniis subpinnatifidis.

E *Salisb. Flörke* (sub n. 27.) 24.

Caulis decumbens, breviusculus, subdivisus. Folia imbricata, oblique subquadrata, concava, in-

aequaliter 3 - dent., dentib. acutis, intimo majori, caeterum integerrima. Amphigastria minima, sub radiculis dorsi caulis occulta, appressa, 2-part., laciniis subul., acutis, concavis, subpinnatifidis, apicibus incurvis. Flagella nulla. Fructificatio latet.

13. *J. reptans* L., foliis remotiusculis, subquadratis, subaequaliter 3 -, 4 - fidis, caeterum integerrimis; amphigastriis foliis similibus, 4 - fidis. *Dillen.* t. 71. f. 24. *Schmid.* *Ic.* t. 68.

In umbrosis sylvar. Vere. 24.

Flagella ex axillis amphigastriorum. — Egregie, uti solet, *Schreb.* descripsit in *Spic. lips.*

14. *J. trichophylla* L., foliis amphigastriisque similibus et aeque patentibus, ad basin usque 3 -, 4 - partitis, laciniis strictiusculis, acutiusculis, integerrimis. *Dillen.* t. 73. f. 37. (rudis). *Fl. dan.* t. 828. f. 2. (Conferva *hypnoides*). *Schmid.* *Ic.* t. 42.

J. sertularioid. Sw. *Meth. musc.* t. 1. f. 6., *J. doslaviensis* Spreng. *hal.* t. 8. f. 2. omnium pessima!

In umbrosis sylv. Vere. Aut. 24.

Flagella nulla. — Minus bene, uti hucdum omnes auctt., *Schreb.* hanc descripsit in *Spic. lips.* Tristiche omnino surculis circumpositi sunt, qui hucusque foliorum capillaceorum fasciculi nominabantur. Cum vero omnium *Jungermanniarum* vera folia nunquam non disticha, ex seriebus fasciculorum illis tribus, duae tantum pro seriebus foliorum, tertia absque ullo dubio pro serie amphigastriorum habenda, licet difficillime dictu sit, quae nam sibi simillimarum serierum pro amphigastriorum sumenda. Caeterum generis universalis norma, ut foliorum sic nuncupati fasciculi pro singulis foliis amphigastriisque subtripartitis habeantur, sibi poscit. Et sic vindicatus est speciei locus naturalis apud simillimam, tamen optime diversam, *J. capillarem* Sw. indicam, quae evidentius naturam amphigastriatae speciei prodit, cum appressa est in ea amphigastriorum series, haecque ipsa quoque foliis patentibus paulo minora. — Etiam in nostra specie eum amphigastria servant ordinem, quem iis usitatum saepius indicavimus, scil. ut omnia opponantur unius seriei foliis. Sic cum iis facile commiscentur et in errorem seducunt observatorem. Exemplo est *Schmid. f. XVIIII.*, quae certe a tergo picta et in qua male confluentes amphigastriorum et ea foliorum series exhibentur, cui amphigastria opposita sunt. Pro singulis foliis tunc suntis laciniis capillaceis, „folia quasi ordine

verticillato cauli circumposita", quod Schmid. habet, omnino videri possunt. — Ex *Ehrh. Beitr.* 2. p. 46. (cf. p. 45.), huj. loci *J. multiflora* L. Mant., excl. syn. *Dill.* t. 69. f. 4. Vere autem diversa est *J. pauciflora* Dicks. t. 5. f. 9., tamen quoque hujus tribus. Folia ei erecto-patentia, laciniae tum foliorum, tum amphigastriorum multo breviores, obtusae, incurvae. Hanc tantum ex *Anglia* hucusque vidimus.

15. *J. ciliaris* L., foliis sub-3-fidis, laciniiis (intus) concavis; amphigastriis bifidis, his et illis longissime ciliatis. *Dillen.* t. 69. f. 3.

J. ciliar. *Ehrh. Beitr.* 2. p. 149., Dec. n. 18., *Roth.* (*pulcherrima* *Web. Spic. et Hoffm.*) et *Leers.* (*ciliaris* *Hoffm. Fl. II. t. 2., Leersii Roth.*)

In arbb., ligno putresc., rarius ad terr. *Aut.* 24.

Caulis calixque glabri, quo, praeter alias notas, a sequente specie differt. — *Figg. Hoffm. naturae* minus congruae, imprimis cum amphigastria integra exhibent. *Roth.* presse insistit *Hoffmanni* vestigiis, *J. suae Leersii* folia 4-fida, amphigastria integra tribuens. Ab ipso *Roth.* specimina habemus et in illis ut in genuinis *J. ciliaris* folia amphigastriaque superiora semper 2-fida, inferiora folia saepissime tri-, immo 4-fida, amphigastria vero inferiora ita profunde 2-fida invenimus, ut

laciniam singulam pro integro amphigastrio Hoffm. habuerit.

16. *J. Tomentella* Ehrh., caule decomposite pinnato; foliis amphigastriisque 4-partitis, longissime ciliatis. *Vaill. bot. par.* t. 26. f. 11. (mala). *Dillen.* t. 73. f. 35.

Ehrh. Beitr. 2. p. 150., Dec. n. 8., *J. ciliaris* Web. Spic. aliorumque Germ. Floristst. vett.

In udis sylv., ad rival. Vere. 24. (rarius fructif.)

Caulis supra tomentosus. Folia et amphigastria 4-partita, laciniis planis, distantibus, subulatis, acutis, longissime ciliatis, mediis majorr. Calix hirsutus. — Mirum est, tantum de specie decēptum esse lynceum *Ehrh.*, ut folia et amphigastria integra diceret; nec revera l. haec l. illa tomentosa reperimus, sed e margine solummodo longissime ciliata. Solus caulis antice (inter folia) reapse tomentosus. E recentt. auctt., quippe qui non observarunt, sed exscripserunt, nullus errores hos tam insignes castigavit. Caeterum nec minutissime foliis amphigastriisque, sed tantum caule pinnato, ramis subsimplicibus a nostra differt *J. tomentosa* Sw. jamaicensis, et de nostra quoque valet, quod de illa habet *Swartz* in Fl. Ind. occ.: „Figura foliorum non nisi in surculis adultis in-

quirenda; juniora fasciculum tantum ciliorum re-
praesentant, hinc surculi toti tomento instar vestiti
videntur."

17. *J. setiformis* Ehrh., foliis
4-partitis; amphigastriis 2-partitis,
his et illis laciniis dorso canaliculatis,
basin versus ciliato - pinnatifidis.

Ehrh. Beitr. 3. p. 80., Dec. n. 17. — *Schrad.*
Samml. n. 92., *J. concatenata* Thunb. Cat. mus.
ups. (ut editum est, sub hoc nomine ex herb.
Linn.)

In *Hercyniae* rupibus copiose, *Ehrharto*,
Schrad., nobis semper tantum sterilis obvia (an
alibi jam lecta?) 2.

Amphigastria minuta, erecta, 2-partita, laci-
niis iis foliorum angustioribus, caeterum similibus,
non solum ab *Ehrh.*, sed a reliquis omnibus huc-
dum praetervisa. Fructificatio speciei nullo quoque
botanicorum usque nunc observata, singula adest
in exemplo *J. concat.* Thunbergiano. Ex innova-
tione caulis lateralis jam evasit. Calix plicatus. —
Ne fugitivo intuitu nostram confundas cave cum
J. saxicola *Schrad.*

†† examphigastriatae (s. simpliciter foliosae s. nudaе — *Jungermannia* Mich.)^{*)}

a. foliis (inferne) auriculatis (*Jungerm.* Mich. O. II.)

18. *J. complanata* L., foliis subrotundis, integerrimis, auricula

*) A recentioribus quibusdam auctt. (v. gr. *Schrad.* in *Samml.*, *Rottl.*) adhibitae *Jungermanniarum* foliosarum nudarum divisiones in species „foliis undique imbricatis,” „foliis bifariis” et „foliis distichis,” quid sibi velint, vix capimus. Bene enim jam *Cel. Ehrh.* in *Beitr.* 3. p. 80. monet, omnes ab ipso visas *Jungermanniarum* species vere foliosas „folia” habere „bifaria.” Distinctio autem inter „folia bifaria” et „folia disticha” accurata plane nulla valet. Magis minusve enim in omnibus *Jungermanniarum* speciebus folia oblique cauli inseruntur s. *semiverticalia* (*Ehrh.* *Beitr.* 3. p. 164.) sunt (insimulque inaequilatera s. *pterygoidea* *Hedw.*) — Ad eas species quod attinet, quae ab antiquo (*Jungermanniarum* *Michelii* *Ordd.* I. II.) a reliquis foliosis examphigastriatis separatae sunt, quia foliorum iis alter lobus minor, l. antice (*Michelii* O. I. — species nostrae 32—35. —) l. postice (*Mich.* O. II. — unica *Jung. complanata*; nam *Michelii* tres postea adjectae species t. 6. ff. 18. 19. 20. vexatissimae) inflectitur et reponitur, quaeque *auriculatae* vulgo (ab *Ehrh.* *stipulatae*) nuncupabantur: earum *antice auriculatae* firmis quidem limitibus vix ullis a reliquis foliis bifidis bilo-

planiuscula, ovato-triangulari, obtusiuscula. *Mich. gen. t. 5. f. 21. Dillen. t. 72. f. 26. Fl. dan. t. 1062.*

In cort. arbb. Vere. 2.

Calix compressus, truncatus, integerrimus, ante setae evolutionem apice recurvatus. — Male recentt. plurimi et inter eos *Roth. simpliciter amphigastriatis* speciebus nostram adjunxerunt. Est supina facie auriculata; quod jam bene *Michel.* (cujus fig. laud. E. folia et auriculas optime sistit), *Linn.*, *Ehrh.* (Beitr. 1. p. 144.) et *Hoffm.* habent, quodque quoque tacite *Schrad.* in *Samml.* indicavit, *auriculatas* species in *superne* et *inferne auriculatas* dividens.

b. foliis exauriculatis.

α. integris.

I. integerrimis (*Jung. Mich. O. V.*)

19. *J. viticulosa* L., caule ascendente, nudo; foliis distantibus,

bisve gaudentibus segregantur, ut facile tales subdivisiones tironi imponere possint; *postice auriculatae* autem, tanquam a natura ipsa quasi sepositae, in enumerationibus nostris etiam absque vi separatae habendae videntur.

subverticalibus, convexiusculis, subrotundis, laete viridibus. *Vaill. bot. par. t. 19. f. 7. a. b.?* (censente *Dill.*) *Mich. gen. t. 5. f. 4. Dillen. t. 69. f. 7.,* probabiliter (ipso *Dill.* suspic.) et 8. (*J. aquatica* Schrank. baier. Fl. — cf. *Web. spic. p. 133.*)

In sylvis. Vere. 24.

Distinctissima a *J. polyantha*, quod, deficientibus in dorso caulis radiculis, non repat, et amoenae, in sicco saturatius viridis sit. Forte aliae adhuc in calice et perisporangio nobis non visis differentiae. Difficilis recentiorum aliquibus visa est species; vix scimus, cur.

20. *J. polyanthos* L., caule repente, dorso radiculoso; foliis subimbricatis, subverticalibus, convexiusculis, subrotundis, pallidis; calice perisporangio brevioris, dimidiato. *Mich. gen. t. 5. f. 5. Dillen. t. 70. f. 9.*

In humidiusculis sylvis. ad terr. Vere. 24.

Calices copiose et saepe quam maxime approximati lateraliter erumpunt inter folia. Sunt dimidiato-laciniati. Perisporang. s. coralla calicem supereminens, apice lacerum. Cf. Schmid. Diss.

pp. 99. 100. 101. — Folia rotundata, obtusissima, nec, qualia a quibusdam exhibentur, acuminata s. mucronulata observamus.

21. *J. lanceolata* L., caule repente, dorso radiculoso; foliis imbricatis, semiverticalibus, subconvexis, ovato-subrotundis, lacte viridibus. *Mich. gen.* t. 5. ff. 6. et 7. *Dillen.* t. 70. f. 10.

In humid. umbros. Primo vere. 24.

Calix tubulosus, teres, adscendens, apice laciniatus. Colore, habitu foliorumque rationibus satis jam diversa a *J. polyantha*; praecipuis autem distinctissima calicis (vix non semper terminalis) perisporangiique usitationibus normis.

22. *J. scalaris* Schmid., caule repente, dorso radiculoso; foliis subimbricatis, semiverticalibus, convexis, subrotundis, antrosum subconniventibus, lacte viridibus. *Schmid. Diss.* f. XVII. masc. pl. apex.

J. pumila Wither., ex specim. a Dicks. dato. In sylvestribus humidiusc. Vere. 24.

Calix apice laciniatus, laciniis extus canaliculatis, integerrimis. — Minorem formam *J. Sphagni*

primo visu omnino aemulat. Differt tamen colore pallidiore, omnium partium minutie, foliis plerumque convexis, patentibus, solummodo supremis concavis, antrorsum conniventibus, nec omnibus talibus. Flagella quoque non observata. Male *Schreb.* (in *Spic. lips.*) et *Hoffm.* ad hanc laudarunt *Dill.* t. 31. f. 5. Cf. *Schrad. Samml.* n. 96. — „Surculi *capsuliferi* versus apicem incrassati, *globuliferi* — longiores et magis attenuati sunt.” *Schrad.* l. c.

23. *J. Sphagni* Dicks., caule repente, dorso radiculoso; foliis imbricatis, subverticalibus, concavis, subrotundis, antrorsum conniventibus, lacte viridibus. *Dicks.* t. 1. f. 10.

In palustr., *Sphagno* adhaerens. Vere. 24.

Calices, nobis ignotos, Dicks laterales, oblongos dicit. — Flagella dorsalia in nostris exemplis observamus.

II. *dentatis* (*Jung. Mich. O. III.*)

24. *J. asplenoides* L., foliis subimbricatis, semiverticalibus, oblique ovatis, rotundatis, dentatis. *Vaill. bot. paris.* t. 19. f. 7 (excl. forte figg. a. b., quae Dillenio *J. vitic.* esse

videntur). *Mich. gen. t. 5. ff. 1. 2.*
Dillen. t. 69. ff. 5. 6. Fl. dan. t. 1061.
Hedw. Theor. ed. 2. tt. 18. 19.

In udis sylvv. Vere. 24.

Calix longus, compressus, subbilabiatus, dentatus, ante setae egressum apice recurvatus. — Occurrit *major* (Dill. 5.) et *minor* (Dill. 6.). Huic, nec *J. quinquedent.*, quod Schmid. suspicabatur, proxime accedit *J. spinulosa* Dicks. (Dill. t. 70. f. 15., forte et f. 16.); bene autem distincta est, vix hucdum apud nos lecta.

β. divisis.

1. foliis bilobis bifidisve.

1. integerrimis (*Jung. Mich. O. VI.*)

25. *J. julacca* L., foliis arcte imbricatis, erectis, acute emarginatis, angulis obtusis. *Dillen. t. 73. f. 38. Fl. dan. t. 1002. f. 2. mala.*

In rupib. alpestr. Aestate. 24.

Folia omnino bifariam imbricata, tamen, cum cauli arcte appressa sunt, eum teretem, julaceum sistencia. Cf. Ehrh. Beitr. 3. p. 80.; Schrad. Spic. P. 75. Color Bryi *argentei*.

26. *J. emarginata* Ehrh., foliis approximatis, patenti-divergentibus,

obtusae emarginatis, angulis obtusis.
Dicks t. 5. f. 10. (*J. macrorhiza*)!

Ehrh. Beitr. 3. p. 80. — Dec. n. 7., *J. varia*
Quorund. (Linnéana [*Dill.* t. 73. f. 56. — A. B.
orte ab C. D. diversis] prorsus dubia.)

In sylvaticis montosis. 24.

„Variat in rivulorum saxis: surculis fluitanti-
bus, ramosioribus, ab unciali ad biuncia em lon-
gitudinem protensis, foliis laxioribus, atroviridi-
bus.” *Schrad. Spic.* p. 75. Huic var. a Schrad.
communicatae suecica respondent exempla sub no-
mine *J. rivularis* data a Swartz. Quae Dicksono
radices audiunt („ramosae” injuste vocatae) fla-
gella (interdum foliis instructa) potius videntur.
Oriuntur antice inter folia. — Calix quasi in hac
specie duplex. Unico enim nobis noto exemplo,
in unum corpus heic folia duo calicina antice et
postice connata sunt, ut quasi calicem anteriorem
sistant. Adnatum intus fovet genuinum calicem
tubulosum, apice inflatum, plicatum, laciniatum,
vix iis aequae longum. Intra hunc denique setae
basin ambiens invenitur perbreve et perquam tenue
perisporangium (s. corolla), plerumque bilabia-
tum.

27. *J. Funckii* Web. et Mohr.,
foliis subimbricatis, patentibus, sub-

horizontalibus, concavis, acute emarginatis, angulis obtusiusculis.

J. excisa Funck. Samml. n. 118., an etiam *Hoffm. Fl.?* (descript. bene quadrante), certe non Dicks. (ut ex miseris ab ipso datis frustulis, caeterum indeterminabilibus, vidimus), *byssacea* Schleich. Cent. 5. n. 41.

In viis cavis sylv. *Francon. Majo.* Funck. 24.

* 28. *J. curvifolia* Dicks., foliis subimbricatis, subpatentibus, subhorizontalibus, longissime bicuspidatis, cuspidibus attenuatis, incurvis. *Dicks. t. 5. f. 7.*

J. birostrata Schleich. Cent. 3. n. 59.

Ad trunc. putrid. com. *Glatz.* Selig. 24.

Male criticus *Engl. Bot. (t. 1304.)* in (Hall.) *A. L. Zeit.* 1805. n. 273 nostram *J. byssaceae* Roth. var. pronuntiat. Est certe distinctissima species.

29. *J. bicornis* Muell., foliis remotis, patentibus l. patentisubdivergentibus, semiverticalibus, concavis, emarginato-bidentatis, dentibus acuminatis, acutissimis, conniventibus. *Fl. dan. t. 888. fig. a. (excll. synn.)*

J. rupicola Schleich. Cent. 2. n. 60. et *J. bicuspid.* var. *filamentosa* Ej. Cent. 5. n. 40.

In m. *pinif.* Francon. Funck.; in *Hercyn.* Ehrh. (*J. cordifolia* herb. Ehrh.); pr. *Adersbach Bohem.* Hueber (communic. Flörk.). 24.

Foliorum dentes in inferioribus foliis semper integerrimi, in superioribus hinc inde subserrati. Fructificationem non vidimus. Stirps Fl. dan. fig. b. „minor, erectiuscula” omnino aliena videtur. Forte *J. Funckii* nostrae propior.

30. *J. bicuspidata* L., foliis remotis, patentibus l. patenti-subdivergentibus, semiverticalibus, planiusculis, acute emarginato-bidentatis, dentibus acutis, divergentibus. *Mich. gen.* t. 5. f. 14. (c. exemplo masc.) et t. 6. f. 17. *Dillen.* t. 31. f. 6. (stirps masc.) et t. 70. f. 13. *Schmid. Diss.* f. XVI. (mas) et *Ic.* t. 63. (excl. figg. 16. 18. 19., quae vix dubie ad immixtam fere semper *J. reptant.* pertinent) (in *Tabb. nostrr.* I. ff. 9. 10. jun. fruct. c. adstanti. feminis infocundd.; XII. f. 7. caps.)

J. byssacea Roth., *divaricata* Engl. Bot., *Mainum fissum* L. (*Jung. fissum* s. *sphaerocephala* Auctt.) — mas!

In sylv. umbros. ad terr. Mart. Apr. 24.

Nullo modo a vulgari *J. bicusp.* specificè discernere valemus *J. byssac.* Roth. Fl., quam ipse Roth bene expressam declarat per fig. Schmid. Diss. XVI. Calices quidem semper terminales speciei suae auctor adtribuit, cum in *J. bicusp.* plerumque laterales obveniunt. Sed haec nota minime constans et sufficiens; nec fructificationem masculam, quam foliorum rosula fotam (cum in *J. bicusp.* nuda est) distinctivam Roth exhibet, vere diversam in exemplis ab ipso datis videmus. Convenit autem cum Rothianis specimm. tum Jung. sub nomine *byssoidis* e *Siles.* missa a *Stark.*, uti ipse *Stark.* suspicabatur, tum *J. divaricatae* Engl. Bot. Turnerianum exemplar. Forte quoque nil nisi nostrae varietas *J. multiflora* auctt., non Linn. (cf. ad *J. trichoph.* Adnn.) s. *Dill.* t. 69. f. 4.; cf. *Schmid. Ic.* ad t. 63. Obs. 5. Certe *J. multifl.* a Thunb. nobis data reapse parum tenuior *J. bicusp.* Bene distincta vero a vulgari nostra specie videtur Jung. Mich. gen. t. 5. f. 15. (repet. a *Dill.* t. 70. f. 14.), quam ad suam *J. ventricosam* Dickson. citat. Num haec quoque in *Germ.* obvia sit, nondum determinare volumus, cum anglicis caremus exemplis.

31. *J. saxicola* Schrad., foliis imbricatis, patenti-divergentibus, bilobis, complicatis, lobis obtusis.

Schrad. Samml. n. 97.

Ad saxa in m. *Weisner Hass. 21.*

Folia subhorizontalia, concava, loborum antico minore, patentiore. Fructificatio adhuc latet. Si conservanda esset adhibita hucdum divisio specierum superne auriculatarum, certe nostra huic divisioni esset adnumeranda.

2. dentatis (*Jung. Mich. O. I.*) *)

32. *J. undulata* L., folii lobis subrotundis, obtusis, subintegerrimis l. minutissime denticulatis. *Vaill. bot. par. t. 19. f. 6. Dillen t. 71. f. 17.*

J. paludosa Schleich. Cent. 3. n. 56., *cochleariformis* Ej. Cent. 5. n. 43.

In paludos. montos. Vere. 21.

Folii lobus anticus in hac et duabus sequentt. minor concavus, posticus convexus, calix in omnibus tribus speciebus compressus, truncatus, ante setae evolutionem apice recurvatus. In nostra caeterum subintegerrimus l. tantum minutissime denticulatus, in *J. nemor.* ciliatus, in *J. resupin.* integerrimus.

33. *J. nemorosa* L., folii lobis subrotundis, dentato-ciliatis. *Mich.*

*) cf. de hac subdivis. not. supra p. 416.

gen. t. 5. f. 8. Dillen. t. 71. f. 18.
Hedw. Theor. ed. 2. t. 17.

In nemorosis. Vere. 24.

34. *J. resupinata* L., folii lobis
subovatis, acutis l. acuminulatis, den-
ticulatis. *Dillen. t. 71. f. 19.*

J. compacta Roth. Fl., *umbrosa* Schrad. Samml.
n. 102. (et Schleich. Cent. 3. n. 58.)

In rupib. sylvestr. Vere. 24.

Antecedente omnibus partibus triplo minor, ca-
licem primum apice protrudens (cf. Dill. l. c. fig.
C.), qui dein ex innovatione caulis lateralis evadit.
Folii quoque uterque lobus magis ovatus, multo
acutior, interdum subacuminatus, nec toto mar-
gine dentato-ciliatus, sed hinc inde subintegerri-
mus, saepius apicem versus parce denticulatus.
Calicem injuste Roth apice dentatum vocat, forte
ex male intellectis Dillenii verbis. — Quo distin-
guamus ab hac *J. umbros.* Schrad. plane nil vide-
mus. Ea lorum folii forma, quam stae plantae
Schrad. adtribuit, certe ipsissima illa, qua a *J. ne-*
mor. nostra praepimis differt, calixque, qui in
nostra mero casu interdum lateralis (quod jam ex
Dill. patet), etiam in ipsa Schraderi stirpe pro-
miscue lateralis et terminalis (immo in eodem in-
dividuo) nobis occurrit. — Nec magis differt a vul-

gatissima nostra Rothii *J. compacta*, ex ipsius auct. specimm. Male folia integerrima describuntur, et citatur *Mich. gen. t. 5. f. 9.* (alias ad *J. variam* L. laudata). Quomodo autem criticus in (Hall.) A. L. Zeit. 1804. n. 369. hancce Rothii speciem identicam cum *J. emargin.* proclamare poterit, plane non capimus.

35. *J. albicans* L., folii lobis oblongis, obtusis, nervo instructis, denticulatis. *Vaill. bot. par. t. 19. f. 5. Dillen. t. 71. f. 20.*

In humid. nemoros. Vere. 24.

Folii uterque lobus concavus, anticus minor, posticus recurvus. Calix cylindricus, superne in plicas suboctonas contractus, denticulatus. Pulcherrimum praebet aspectum folior. utriusque lobi nervus latus ac pellucidus, versus summa evanescens, jam olim a *Web.* in *Spic.* observatus, a recentt. neglectus, tamen optimum speciei criterium. Cel. *Hoffm.* in *Fl. una cum Dill. t. 71. f. 20.* huc quoque citat *Dill. t. 73. f. 36. s. J. variam* L.

II. foliis 3 - , 4 - l. pluridentatis lobatisve (*Jung. Mich. O. IV.*)

36. *J. exsecta* Schmid., foliis concavis, inaequaliter 3-dentatis, denti-

bus acutiusculis, integerrimis. *Schmid.*
Ic. t. 62. f. 2.

In umbrosis sylvatt. Aestate. 24.

Folia imbricata, subpatentia, dente intimo (s. antico) latiore, brevior, extimis (s. posticis) duobus aequalibus, minutis. Dentibus tantum 2 species variare dicitur. Nos semper 3-dentata folia observavimus.

37. *J. pusilla* L., foliis subquadratis, plicatis, antice obtuse crenatis, integerrimis. *Mich. gen.* t. 5. f. 10. (repet. a *Dill.* t. 71 f. 22. C. D. E.). *Dillen.* t. 74. f. 46. (minus bona). *Schmid. Ic.* t. 22. *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 20. ff. 1—4.

J. angulosa Dicks. (ex specim.) et, procul fere dubio *pygmaea* Wulf. in *Schr. berl. Naturf.* 8. 1. p. 151. 152.

In humid. umbros. Aestate. 24?

Folia subverticalia, imbricata, concava, 2-, 3-, 4-, 5-crenata. — Quam in hac specie aliisque pinxit *Michel.* fructificationem Et racemosam s. semina in racemos digesta, *Schmid.* (bene, ut videtur) fungillos censet parasiticos, forte ex *Moniliae* 1. *Botrytidis* hodiernis generibus (v. *Schmid. Diss.* 6. XVI.). Cf. caeterum de fructificatione mascula

stirpis *Schmid. Ic.* 11. c. et *Hedw. Theor.* p. 158.
159.

38. *J. quinquedentata* (Huds.)
L., foliis subquadratis, plicatis, sub-
4-dentatis, dentibus subaequalibus, acu-
tis acuminulatisve, integerrimis. *Mich.*
gen. t. 5. f. 11. *Schmid. Ic.* t. 48. (*J.*
barbata).

J. quinquedent. Ehrh. (cf. *Ej. Beitr.* 2. p. 173.
n. 42.) *Web. Spic.*, *barbata* et *quinquedent.* *Roth.*
Fl. (consent. *Schrad.*), *dichotoma* *Schleich. Cent.*
2. n. 57. et *gracilis* *Ej. Cent.* 3. n. 60.

In umbros. sylvatt. *Mart.* — *Maj.* 24.

Caulis dorso radiculis obsitus. Folia semiverti-
calia, subconvexa, 3 - ad 5 - dentata. Calix tubu-
losus, apice plicatus, dentatus. — Eximie variat
species omnium partium magnitudine, foliis mox
imbricatis, mox subimbricatis, mox remotis, nu-
mero dentium foliorum aliisque rationibus, ut sae-
pissime non agnita pluresque mala ave ex ea con-
stitutae sint species, quarum ex numero, praeter
jam laudatas, absque fere dubio quoque *J. 3-den-*
tata *Scop. carn.* (cf. *Web. Spic.* p. 139.) et *J.*
4 - dentata *Wulf. in Schr. berl. Naturf.* 8. 1. p. 154.
(cf. etiam *Hoffm. Fl. ad J. barb. Not.*). — Ut au-
tem vera sit Linnéana nostra, specimen a *Swartz.*
tandem comprobavit.

39. *J. incisa* Schrad., foliis inaequaliter sub-3-fidis, laciniis dorso canaliculatis, dentatis.

Schrad. Samml. n. 100., Ejusd. Journ. 1801. 1. p. 67.

„Ad rup., saxa, terr. inque musc. uligin.
Goett.” (*Schrad.*), in *Siles. Selig.*, pr. *Jen. et Ratisb.* Flörke. Majo. 24.

Folia imbricata, patentia, subsemiverticalia, 3-, 4-fida, laciniis acutis l. acuminulatis, externis s. posticis majorr. — Ut examphigastriata species sit, Schradero ad interim fidamus. Caulis dorsum ita radiculis obsitum, ut certe et nos amphigastriorum nulla detegere valuerimus vestigia. Caeterum stirpis natura affinem illam declarare videtur *J. setif.* et novae nobis speciei exoticae, *J. hirtellae*. Si vero *Roth* mox haesitat, num a *J. exsecta* Schmid. (*globulif.* ipsi) nostra vere differat, mox ei affinem putat Schmidelii *J. bicrenatam* (dubiam caeterum), fere necesse est, ut nullam justam nostrae ideam acquisiverit. Non possunt magis hisce differre tres species aliae.

* Frondosae (s. acaules — *Marsilea* Mich.)

40. *J. epiphylla* L., fronde ob-
ovata, lobata, subnervi, lobis sinua-

tis, margine undulatis, superne fructifera. *Mich. gen* t. 4. f. 1. *Dillen.* t. 74. f. 41. *Schmid. Diss.* f. 1. *Fl. dan.* t. 359. *Hedw. Theor.* ed. 2. tt. 23-25. *Hoffm. Fl. II.* t. 4. (plurimae figg. *Hedw.* min. mole repetit., adject. aliis).

In humid. sylv., prat. udis. Vere. 24.

Nervus medius quidem adesse apparet, praesertim in siccis; in bene emollitis vero, lineam insertionis radicularum dorsalium mediam eum tantum mentiri, facile observandum. — Procul omni fere dubio hujus mera var. angustior *Vaill. bot. par.* t. 19. f. 4. (*J. endiviaefolia* Dicks.), minus recte a *Dill.* (dubie tamen) ad *J. ping.* allegatum.

41. *J. pinguis* L., fronde obovata, lobata, subnervi; lobis sinuatis, inferne fructifera. *Mich. gen.* t. 4. f. 2. et probabiliter f. 3. (quae repet. a *Dill.* t. 74. f. 44. A.). *Dillen.* t. 74. f. 42. *Schmid. Ic.* t. 35

In loc. udis, ad rip. fluvior. Vere. 24.

Nervi spurii frondis eadem ratio ac in praecedente, cui frondibus similima, a qua vero differt perisporangio (s. corolla ex inferiore pagina oriente (nec epiphyllio), longo, cylindrico (nec brevi, cya-

thiformi-subclavato), capsula clausa oblonga, valvulis ellipticis (nec globosa, valvulis ovatis.).

42. *J. multifida* L., fronde repente, bipinnatifida, enervi, laciniis apicem versus subdilatis. *Dillen.* t. 74. f. 43. (et 48.?). *Schmid. Ic.* t. 55., praeter figg. 16. XVII.

Locis udis sylvatt. Vere. 24.

Perisporangia (s. corollae) ex axillis laciniarum quasi dorsalia, tubulosa, tuberculosa. — Non nisi parum latior hujus var. ex specim. nobis videtur *J. sinuata* Dicks. (non confundenda cum *J. sinuata* Sw. Fl. Ind. occ.), quae ex Dicksono Dill. t. 74. f. 44. B. (certe non Mich. gen. t. 4. f. 3., sub A. repet. a Dill.) esse dicitur et sec. fig. etiam apparet. Swartz in Fl. Ind. occ. propiorem eam censet *J. palmatae*, vix juste.

43. *J. palmata* Hedw., fronde brevi, adscendente, digitato-palmata, enervi. *Schmid Ic.* t. 55. ff. 16. XVII. *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 20. ff. 5–7. t. 21. ff. 1–3.

Ad radd. arbb., in humid. inq. musc. paludd. Vere. 24.

Frondes confertae, 2 -, 3 - lineares, adscend. Perisporangia ut in antecedente. — Integram Schmid. tab. cit. recentiores, v. gr. *Hoffm.* et *Swartz*, ad hanc referre voluerunt; sed quam *majo rem* var. Schmidel vocat reliquisque omnn. figg., praeter 16. XVII., exhibet, nobis certe ad genuinam *J. multif.* omnino pertinere videtur. Figg. vere duae laud., Schmidelio *minoris* varietatis (nec autem ipse contradicit, si quis propriam speciem censere maluerit), hanc absque dubio indigitant.

44. *J. furcata* L., fronde lineari, ramosa, extremitatibus furcatis, nervosa, margine inferne nervique dorso pubescente, viridi. *Vaill. bot. paris.* t. 23. f. 11. *Mich. gen.* t. 4. f. 4. *Dillen* t. 74. f. 45. *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 21. ff. 4. 5. t. 22.

Ad arbb., terr. Vere. 2.

Calicem, nec corollam s. perisporangium, esse perigonium illud clavatum, pilosum, in aversa frondis pagina e nervo proveniens, testis nobis Schmid. in *Diss.* p. 100. Nec vero aliud interius fructus tegumentum observasse videtur Hedw.; et fere dubitamus, num contra normam in reliquis *Jungermann.* frondosis usitatam haec bina adsint capsulae cum seta sua involucra. — Vix ac ne vix quidem

a nostra distinguimus JJ. *dichotomam* et *linearem*
Sw. tropicas.

45. *J. pubescens* Schrank., fronde
lineari, ramosa, extremitatibus furca-
tis, nervosa, tota superficie utrinque
pubescente, viridi.

Schrank. salisb., *Schrad.* Samml. n. 110.,
Funck. Samml. n. 96., *J. tomentosa* Hoffm. Fl.

In rupp., arbb. subalpestrium hinc inde. 24.

Fructificatio, ni fallimur, nulli adhuc visa. Si-
millima praecedenti, ut varietas apparuerit ali-
quibus.

51. *Anthoceros* (Mich.) L.

Sporangium semibivalve, *columella* instructum.

1. *A. laevis* L., fronde plana,
crenata. Schmid. *Mich. gen.* t. 7. f. 1.
Dillen. t. 68. f. 2. *Schmid. Icc.* t. 19.
Hedw. Theor. ed. 2. t. 29. et 30. ff.
1—3. et a. b. c. *Sturm.* 3. (praeter fig.
a., quae propria videtur, repetit. [la-
cite] Schmidelianarum 15. 16. 19. 11.
8. 10. 12., ultimae quatuor [sub E. F.
G.] male verbis explicatae). (in Tab.

nostra XII. f. 7. sporang. jam apertum, frondis particulae insidens.)

In agris humidis; Autumno. 24?

Colore saturatiore gaudet quam insequens. —

Sec. *Hedw.* perigonium floris masc. ruptum margine integro exstat, quod *Michelius* et *Schmid.* semper in lacinias divisum observarunt. — Manubria vero, quibus sporae instructae sunt in hac et sequente specie omnino talia ipsi vidimus, qualia *Hedwig* t. 30. f. 3. et a. b. c. depinxit, nec, uti in *Marchantiis*, *Targionia*, *Jungermann.*, duabus 1. simplici helice constructa, qualia, nescimus quo fato, *Schmidel* sub figg. 18. 19. tabulae 19. et 26. 27. tab. 47. exhibuit.

2. *A. punctatus* L., fronde turbinata, laciniata. *Schmid.* *Mich. gen.* t. 7. f. 2. *Dillen.* t. 68. f. 1. *Schmid.* *Icc.* t. 47. *Fl. dan.* t. 396. *Hoffm.* *Fl.* II. t. 5. (b. d. e. i. ex *Schmid.* desumptae [tacite], nec sane meliores redditae).

In agris humid. in vicinitate sylv.; Aut. 24?

Bene monente *Schmid.* huj. varietas *Anth. multifidus* L. (*Dill.* t. 68. f. 4.). Etiam exempla *Dicksoniana* pro *A. multif.* exhibita, sterilia quidem, optime respondebant figg. 7. et 21. *Schmidel.* 1.

c., et simillima ipsi invenimus inter nostra ad *Herc.* collecta. Vere autem distincta species procul fere dubio *A. crispus* Sw. jamaicensis. — Male *Roth* in *Fl.* observat, *Micheli* fig. potius *A. laevis* varietatem exprimere. Omnino huj. l. est.

52. *Blasia* (*Mich.*) *L.*

Sporangium frondi immersum, tubo extrorsum coronatum apice hiantem.

1. *Bl. pusilla* *L.* *Mich. gen.* t. 7. *Dillen.* t. 31. f. 7. *Schmid. Blas.* *Hedw. Theor.* ed. 2. t. 30. ff. 4 — 12. *Hoffm. Fl.* II. t. 3. *Fl. dan.* t. 45. *Tab. nostra* XII. f. 9.

In viis cav. sylv. editarum, loc. humidiusc. Aut. Vere. ☉.

Frondes tenerae, terrae adpressae, obovatae, simplices divisaque, margine sinuatae, undulatae, ad apicem nervi medii sporangium proferentes.

53. *Riccia* (Mich.) L. *)

Sporangium frondi immersum, *stylo* emergente coronatum.

1. *R. crystallina* L., terrestris, fronde cavernosa.

*) *Ricciarum* germanicarum historiunculam adumbrantes, postquam omnia rite contulimus seduloque rem perpensimus, ut vix quid aliud faciendum nobis restet invenimus, quam transcribere, quae ad tabb. 44. et 45. *Id. et Anal. anglißesatos Schmidel* observavit. *Michel.* quidem et nuperrime *Hoffm.* atque *Roth* densam specierum in hoc genere gregem distinxerunt, ultimorum illo de industria ut pluribus figg. citt. sua nova dicta illustraret abstinente, immo, quae petenda fuissent ex Schmid. ut ignoraret simulante, hoc, quod videtur, Schmidelii opus nunquam ipso volvente. Alterutrius vero auctoris species, si fide Willdenovii recensitam *R. pyramidatam* forte excipias, omnes ipsi vidimus, plurimas saepius legimus, atque quomodo aliter faciamus, quam dimidium alterum earundem pro varietatibus habere, non videmus; id quod in fronti adumbratiunculae monitum in genere voluimus. Taedio enim esset nobis et lectori, in singula specie repetere repetitaque cernere, quae istorum l. hic l. ille contra naturam nobis statuuisse videtur. Addimus egregia Schmidelii verba: „non quamlibet formam differentem, praesertim in quibusdam simpliciorum vegetabilium

In solo pingui, piscinis derelictis. Aest.
Aut. ☉.

Ludit plus minus dissecta:

a. fronde integriori. *Mich. gen. t. 57. f. 3.*

Ricc. pellucida Hoffm. Fl.

Bene jam a Dill., Schmid. al. pro *R. crystall.* mera var., qualis est, habita!

b. fronde profundius divisa. *Vaill. bot. par.*

t. 19. f. 2. Mich. gen. t. 57. f. 7. Dillen.

78. f. 12. Schmid. Icc. t. 45. f. V.

Ricc. cavernosa Hoffm. Fl.

Vaillantii fig. male pro *Ricc. fluit.* var. in Fl. Hoffm. habere videtur. Est certo certius huj. loci. — In consortio cum sua stirpe Schmid. invenit *Sphaerocarpum* Michellii (cf. p. 177. et fig. cit. n. 5.), non vero l. ad hujus l. illius plantulae analysin monuit, num in *Germania* l. extera forte terra utrumque vegetabile observaverit. Merito itaque haesitavimus, dubium illud genus *Germaniae* indigenis *Hepaticis* adnumerare. Monitos tamen volumus cryptologos nostros, ut in consortio *R. crist. Sphaerocarpum* quae-

ordinibus, in characteris specifici vigorem erigendam esse, experiuntur, qui impensius in istis rebus occupantur."

rant nebulasque demum, quibus ille involutus est, amoveant. — Caeterum ex auctoritate Schmid. *R. cryst.* haec ab insequenti *R. glauca* satis superque diversa. Vivam ipsam nondum vidimus; et vix itaque nobis deceat, de specifica ejus differentia dubitare. Sed utraque sane simillimae, et saepe saepius etiam *R. glauca* proveciori aetate ac ultimo vitae stadio subcavernosa evadit. Num caeterae discrepantiae a loco natali pendere queant; et ita in simplicissimis his, uti *Blasiae*, sic etiam *Ricciae* forte unica tantum existat species genuina, alienis illis *natante* et *fluitante* e genere exemptis? Docebit postera dies.

2. *R. glauca* L., terrestris, fronde punctata. (in Tab. nostra XII. ff. 10. 11. fructific.).

In solo limoso. Aestate. ☉.

Ludit segmentis frond. *latioribus*, *angustioribus*, apice *acutis*, *obtusisve*:

a. segmentis *latiusculis*, apicibus *acutis*. *Vaill. bot. par. t. 19. f. 1. Mich. gen. t. 57. ff. 4. et 8. (utraque aucta). Dillen. t. 78. f. 13. (repet. fig. 8. Mich.). Schmid. Icc. t. 44. f. 1. (inprimis n. 6.). Fl. dan. t. 898. f. 1.*

Ricc. bifurca Hoffm. Fl., Schrad. Samml.,
venosa Roth. Fl. III. 1., excell. synn., *crystall.* Schleich. Cat. pl. helv., ex specim.

R. venosa Roth. omnino huc referenda, si
nempe *R. glauca* Roth. Dillenii t. 78. f. 10.
(quam — certo certius ab ipso collatam —
uti optimam Roth allegat), et haec *R. ve-*
nosa altera duarum illarum specierum ab
Hoffm. male distinctarum (*glaucae* et *bifur-*
cae). *R. glauca* Hoffm. — Ehrh. Dec. n. 115.
(quam comparavimus) — Hedw. Theor. ed.
2. t. XXXI. — Ricc. Schmid. t. 44. f. II. (so-
lummmodo paululum minor — cf. Hoffm. Fl.
p. 96. in init.) — est enim ipsissima *Dille-*
nii t. 78. f. 10., s. *Mich.* t. 57. f. 9.

- b. minor, segmentis angustioribus, apicibus
acutis.

Ricc. minima Hoffm. Fl., ex specim.

Nec levissimis a priore forma differt; et
Ricc. minoriformis Hoffm., bene jam Roth.
suspicante, non nisi jam decrepita planta
videtur, in qua frons fere dissoluta magis
reticulatum et paene cavernosum habitum
acquirat.

- c. segmentis latiusculis, apicibus obtusis. *Mich.*
gen. t. 57. f. 9. *Dillen.* t. 78. f. 10. (quae
evidenter laciniis apice rotundatis utitur).

Schmid. Icc. t. 44. f. II. (R. glauca var. α.).

Hedw. Theor. ed. 2. t. 31.

Ricc. glauca Ehrh. Dec.; Hoffm. Fl.; Roth. Fl., excell. plurimis pro hac var. synn.

Synonymum *R. glaucae* Roth., contra mentem ipsius Roth. huic formae adscribere debuimus ex fig. *Dill.* uti *optima* citata; v. monita ad formam a. *Schmidelii* planta solummodo parum minor ac Ehrhartiana, Hoffmanniana atque Hedwigiana, ipso Hoffm. in Fl. concedente. Demum *Ricc. major* Roth. Fl., sec. specim., nil nisi *R. glauca* Hoffm., magnitudine solitam vix paulisper excedente. An itaque etiam hujus l.: *Mich. gen. t. 57. f. I. (repet. a Dill. t. 78. f. 5.)*, s. *R. coriandrina* Spreng. Anl. 3.?

d. minor, segmentis angustis, apicibus obtusis. *Mich. gen. t. 57. f. 6. (ex mente Schmid. — melius forsitan ad formam b.) Dill. t. 78. f. II. (ex mente Schmid., melius forte ad formam b.). Schmid. Icc. t. 45. f. III. (R. glauca var. β.).*

Ricc. minima L., ex mente Schmid.

β. *ciliata* Web. Spic., radiculis inferioris paginae utrinque supra marginem frondis exstantibus, eum ciliatum mentientibus. *Mich. gen. t. 57. f. 5. Schmid. Icc. t. 45. f. IV. (R. glauca var. γ.).*

Ricc. ciliaris Roth. Fl. III. 1., *ciliata* Hoffm. Fl.

Similibus cum α . loc. eodemque temp.

Bene jam Dillenio suae tab. 78. f. 10. mera var. videbatur; tamen paululum notabilior caeteris formis.

An ad hanc *R. glaucam* pertineat quoque *Ricc. pyramidata* „frondibus indivisis oblongis, apice inferne 3-angulatis r incrassatis, fructibus pyramidatis” Willd. in Bot. Mag. II. 4. p. 9., sec. Willd. *Mich. gen. t. 57. f. 2.* (repet. ap. *Dill. t. 78. f. 16.*), sed decies minor fig. Micheliana? Ad *Giebichenstein* pr. *Hal. Sax.* una vice Willd. legit, nec ullus alius botanicus loco designato postea reperire potuit. Colore frondis obscure viridi auctori praeprimis insignis videbatur, praeter frondes indivisas nec bilobas. Plantam ipsi nondum vidimus.

3. *R. ? natans* L., fluitans, frondibus dichotomis obcordatis, radicibus serratis. *Dillen. t. 78. f. 18.* *Schmid. Icc. t. 74. (R. capillata).*

In foss., aquis stagnant. Vere. Aest. ☉?

Fructificatio, quantum scimus a nullo visa, certe non a Schmid. Genus itaque incertum; et, bene jam Dill. adnotante stirps habitu simillima *Targionias*.

4. *R. ? fluitans* L., fluitans, frondibus dichotomis, segmentis linearibus

bus, elongatis. *Vaill bot. par.* t. 19, f. 3. *Mich. gen.* t. 4. f. 6. *Dillen.* t. 74. f. 47. *Fl. dan.* t. 275.?

Ricciae fluitans et canaliculata Hoffm. Fl.

In aquis stagnant., locisque similibus cum praeced. Vere. Aut. ☉?

Fructum speciei nondum ipsi vidimus. Describitur vero ab Ehrh. (*Beitr.* III. p. 81.): „Capsula in inferiore frondis pagina, plurimum haud procul ab ejus apice, sessilis, globosa, evalvis, Gallis minoribus foliorum *Glecomae hederaceae* similis, continens semina 20-30, alba et fusca”. Praeter huncce fructum, qui an genuinae *Ricciae* sit forte dubitandum, Hoffm. in Fl. memorat „corpuscula lutea parva in tenera substantia nidulantia”. — *Florae dan. synon.*, quod ad propriam Ei speciem, *R. capillarem* nominatam *Schumacher.* in Fl. Saell. allegat, quodammodo dubium ob marginem stirpis ciliatum depictum. Quae vero ex fig. de eo perhibet Cel. *Roth.* in Fl. germ. III. 1. p. 435. Obs. II., vix in delineatione ipsi vidimus; nec possumus cum auctore (in *Botan. Bemerkk. u. Berichtt.* p. 62.) consentire, ut stirps sit *Rivulariae* Ejus generis species. Forte planta sese habet ad communem *R. fluit.*, uti *R. glauca* β . cil. ad var. α . *R. canalic.* Hoffm. ex specim. nil nisi vulgaris *R. fluit.* in fossis exsiccatis quodammodo habitu mutata.

Descriptiones novarum specierum.

Equisetum variegatum.

Stirps gracilis, tenella.

Caules ex una radice plures, simplicissimi, erecti, nudi, glabri, amentiferi.

Articuli longiusculi, sub-8-sulcati.

Vaginae inferne nigricantes, ad dimidium usque fissae, dentibus lanceolato-subulatis, albidis, carina apiceque nigris, scariosis, suboctonis, vaginae amentum cingentis maximis.

Amentum terminale, parvum, ovatum, nigricans.

Receptacula partesque genitales ut in congenere-ribus.

Obs. Caulibus simplicissimis, nudissimis, articulorum longitudine, vaginarum colore, amenti denique forma *Eq. hyemali* proximum, distinctissimum vaginis omnibus dentatis, caetera ut negligamus. Cum *Eq. scirpoidi* habitu tenello, colore, amento et articulorum ratione convenit quidem, ast vaginis in nostro multifidis, in illo „trisetis“, ut habet *Cel. Michaux* l. ejus interpres, toto coelo differt.

Phascum elatum.

Plantae in hoc genere maximae, fere unciales, erectae, ramosae, „ramis inferne gracilescentibus, nudiusculis, saepius ternatis” (*Brid.*), pallide virentes.

Caulis subdivisus.

Folia infima rariora, breviora, superiora longiora, conferta, oblongo-longius apiculata, uninervia, nervo excedente, apiculum constituyente, integerrima, erecto-patentia, sporangium abscondentia.

Seta brevissima, incurva.

Sporangium gracile, ellipticum, nutans, attamen ob setae brevitatem e foliis superioribus non emersum, sed eorum in gremio latens.

Calyptra . . .

Genitalia . . .

Obs. Habitu et statura ad var. β . *Ph. cuspid.* accedit, accuratius examinanti cum eo non confundendum. A *Ph. recto* With. toto coelo discrepat. Denique cum *Ph. pilif.* maximum quidem convenit; sed statura multo major, foliorum apiculus nunquam albescens, sporangii forma longe alia et totus habitus diversissimus ne cum eo confundas, impedimento erunt. Cum *Ph. bryoidi* Dicks. criti-

cus in *N. Leipz. Lit. Zeit.* 1806. St. 52. p. 818. idem putat; quo jure, ex nostra adumbratiuncula pateat! — *Phasc. cernuum* An. de Cienc. nat. No. 14., quod minus juste cum *Ph. curvic.* auctores comparant, a nostro, ex specimm., quae Swartz. benigne misit, vix nisi statura duplo minori differt. Folia, sporangium, setae rationes plane congruentia vidimus.

Phascum carniolicum.

Plantae admodum minutae, gregatim crescentes, laete virides.

Caulis subnullus.

Folia infima pauca ovata, patentia, superiora oblonga, erecta, sporangium superantia, omnia acumine brevissimo instructa, uninervia, nervo lutescente, sub acumine evanescente, integerrima, siccitate crispata.

Setae brevissimae, rectae, interdum gemellae ex uno perichaetio.

Sporangium ovale, erectum, immersum.

Calyptra conica, lateraliter fissa.

Genitalia . . .

Obs. Ph. *Flörkeanum* magnitudine fere adaequans, ab eo colore amoenissime viridi, nec lurido, foliis erectis, quae in illo patentiuscula, siccitate incurvis et margine involutis, statim dignoscendum. Sub microscopio folia huius exacte oblonga, brevissimo acumine terminata, nervo (qui in Ph. *Flörk.* folii paginam exsuperat, et ita acumen constituit) sub ipso acumine, e substantia folii solummodo constructo, plane evanescente, facile observantur. A Ph. *cuspid.*, giganteo, si cum nostro compares, foliis siccitate non conniventibus, sed incurvis, nervo in acumen non producto, sporangio ovali, non subgloboso, praeter staturam satis superque diversum.

Phascum Flörkeanum.

Plantae minutissimae, simplices, gregatim crescentes, luridae, statura iis *Ph. cohaerentis* proximae.

Caulis fere nullus.

Folia infima breviora, patentiora, superiora longiora, erecto-patentia, sporangium parumper superantia, omnia ovato-acuminata, uninervia, nervo valido, saturate colorato, in acumen longius, fere $\frac{1}{3}$ folii emetiens, producto, integerrima.

Seta brevissima, recta, basi bulbillo terminata, ipsa majori.

Sporangium exacte ovatum, erectum, immersum.

Calyptra ut in congeneribus.

Genitalia feminea abortiva pauca, paraphysibus vix ullis, mascula . . .

Obs. Cum nulla alia specie certe confundendum. Attamen foliorum directione et totius stirpis parvitate *Ph. axillari* quodammodo simile. Forma foliorum ad *Ph. cuspid.* aliquantum accedit, sed acumen multo longius, folia non conniventia; ut de minutie nostrae plantae nil dicamus. Hac vero cum

Ph. cohaerenti H. taliter qualiter convenit. Sed in nostra specie folia non ovato-lanceolata, sed ovato-acuminata, nec erecta, sed patentia, nervo non obscuro, sed satis valido atque conspicuo (quo etiam a *Ph. axill.*, nervo gaudente evanido, recedit), sporangium denique minime subglobosum, sed exacte ovatum.

*Gymnostomum caespiticiu*m.

Planta minuta, vix semiuncialis, caespitosa, lurida.

Caulis subsimplex, strictus, erectus.

Folia inferiora patentia, suprema erecta, omnia lanceolato-subulata, canaliculata, mutica, uninnervia, nervo excurrente, integerrima, siccitate strictissima.

Seta brevissima, non nisi dentis foliis perichæthialibus conspicienda, recta.

Sporangium immersum, aequale, erectum, minutum, cyathiforme, absque ullis sulcis l. striis laevissimum, ore incrassato.

Columella, decusso operculo, sporangii ori aequalis.

Operculum e planiuscula basi rostellatum, rostellum tenue, longiusculo, incurvo.

Calyptra dimidiato-submitraeformis, fissis in laciniis plures (singula fissura tamen altiore), inferne pallida, apice fusca.

Genitalia . . ., teste *Schwægrichenio* inventore, monoica.

Obs. Cum *Gymn. lappon.* quidem species plurimis convenit notis. Tamen ab eo distinctissima. Statura nostro dimidio, et ultra, minor, habitus luridus, caules subsimplices, qui in illo, bene monente *Smith.*, „saepius ramosissimi”. Utriusque folia dis-

similia, in *Gymn. caespit.* ita brevia, ut siccitate minime tortilia evadere queant, sed semper strictissima observentur. Maximi tandem momenti et plane irrefutabilem utrumque muscum discernendi praebet notam ipsius sporangii ratio. In *G. lapp.* sporangium subturbinato-cyathiforme et ita, uti habet *Smith*, „medio contractum“, in *G. caespit.* exacte invenitur cyathiforme, l., si mavis, ovato-truncatum, diametro nullo non loco a basi ad os crescente. Denique in *G. lapp.* quod pulcherrimum praebet criterium diagnosticum, sporangium longitudinaliter sulcatum, subexsertum, in nostro laevissimum, plane immersum. (Operculum in utroque musco eadem gaudet forma atque figura; vix ita prorsus calyptra, quam in *G. lappon.* distincte dimidiatam reperimus). E foliis muticis, nec piliferis, et seta brevissima cum nulla alia hucusque descripta novam hanc confundes speciem.

Gymnostomum acaule.

Tab. nostra VI. ff. 4—8.

Plantæ minutissimæ, Phasc. pilif. non male referentes, solitariae, sparsae.

Caulis simplicissimus, fere nullus; sed statim supra radículas, into immersas,

Folia elevantur concava, arcte imbricata. Extima ovata, interiora oblonga, omnia nervo valido, desinente in pilum canum, longitudinem folii circiter emetientem, instructa, margine, ut et ipso pilo integerrima.

Seta brevissima, non nisi demtis sporangium obvelantibus foliis observabilis.

Sporangium subglobosum, fuscum.

Operculum convexo - rostellatum, rostello recto, obtusiusculo.

Calyptra mitraeformis, in plures lacinias fissa, fissura una praevalente.

Genitalia feminea abortiva pauca, mascula . . . , procul dubio in diversa stirpe.

Obs. *Gymn. pulvinato* proximum, sed diversissimum plantulis solitariis, sparsis, nec pulvinatim congestis, caule subnullo, simplicissimo, qui in illo divisus, operculo denique rostellato.

Grimmia crinita (v. Add. et
Emendd.)

Planta minuta, caespitosa, tertiam unciae vix
exsuperans.

Caulis plerumque divisus, erectus, strictus.

Folia erecta, oblonga, nervo valido et apicem
diaphanum, qui reliquo folio saepe longior, per-
currente instructa, integerrima, suprema sporan-
gium, attamen conspicuum, subaequantia.

Seta brevissima, tota immersa, superne curva-
ta, oblique inserta

Sporangio ovato, siccitate tantum longitudina-
liter sulcato, madido omnino laevi (contra *Brid.*),
ore coarctato.

Operculum breve, conicum, obtusum, levissi-
me medio incurvum.

Peristomii dentes (16 lati), inferne varie per-
tusi, superne subfissi.

Calyptra mitraeformis!

Genitalia procul dubio monoica.

Grimmia aciphylla.

Wahlenb. in *N. A. holm.* 1806. p. 133. t. IV.
f. 1. (*Weiss.*).

Caulis simplicissimus, brevissimus.

Folia oblongo - longius acuminata, erecto - patentia, stricta, margine inferne reflexa, superne (versus acumen) insigniter inflexa, integerrima (nervo excurrente). (Perichaetialia tantum paulisper elongatiora, caeterum communibus simillima.)

Seta 2 - ad 3 - lin., superne dextrorsum torta.

Sporangium subovatum (longitudine diametrum minime ter emetiens), subaequale.

Operculum conicum, breve, rectiusculum, l. subobliquatum.

Annulus vix ullus.

Peristomium singulare. Dentes 16, inferne omnes connexi, post lapsum operculi primum leviter torti, albidi, transversim striati, linea quoque longitudinali medio notati, in qua inter strias transversales saepius divisi, ut subintegri tantum nuncupandi, caeterum conniventes, angusti.

Calyptra ex *Wahlenbergio* subulata, dimidiata, s. altero latere fissa.

Obs. Habitu et statura quodammodo similis *Grimm. Starkeanae*, characteribus diversissima. *Dicr. latifolio* vero ita simillima, ut pro eadem specie forte habebis. Aegre itaque genere ab illo separavimus, et vix sane

fecissemus, nisi innixi essemus auctoritati virorum acutissimorum, *Wahlenbergii* et *Hedwigii*. Folia in ambobus muscis fere eadem, sunt enim et in *Dicr. latif.* margine inferne reflexa, superne inflexa; forma eorum congruens, sed pagina folii superne ad excedentem nervum in *D. latif.* evidentius evanescit, ut hujus folia apiculata, *Gr. aciph.* acuminata dicenda. Sporangium quoque brevius in *Gr. aciph.*, non ellipticum, ut in *D. latif.*, sed ovatum; operculum minus e convexa s. conica basi acuminatum s. rostellatum, sed potius conicum, levissime medio obliquatum. Peristomii dentes in *D. latif.* evidenter bipartiti, in *Gr. aciph.* subintegri. Magnitudine vero et, quantum ex hac penderet, facie utraque stirps multum diversa. *Gr. aciph.* trunco simplici, nec saepius diviso, duplo, triplo minor, seta duplo breviori. Denique folia in *Gr. aciph.* saturatius viridia, et superius insignius involuta, sicca quoque magis tantum apicibus incurva, quam crispata. Ut ut vero sit, uterque muscus omni sane posteriorum observatorum attentione dignissimus. — An haec nostra *Grimmia* forte *Bryum minutum* Dicks.? Cf. supra ad *Gr. Stark.* Adnn.

Adumbratiunculam hanc propriam conscripsimus, antequam *Wahlenbergianam* vidimus. Mire in essentialibus omnibus nobiscum amicus conspirat; tamen forte nec inutiles censendae hae nostrae Obs. de memorabili et quodammodo dubia stirpe.

Grimmia Seligeri.

Plantae gregatim crescentes, 2-, 3-lineares, saturate virides.

Caulis exiguus, simplicissimus.

Folia erecta, stricta, anguste elongateque lanceolata s. lanceolato-subulata, uninervia, nervo excedente, integerrima, saturate viridia.

Seta bilinearis, pallida, superne torta.

Sporangium fuscum, subpyriforme, erectum.

Operculum convexo-rostellatum, rostello incurvo.

Peristomii dentes latiusculi, rubri.

Genitalia . . . dioica?

Obs. Intermedia quasi species inter *Grimm. pusill.* et *calcar.* Ab illa, cujus statura, non colore, scilicet multo saturatiore, differt foliis anguste elongateque lanceolatis, erectis, strictis, nec e parumper dilatata basi setaceis l. subcapillaribus, erecto-patentibus, subflexuosis et siccitate tortilibus, ab hac foliis non ex ovato subito anguste acuminatis. A *Grimm. recurvata* foliorum forma, seta madida recta, forte et sexu distincta; nam verosimiliter nostra e *Weissiis* Hedw.

Grimmia trifaria.

Plantae gregariae, 3-, 4-lineares, nigro-virides.

Caulis brevis, simplex, inferne nudiusculus.

Folia erecto-patentia, stricta, rigida, trifariam imbricata, canaliculata enim et ita vaginantia, lanceolata, uninervia, nervo satis valido, excurrente, integerrima, obtusiuscula.

Seta recta, superne incrassata et tortilis.

Sporangium subcyathiformi-pyriforme, breve, ore amplo.

Operculum convexo-rostellatum, rostello longo, obliquo-subincurvo.

Peristomii dentes reflexiles.

Genitalia . . . dioica?

Obs. Pulcherrima species, quae ab affnibus omnibus tantum differt, ut accuratior notarum collatio prorsus supervacanea evadat.

Grimmia cylindracea.

Habitus Hypnorum antiquorum. Facies fere *H. serpentis* et affinium.

Caulis repens, ramosus.

Rami breves, perpendiculares, ramosiusculi, ramulis erecto-patentibus.

Folia ovato-acuminata, acumine ipso folio longiore, margine plica reflexa, subpatentia, apicibus subrecurvis, uninervia, nervo valido excurrente, integerrima.

Seta uncialis, erecta, torta, laevis.

Sporangium cylindraceum.

Operculum conicum, subobliquum.

Peristomii dentes subulati, breves, incurvi.

Calyptra . . . verosimiliter ut in *Grimm. filiformi*.

Genitalia . . . , procul dubio dioica, *feminea* alaria.

Obs. Nova haec species pro *Pterigynandro* absque nomine triviali missa a rev. *Seliger*. Duo peristomio completo instructa specimina anxie ipsi investigavimus; quo satis putamus nobis hoc persuasum esse, ut nullum plane adsit internum peristomium, quod in pluribus certe exemplaribus sagaciss. inven-

tor aequè minus detexit, cum pro genuino *Pterigynandro* speciem nobis miserit. Calyptra quidem nondum visa, sed ex analogia vix dubium, quin sit calva nec paraphysiphora. In madido musci statu folia acuminibus suis subpatentia stirpem primo intuitu a congeneribus satis distinctam exhibent. Sub microscopio foliorum forma toto coelo ab ea Grimm. *catenulatae* discrepans.

Didymodon longirostrum.

Plantae caespitosim crescentes, inferne rufae, superne pallidae s. laete virides.

Caulis 1-, 2-pollicaris, innovatione divisus.

Folia sparsa, rigidiuscula, e latiori, et in summis vaginanti, basi subulata, canaliculata, marginibus inflexis, uninervia, nervo obsoletissimo, latissimo, convexissimis vitris apice lenissime serrulata, omnia homomalla.

Seta uncialis, madida varie flexuosa, sicca stric-
tiuscula.

Sporangium laeve, ellipticum, subcernuum.

Operculum conico-longius rostratum, sporangium subadaequans, rostro subincurvo.

Peristomii dentes 32 distincti, per paria approximati, medio levissime incurvi.

Calyptra subulata, dimidiata, laminae margine integerrimo.

Genitalia non vidimus. An hermaphrodita, l. monoica l. dioica?

Obs. Habitus prorsus dicranoidens, et inprimis cum *Dicr. longifolio* ita summe convenit, ut ne cum eo confundas anxie caveas. Praeter totam staturam, magnitudinem, foliorum directionem et longitudinem, sporan-

gio quoque et operculo ambo musci eximie conveniunt, diversissimi peristomio, scil. quo gaudet Ditr. *longif.* e dentibus 16 vix supra medium divisis, insigniter incurvis, constructo, nostrum omnino tali, quali *Didymodonti* convenit. Sed insigni species est exemplo, ut artificialiter quidem satis qualicumque modo adhuc bene muscorum genera plurima, peristomio simplici gaudentia, separentur, natura vero limites a nobis ei praescriptos saepe saepius vili pendeat. Cum Ditr. *flagellari* minoris momenti nostrum habet similitudinem, nec vix unquam cum Ditr. *flexuoso*, l. cum *Didym. capillaceo*, l. alia sui generis nota specie ipsum confundes.

Dicranum incurvum.

Plantae exiles, habitu *Dicr. viriduli*, sed pallidiores.

Caulis bilinearis, vix ultra, simplicissimus, declinatus.

Folia pallide viridia, inferiora breviora, superiora longiora, tamen omnia oblongo-acuminata, uninervia, integerrima, caeterum scalpelliformia, verticalia, disticha, basi superne duplicata, duplicatura vaginante.

Seta bi-, tri-linearis, pallida.

Sporangium obovatum, subcernuum, e seta superne incurvata nutans.

Operculum dimidia sporangii longitudinis, convexo-rostratum, rostello rectiusculo.

Calyptra dimidiata.

Genitalia feminea terminalia, mascula a nobis quidem non observata, procul dubio vero gemma-cea, alaria in eadem planta.

Obs. An distincta sit a *Dicr. viridulo* species, quod statuere suadent habitus et sporangium, pro certo affirmant vivae stirpis autoptae.

Dicranum saxicola.

Plantae gregatim crescentes, tenues, coloris pallidi.

Caulis simplicissimus, brevissimus.

Folia pauca, sparsa, erecto-patentia, e latiori et vaginanti basi longe angustaque lineari-setacea, uninervia, nervo satis valido, excurrente, integerrima, siccitate tortilia.

Seta longiuscula, madida cygneum in modum (ut in *Dicr. cygneo* Hedw.) arcuata, sicca strictiuscula.

Sporangium ellipticum, laeve.

Operculum conico-longius rostellatum, rostello recto, sporangii longitudinem adaequante, l. parum superante.

Peristomii dentes 16, vix infra medium bifidi, cruribus inflexis.

Genitalia procul dubia dioica.

Obs. Habitu in sicco statu, quo seta strictiuscula, cum *Grimm. controversa* quodammodo convenit. Cum sui generis vix ulla unquam alia specie distinctissimam hanc confundes.

Dicranum gracilescens.

Plantae caespitosim crescentes.

Caulis sesquiunciales, erecti, subramosi, ramis fastigiatis, gracillimi.

Folia inferiora ferruginea, superiora laete viridia, sparsa, exacte lanceolata, subflexuosa, undique patentia, siccitate incurva et varie crispabilia, uninervia, nervo excurrente, apice serrulata.

Seta solitaria, uncialis, subflexuosa, superne sensim incrassata, siccitate tortilis.

Sporangium ovatum, subcernuum, absque evidenti struma.

Operculum conico - rostratum, sporangii fere longitudine, rostro incurvo.

Annulus, prout videtur, nullus.

Peristomii dentes ultra dimidium divisi, cruribus longis, inflexis.

Calyptra dimidiata.

Genitalia . . . procul dubio dioica.

Obs. Proximum sane *Dicr. pellucido*, a quo vero omnino differre videtur: 1) caulibus multo tenuioribus, gracilioribus; 2) foliorum figura et directione (in nostro enim patentia solummodo sunt, nec recurva); 3) praecipuis sporangio duplo longiore et angustiore, ovato (nec obovato - subgloboso), deoperculato et exsiccato-cylindraceo - subturbinato, subaequali; 4) dentibus peristomii

ultra $\frac{2}{3}$ divisis, nec ad medium tantum fissis. — Convenit tandem nobiscum amiciss. Swartz, ut nostra stirps sit *Bryum lineare* Dicks. t. 8. f. 2. (*Trichost. Smith.*). Dicksonianum muscum olim (in *Diar. bot. Schrad.* 1800. 2. p. 177.) Swartz. eundem pronuntiavit cum *D. pelluc.*, sed vix huic opinioni porro amicus adhaeret. In *Trich. lineari*, ab ipso Dicksono cum Swartzio communicato, nobis benigne transmissio, folia forma et longitudine (ut et serraturis, a Smith. denegatis) convenientia vidimus cum iis *D. pelluc.*, directione cum iis *D. nostri gracilesc.* Hujus quoque reliquarum partium ratio et totus habitus! Sed peristomii dentes vix ultra medium fissi erant, nec ex Hedwigii norma, quod Smith affirmat, stirps *Trichostomum* esset. Tamen vix amplius de synonymo Dicksoniano dubitandum.

Dicranum rupestre.

Cauliculi 3-, 4- ad 6-lineares, divisi, foliosi.

Folia communia lanceolato-subulata, subfasciculata, inferiora undique patentia, superiora subhomomalla, obsolete uninervia, integerrima; perichaetialia e lata vaginanti basi subulata.

Setae interdum gemellae ex uno perichaetio, caulis longitudine, rectae, strictae.

Sporangium madidum obovatum, subaequale, ore contractiusculo, exsiccatum subhemisphaerico-cyathiforme, aequale, in omni statu absque nullo apophyseos l. strumae vestigio.

Operculum subhemisphaerico-rostellatum, rostellum subobliquo.

Peristomii dentes inflexi.

Calyptra . . . absque dubio dimidiata.

Genitalia . . . procul dubio dioica.

Obs. Species oculo nudo habitu *Dicr. cerviculati* §. *pusilli*, characteribus, si accuratius investigates, quasi intermedia inter *Dicr. varium* et *Dicr. crispum*. Sporangium enim subaequale, breve, operculi rostro subrecto; folia multo magis angusta, quam in *D. vario*. Horum nervus ita fere obsoletus, ac in *D. cerviculati* utraque varietate et in *D. crispo*. Caule folioso, foliis patentibus, lan-

œolato - subulatis (nec lanceolatis, acutis, erecto - patentibus), sporangii forma ab omnibus, quas vidimus, Dier. *varii* diversis formis diversissima videtur, et statim inarmato oculo dignoscenda. Dier. *fulvellum* quoque Dicksonianorum esse nequit. Foliis non distichis, nec basi vaginantibus, a Dier. *crispo*, sporangio absque ullo apophyseos l. strumae vestigio a Dier. *cerviculato* et ejus var. *g.*, perquam differt. Sporangii cum operculo fere forma ut in Grimm. *trifaria*.

Dicranum Starkii.

Plantae gregatim crescentes.

Caules unciales, sesquiunciales, adscendentes, innovatione divisi, et ita ramosi, ramis strictis.

Folia e basi exigua latiori, vaginanti, anguste subulata, uninervia, nervo excurrente, integerrima, l. ad summum apicem uno l. altero denticulo, maxime augentibus vitris tantum conspiciendo, instructa, sparsa, curvata et ita homomalla.

Seta solitaria, uncialis, stricta, superne in sporangii strumam sensim dilatata.

Sporangium obovato-cylindraceum, cernuum, basi interne strumosum.

Operculum conico-rostratum, sporangii longitudine, rostro incurvo.

Annulus adest.

Peristomii dentes bifidi, inflexi.

Calyptrae dimidiatae.

Genitalia . . . sec. rev. Stark. monoica essent autnmanda; sed forte solummodo ex affinitate quadam hujus cum Dicr. *strumif.* vir cel. ad idem Hedwigianorum generum suam plantam pertinere decrevit. Secundum totum habitum dioica stirps suspicanda videtur.

Obs. A Dicr. *strumif.* fere omnibus differt notis, foliis homomallis, integerrimis (nec undique vergentibus, siccitate crispabilibus et

serrulatis), verosimiliter quoque sexu, et, sec. Hedw., annuli praesentia. A. Dicl. heteromallo, cujus (et inprimis Dicl. curvati H.) quodammodo habitum mentitur, evidentissima struma, sporangio longiusculo distinguendum. A Dicl. falcato sporangio ob-
oyato-cylindraceo aequae differt, nec foliis gaudet longissime subulatis, falcatis, serrulatis, sed basi amplioribus, acumine tantum subuliformi, caeterum curvatis quidem (sed non falcatis), et integerrimis. Tota quoque structura diversissima. Pluribus jam memoratis notis, sporangio duplo longiore, caule ramoso, foliis insigniter curvatis, homomallis, nec subhomomallis, a Dicl. cervicuiato recedit. Quod vero idem sit cum Dicl. uncinato Smith. (Bryo Dicks. t. II. f. 8.) ex verbis et figg. Dicksoni suspicamur quidem, nec obstarent folia a Smithio enervia dicta, cum saepissime nervus (licet vitris convexioribus esset evidentissimus) et hunc auctorem effugerit. Sed cum specimina huius musci nondum viderimus, ex regula Ehrharti melius esse duximus, novum stirpi imponere nomen, quam hoc l. illo jamjam adhibito diversam forte plantam insignire.

Neckera decipiens.

Caespites arborum corticibus? adpressi, lati.

Caules decumbentes, ramosi, ramis brevibus, declinatis, ramulis subfasciculatis.

Folia dense imbricata, superiora ramulorum adpressa, inferiora subpatentia (unde quodammodo homomallus habitus exoritur), ovali-acuminulata, concava, inferne margine reflexa, uninervia, nervo supra medium evanescente, apice lenissime serrulata.

Seta recta, torta, uncialis et supra.

Sporangium ellipticum, interdum erecto-cernuum, laeve.

Operculum vix $\frac{2}{3}$ deoperculati sporangii emittens, conico-rostratum, s. subconicum, levissime subincurvum, obtusiusculum.

Annulus . . . observatus nullus.

Peristomii exter. dentes 16, breves, incurvi, pallidi, transversim striati, ad strias nodulosi; *inter.* cilia totidem alternantia, subaeque longa, filiformia, albida, transversim striata.

Columella peristomia exsuperans, filiformis.

Calyptram et

Genitalia . . . non vidimus.

Obs. Sui generis species inter eas, quas novimus, distinctissima; habitu *Grimm. orni-thopod.* magis quam *Grimm. filiformi* accedens, ab illa foliis inferne uni-, nec binerviis (praeter formam), ab hac foliis nervo instructis, nec destitutis, statim dignoscenda. Et vix inter *Leskias* et *Hypna* simile quid.

Hypnum Wahlenbergii.

Plantae per caespites laxos crescentes.

Caules sesquipollicares, erecti, innovationibus aucti longissimis, tenuibus, aequae erectis.

Folia inferiora tomento ferrugineo abscondita, breviora, omnia laxè disposita, erecto - vel sub-patentia, cordato - triangularia, acutiuscula, uninnervia, nervo sub summo apice evanescente, serrulata.

Seta solitaria, $1\frac{1}{2}$ - , 2 - uncialis, subflexuosa, superne arcuata, siccitate tortilis.

Sporangium breve, turbinatum, pendulum, fuscum.

Operculum convexo - acuminulatum.

Annulus ?

Peristomii *exter.* dentes 16 subulati, inflexi, *inter.* membrana superne in lacinias divisa inaequales, majores cum dentt. *perist. ext.* alternantes, carinatas, perforatas, interjectasque minores filiformes.

Ecalyptra

Flores masculi in diversa stirpe terminales, capituliformes.

Hypnum reflexum.

Caules decumbentes, pinnatim, bipinnatim ramosi, ramis brevibus, subsimplicibus, recurvis.

Folia laxius disposita, sparsa, alterna, in caulibus patenti-divergentia, subreflexa, in ramis patentia, suprema subhomomalla, cordato-longius acuminata, inferne margine reflexa, uninervia, nervo ad apicem usque pertingente, serrulata.

Seta recta, vix torta, uncialis, scabriuscula.

Sporangium breve, obovatum, cernuum, laeve.

Operculum breve, conico-acuminulatum, acutissimum.

Annulus

Peristomii *exter.* dentes 16 subulati, incurvi, transversim striati; *inter.* membrana superne divisa in lacinias inaequales, majores cum dentt. *perist. ext* alternantes, carinatas, perforatas, interjectasque minores filiformes.

Calyptra

Flores masculi in diversa stirpe alares, gemmiformes.

Addenda et Emendanda.

- P. VI. lin. 10. loco: *ihrer* l.: *ilwe*
- XXVII. post lin. 14. insere: Ejusd. Botanische Bemerkungen und Berichtigungen. Leipz. 1807. 8.
 - XXVIII. post lin. 13. insere: Ejusd. Primitiae florum salisburg. Francof. ad M. 1792. 8.
 - 1. lin. ult. ad calc. adde: T. II. f. 2.
 - 10. lin. 1. lege: *adhibitum*
 - 17. lin. 11. lege: VII.
 - 24. lin. 16. lege: *ideoque* et postea: *genus a muscis*
 - 57. lin. 20. loco: *hanc* lege: *hunc*
 - 64. lin. 5. lege: *alibi*
 - 65. ad Ph. *crisp.* H. observe: Ph. *multicapsularis* Smith. (*crisp.* Engl. Bot., *sphaerocarp.* Abb.) ex specimine Turneriano multum a nostro diversum, foliis gaudens evidenter serrulatis; nec forte Ph. *cuspid.* Schum. huj. l., cum rem vix rite recordemur. — Ph. *crisp.* Sw. Disp. vero, Ipso indicante et speciminibus comprobante, mera Ph. *crisp.* var.

p. 67. observe: postquam *Ph. curvis*. D. genuina vidimus exemplar, non folia longe apiculata (uti *Ph. pilif.*) ei esse comperimus, sed revera tali modo tantum acuminata, nervo vix brevissime excedente, uti *Ph. cusp.* et imprimis var. β . Cum porro etiam incurvam nunc in utraque *Ph. cusp.* var. setam reperimus (ut non, quod statuimus, *Ph. pilif.* a *cusp.* setae incurvatione discernendum), non nisi var. *Ph. cuspidati* habere possumus *Ph. curvisetum*. Essentialibus omnibus convenit, magis tamen cum β . *max.* (praeter staturam), quam cum α .; nec, quod habet Turn., „caps. propter pedicellorum curvaturam extra folia positae” distinguitur. Capsulae utique immersae sunt, rectius dicente ipso Dicks. „caps. erectis immersis; — pedunculo perpendiculari” l. Smith. „caps. foliis obvoluta”. Ipse Dicks. *Ph. cuspidato* β . nostro optime „proximum” dicit, addens: „differt autem pedunculo curvato, caule minus ramoso, foliis inferioribus paucioribus, statura paulo minore”. Caeterae omnes hic memoratae notae vix essentielles, et curvata seta, quod diximus, etiam utroque *Ph. cusp.* propria. *Ph. cusp.* An. de Cienc. n. 14. ex specimm. satis refert hocce Dicksoni *Ph. curvisetum*.

— 79. deleatur: *Gymnost. decipiens*. Nimis enim fidentes Schwaegrichenii auctoritati, qui pro *Gymn. pulvin.* stirpem misit, et non nisi in paucissimis et junioribus plantis (quales unicas habuimus) arte solventes operculum, quod tum dentes peristomii secum rapuerat, in errorem sane non levem incidimus, pro *Gymnostomo Grimmiam* describentes! Post hac erroris gnari facti sumus et nostram stirpem agnovimus esse *Grimm. crinitam* Brid.

Suppl. (specim. a fonte *Vaucluse*, uti supra monuimus, ipse Cel. *Brid.* nobiscum communicavit).

- p. 83. post lin. 15. adde: Cum hoc Schultiziano reliquis omnibus partibus exaete convenit *Gymn. minutulum* Schleich. Cent. 5. n. 8.; sed operculum non observavimus.
- 86. lin. 2—4. Observes: postquam ipsi originalia *Gymn. Davalliani* Smith. (*König et Sims Ann. of Bot.* 1. p. 577) exempla lustravimus, compertimus speciem toto coelo diversissimam, immo nec similem esse *G. trichodi*! Sunt ei habitus et fere folia *Gymn. trunc.*, operc. *Gymn. japon.* H., et nova omnino videtur.
- 105. superne observes: postquam specimen (junius tamen) Br. *Griffithiani* ipsi viderimus, ex habitu quidem *Splachnum* omnino stirpem judicare debemus, attamen, uti videtur, satis distinctum a *Spl. Froel.* foliis spatulatis (non lingulatis), sporangio aequali, apophysi vix ulla. Male vero Smith plantam foliis enerviis gaudentem describit. Sunt revera ut in *Spl. Froel.* nervo sub summo apice evanescente instructa folia, structura sua prorsus cum iis *Splachnorum* congruentia, etiam margine integerrima.
- 122. lin. 17. lege: Egregia
- — lin. 23. lege: Icon in
- 123. ad *Trich. sciur.* observes: satis curiosum adhuc evadit synonymum *Hypn. penicilliforme* Schleich. Cent. 3. n. 53., „ad rupes duriores passim in *Vallesia*” lectum. Surculis crassioribus unice distinctum invenimus!

p. 133. post lin. 13. insere (cf. Add. et Emendd. ad p. 79.):

- 4—5. Gr. *crinita* Brid., foliis oblongis; sporangio ovato; seta lateraliter inserta; dentibus varie pertusis.

Gymnost. *pulvinatum* Schwaegr. miss.

In sax. pr. *Herbip* Schwaegr. Vere. 24. (in herb. *Web. patr.* sub nomine Phasci *pilif.* datum a Cl. *Borckhausen* invenimus; procul dubio et haec specimina germanica, sed nullus locus erat appositus. Moneamus quoque, quod *Ratisbonensia* Flörkeana Gr. *plagiop.* exempla (v. supra) non ipsi viderimus. Num forte huj. l. sint?)

Foliorum apex diaphanus et in hac, uti in Gr. *plag.*, ex folii pagina et nervo constare videtur. — A Gr. *plag.*, cui seta, sporangio, operc., perist. satis quidem exacte convenit, facie ex foliorum omnium, et inferiorum, longissimis apicibus incanis, nec summorum tantum brevioribus, reliquorum vix utilis, statim dignoscenda. Praeterea foliis duplo, triplo angustioribus, longioribus, nec, quod habet *Brid.*, ovatis, (qualia exacte sunt in Gr. *plag.*), sed oblongis, summopere differt, nec l. cum hac l. reliquis hujus subdivisionis speciebus unquam confundenda esse videtur.

- 137. lin. 17. lege: *illa loco: ultima*
- 159. lin. ult. lege: *monoicum l. dioicum.*
- 162. ad Dict. *incurvum* observes: postquam anglica exempla D. *tamarindif.* observavimus, nostrum esse plane idem comperimus. Nomen Anglorum antiquius erit restituendum.

p. 198. ad D. *tort.* adde: misit quoque amiciss.
Funck sub nomine *Didymod. cylindrici* n. sp.

— 199. lin. 19—22. observes: ex specim. ab ipso
Dicks., quod Swartz benigne commun.,
Bryum linoides omnino *Barbula*, nec *Tri-*
chost. methodi Hedw. (Dicran. nob.), male
Hedw. in Specc. p. 114. et Smith. peristo-
mium „non contortum” dicentibus. Opti-
me jam in litt. ad Swartz. Turnero monente,
minime differt hocce Br. *linoides* a Tort. *api-*
culata Turn. hib.; cf. de hac Adun. p. 210.
et heic in *Add.* ad p. 208—210.

— 205. lin. 8. loco: *suberecto* lege: *subaequali*.

— 208—210. de Barb. *unguicul.* observe: 1) *Bryum*
aristatum Dicks. ex specim. auctoris pror-
sus idem cum Tort. *apiculata* Turn., quae
nullo modo sane differt a Tort. *mucronula-*
ta Sw.; 2) Tort. *unguicul.* Sw. olim (*Barb.*
H.), quam nunc Tort. *decipientem* Swartz
nuncupat in litt., ab illa planta non aliter
differt, quam diximus, ut Tort. *apicul.* Turn.
differret a Barb. *unguicul.* H.; nec nobis spe-
cie; 3) Tort. *unguicul.* Sw. nunc e *Suec.* no-
bis solummodo gigantea Tort. *mucronul.*
Ipsius videtur.

— 209. lin. 16. loco: *ab* lege: *ob*.

— 212. post lin. 3. insere:

6—7. B. *crocea* Web. et Mohr, caule elon-
gato, ramoso; foliis lanceolatis, acutius-
culis, margine vix hinc inde refl. xiusculis,
subpatentibus, strictis; operc. sporangii
longitudine.

Tort Brid. Suppl.

In m. *Weisner Hass.*, in *Salicib.*; Jun.
Brid. 24.

Cum *B. unguicul.* ejusque affinibus exoticis, *apicul.*, *lanceol.*, *striata* H., nullam habet similitudinem, cum nec acuminulata nec apiculata foba. Etiam a BB. *fall.* et *revol.* foliorum fig., margine vix reflexo, directione toto coelo discrepat. Nec aliam exoticam novimus speciem, cum qua esset comparanda, nisi Barb. *paludosam* Schleich. Cent. 3. n. 22. Ab hac vix nostram distinguimus. Folia enim illi vix paulisper acutiora, evidentius interdum sub summis augmentis apice quasi denticulata, statura paulo altior. Perichaetialia folia ambabus superne bonis lentibus serrulata. Sed Schleicheriani musci operculum nondum vidimus; quare nil ex tripode. Caeterum ex *Helv.* suam quoque habuisse Brid. testatur. Pessume folia descripta apud Brid.

- p. 214. lin. 9. dele: *crocea*,
- 229. lin. antepenult. lege: *subexcurrente*
- 233. lin. 9. adde: *Orthotr. striatum* Crom. Nachlief. 2. n. 8.
- 244. lin. ult. lege: *transverse*
- 244. 245. dele totam quantam Lesk. *inclinatam*:
 Serius enim misit specimina Pohl. suae *inclin.* ipse Swartz, in quibus perist. int. *Bryi*, process. majorr. 16 carinatis, perforatis, cum dentt. perist. ext. alternantt., interjectis minorr. filiff. subternis (exacte ut in Pohl. *intermedia* Brid. — t. X f. 6. nostra) evidentissime vidimus. Tam demum quoque in Pohl. *inclin.* Bland. muscc. exss. n. 77. et Crom. Nachlief. 2. n. 11. idem perist. reperimus; et vix ac ne vix quidem amplius dubitamus, quin omnes tres stirpes *P. inclin.* Sw., Bland. et Crom. (certe iden-

tlcae), quibus (quantum ex imperfectis specimen. videre nobis licuit) accedunt Mn. *turbin.* et Pohl. *inclin.* Schultz. *starg.*, revera pertineant ad nostrum *H. intermed.* (cujus sane ab ipso Swartz. exempla habemus, cum exemplis Ejus Pohl. *inclin.* ad amussim congruentia).

p. 250. lin. 19. a verbis: „Cum Leskiis” ad p. 251. lin. 2. verbum: „distinguitur” dele omnia et lege: cum Leskia insequenti multum quoque affinitatis habet, sed longe tenerior est; et notis in diagnosibus exhibitis praeterea distinguitur.

— 267—282. ex errore typographi expressae sunt in plagula decima septima loco pagg. 257—272.

— 273. lin. 15. lege: a perill.

— 281. lin. 10. loco: *Antecedente* lege: *H. carneum*

— — lin. 12. loco: *antecedentem* lege: *H. carneum*

— 282. ad n. 11. cf. Emend. ad pag. 244. 245. — Ita quoque haecce species foliorum forma ludit, ut vix sciamus, an diversum reapse *H. bor.*, et utrumque cum *HH. lac.* et *pall.* ab *H. caesp.*

— 287. lin. 3. lege: *Annulus compositus*

— 292. lin. 16. lege: *temere*

— 389. lin. 23. lege: *homonyma*

— 395. lin. 5. lege: *Flore.*

— 401. lin. 19. lege: *minutiem*

Sub ipsius hujus plagulae impressione tandem accepimus maximum Florae nostrae muscorum decus, scil. *Cinclidium stygium* Swartz., in *Diar.*

bot. Schwad. 1801. t. p. 27 sqq. descriptum ac tab. II. optime delineatum. Muscus, cujus character genericus in peristomio duplici, interiori membrana conica, 16 striis divisa unaquaque parte, media longitudine, foramine ovali dentibus opposito instructa consistit, quique, habitu gaudens Hypnorum, *Mnium serpyllifolium* Linnéo constituentium, imprimis *H. aciphylli*, foliis utitur obovato-acuminatis, marginatis, integerrimis, nervo excurrente, sporangio subturbinato-oblongo, pendulo, operc. convexo-mamillato, calyptra cucullata, floribus demum hermaphroditis terminalibus, hucusque solummodo in Sueciae profundis paludibus lectus erat (nobis olim ipsis occurrebat pr. Upsal. in consortio Hypnor. scorpioid., adunci, trifarii, straminei). Indefesso studio lyncei muscorum collectoris, Cl. Blandovii, nunc quoque inventus in terra megapolitana, scil. in prat. paludosis pr. Waren — auf der Falkenhüger Wiese am Werderholze — varius.

I n d e x.

(Rectis litteris impressa nomina synonymorum l.
in Obs. memoratarum specierum.)

*A*crostichum

alpinum	27
hyperboreum	27
ilvense	28
Marantae	29
septentrionale	39
spicant	43
Thelypteris	31

Adiantum

Capillus	46
----------	----

Afzelia

pulvinata	110
crispa	134

Andreaea

alpina	383
petrophila	384
Rethii	386

<i>rupestris</i>	384
rupestris	386

Anictangium

aquaticum	76
caespiticiu	77
ciliatum	78
cirrhosum	238
filiforme	78
lapponicum	77

Anthoceros

crispus	437
lucis	435
multifidus	436
punctatus	436

Arrhenopterum

heterostichum 270.	318
illicebrum	318
turgidum	318

Aspidium

<i>aculeatum</i>	34
<i>alpestre</i>	37
<i>alpinum</i>	36
<i>cristatum</i>	32
<i>depastum</i>	33
<i>dilatatum</i>	33
<i>erosum</i>	33
<i>Filix femina</i>	36
<i>Filix mas</i>	32
<i>fontanum</i>	35
<i>fragile</i>	35
<i>lobatum</i>	35
<i>Lonchitis</i>	35
<i>montanum</i>	38
<i>Oreopteris</i>	31
<i>rhaeticum</i>	33
<i>rigidum</i>	33
<i>spinulosum</i>	33
<i>spinulosum</i>	33
<i>thelypteroides</i>	32

Asplenium

<i>Adiant. nigr.</i>	40
<i>alternifolium</i>	42
<i>Breynii</i>	41
<i>Ceterach</i>	25
<i>cyathioides</i>	37
<i>fontanum</i>	35
<i>germanicum</i>	41. 42
<i>lanceolat. Huds.</i>	41
<i>lanceolat. Hoffm.</i>	41
<i>Ruta murar.</i>	41
<i>Ruta murar. ma-</i>	
<i>gell.</i>	42
<i>Scolopendrium</i>	42
<i>septentrionale</i>	39

spicant

43

Trichomanes?

40

trichomanoides

40

viride

40

Athyrium

<i>Filix femina</i>	37
<i>fontanum</i>	35
<i>Halleri</i>	35
<i>molle</i>	37
<i>ovatum</i>	37
<i>rhaeticum</i>	37
<i>trifidum</i>	37

Barbula

<i>acuminata</i>	209
<i>amoena</i>	210
<i>apiculata</i>	209. 210
<i>harbata</i>	208
<i>brevicaulis</i>	210
<i>convoluta</i>	212
<i>convoluta</i>	136
<i>crocea</i>	481
<i>cuneifolia</i>	207
<i>curta</i>	158. 198. 210
<i>dubia</i>	211
<i>fallax</i>	211
<i>gracilis</i>	211
<i>incerta</i>	210
<i>lanceolata</i>	209. 210
<i>muralis</i>	206
<i>paludosa</i>	482
<i>rigida</i>	212
<i>ruralis</i>	215
<i>setacea</i>	212
<i>stricta</i>	209

tortuosa 205
unguiculata 208. 481

Bartramia

alpina 266
crispa 262
fontana 268
gigantea 264
gracilis 263. 264. 266
Halleriana 264. 265
hercynica 263
incurva 263
ithyphylla 261
latifolia 266
longiseta 260. 261. 266
marchica 267
Menziesii 260. 264
Oederi 266
Oederiana 266
patens 260. 264
pomiformis 260
pomiformis 262
pomif. β . elong. 263
radicalis 261
reticulata 265
sphaerocarpa 267
squarrosa 265
subintegrifolia 265
volcanica 264
vulgaris? 263

Blasia

pusilla 437

Blechnum

boreale 43
onocleoides 43

Botrychium

Lunaria 48
rutaceum 50
virginianum 51

Botrypus

lunarioides 51
virginicus 51

Bryum

aciculare 119
aciculariforme 128
acutum 146
Aegypti 89
aestivum L. 83
aestivum Schreb. 90.
 186
aestivum Weiss. 90.
 200
albicans 230
alpinum 270. 288. 299
androgynum 271
annotinum 270. 281
apocarpum 78. 129
apocaulon 129
argenteum 270. 276
argenteum β . 276
aristatum 210. 481
aureum 274
barbatum 211
bicolor 284
bimum 288
bipartitum 200
Brownianum 95
caespiticiu 270. 284
callistomum 189

capillare	270. 285. 287	hypnoides δ .	113
carneum	279	imberbe?	211
Celsii	200	immersum	172. 187
ciliare	107	incurvum	217
cirratum	135. 214	julaceum	270. 276 bis.
conoideum	271	laterale	266
contortum	107	ligulatum	298
erispatum	135. 143	lineare	468
erudum	290	linoides	199. 481
orbitale	299	longicollum	291
cuneifolium	207	longifolium	190
curvirostrum	136	Ludwigii	287
cuspidatum	295	luteolum	134
cylindricum?	291	lutescens	118
dealbatum	375	marchicum	267
delicatum	270. 279	marginatum	293
dendroides	298	minutum	139. 458
diaphanum	93	mucronulatum	209
ericetorum	215	murale	207
erythrocarpum	279	— β .	208
extinctorium	106. 107	nervosum	213
fasciculare?	89	nigricans	285
fasciculatum	84	nutans	289
filiforme	276	Oederi	266
flavescens	206 bis.	pallens	286
flexuosum	109	pallidum	196
fontanum	268	paludosum	140
Forsteri	148	palustre	183. 272
fragile	156. 169	— β . ramos.	273
fulvellum	187	papillosum	201
glaucum	166	parvulum	194
?graminifolium	204. 300	patens	127
Griffithianum?	105. 479	paucifolium	202
heteromallum	191. 268	pellucidum α .	184
hornum	294	— — β .	183
hypnoides α .	115	pendulum	265. 274
— — β .	118	piliferum	203
— — γ .	117		

polyphyllum	180	strictum	197. 200
pomiforme?	261. 262	subulatum	214
proliferum	297	tenellum	279
pulchellum	279. 280	tepué	200. 209
pulvinatum	110	tortuosum	200
punctatum	296	trichodes	289. 374
purpureum	200	truncatulum	81
pyriforme	88. 274	turbinatum	287
recurvum	266	uncinatum	472
reticulatum	104	undulatum	216. 298
rigidum	212	unguiculatum	209 bis.
roseum	297	vaginale	185
rostratum	296	Varneum	285
rubellum	136	ventricosum	288
rufescens	187	verticillatum D.	83
rugosum	176	verticillatum L.	84
rurale	215	virens	133. 183
schisti	144	viridulum	133. 162
scoparium	174	Weissia	137
sericeum	289	Zierii	270. 275
serpyllifolium	296		
— — α .	296	<i>Buxbaumia</i>	
— — β .	296	aphylla	381
— — γ .	295	caulescens	381
— — δ .	297	foliosa	377
serratum	293	sessilis	377
setaceum	136 bis. 145.		
	214	<i>Carpolepidum</i>	395
simplex	186		
splachnoides	146	<i>Catharinea</i>	
squarrosus	270. 274	Callibryum	216
stellare	294	hercynica	217
stellatum	212	undulata	216
stelligerum	83		
striatum α .	234	<i>Cicclidotus</i>	122
— — α .	230		
— — β .	237	<i>Cinclidium</i>	
— — δ .		stygium	483

<i>Climacium</i>		<i>bryoides</i>	163
<i>dendroides</i>	252	<i>caducum</i>	193
<i>Conferva</i>		<i>callistomum</i>	189
<i>hypnoides</i>	411	<i>carneum</i>	186
<i>Conianthos</i>	396	<i>Celsii</i>	200
<i>Conocephalum</i>	387	<i>cerviculatum</i>	193
<i>Cyathea</i>		<i>cirratum</i>	204
<i>alpina</i>	36	<i>condensatum</i>	193
<i>anthriscifolia</i>	36	<i>crispum</i>	185
<i>cynapifolia</i>	36	<i>curvatum</i>	186
<i>fragilis</i>	36	<i>curvifolium</i>	190
<i>montana</i>	38	<i>cylindricum</i>	202
<i>regia</i>	36	<i>dendratum</i>	156
<i>Cynontodium</i>		<i>durum</i>	112
<i>capillaceum</i>	155	<i>elegans</i>	179
<i>cernuum</i>	286	<i>ellipticum</i>	112
<i>inclinatum</i>	154	<i>elongatum</i>	170
<i>latifolium</i>	154	<i>exiguum</i>	182
<i>Dicksonia</i>		<i>fagimontanum</i>	204
<i>pusilla</i>	92	<i>falcatum</i>	190
<i>Dicranum</i>		<i>falcatum</i>	173. 177
<i>aciculare</i>	119	<i>flagellare</i>	173
<i>adiantoides</i>	164	<i>flagellare</i>	172
<i>affine</i>	177	<i>flavescens</i>	206
<i>albidum</i>	166	<i>flavidum</i>	194
<i>ambiguum</i>	195	<i>flexuosum</i>	169
<i>aquaticum</i>	184	<i>fulvellum</i>	187. 470
<i>asplenioides</i>	164	<i>fuscescens</i>	174
<i>Bergeri</i>	177	<i>glaucum</i>	166
<i>bipartitum</i>	200	<i>glauc. pumil.</i>	167
		<i>gracilescens</i>	184. 467
		<i>heteromallum</i>	190
		<i>incurvum</i>	162. 465. 480
		<i>intermedium</i>	177. 200
		<i>interruptum</i>	172. 191
			193
		<i>introflexum</i>	171
		<i>lanceolatum</i>	203

<i>latifolium</i>	202. 457	<i>setaceum</i>	195
<i>latifolium</i>	203	<i>spurium</i>	178
<i>longifolium</i>	172	<i>squarrosus</i>	183
<i>longirostrum</i>	174	<i>Starkii</i>	189. 471
<i>majus</i>	173	<i>strictum</i>	200
<i>microcarpum</i>	113	<i>strictum Schleich.</i>	171
<i>montanum</i>	179	<i>strumiferum</i>	181
<i>pallidum</i>	196	<i>subulatum</i>	191
<i>palmatum</i>	163	<i>tamarindifol.</i>	162. 480
<i>paludosum</i>	204	<i>taxifolium</i>	165
<i>palustre</i>	200	<i>tortile</i>	198. 481
<i>patens</i>	14. 127	<i>tortile</i>	157
<i>pellucidum</i>	183. 467	<i>uncinatum</i>	472
<i>pellucidum</i>	204	<i>undulatum</i>	176
<i>piliferum</i>	110	<i>undulatum</i>	177
<i>polycarpum</i>	179	<i>varium</i>	186
<i>polyphyllum</i>	180	<i>virens</i>	182
<i>polysetum</i>	176	<i>virens</i>	180
<i>pulchellum</i>	186	<i>viridulum</i>	161
<i>pulchrum</i>	179	<i>viridul. Schl.</i>	181
<i>pulvinatum</i>	110		
<i>purpurascens</i>	200	<i>Didymodon</i>	
<i>purpureum</i>	199	<i>capillaceum</i>	155
<i>pusillum</i>	194	<i>cylindricum</i>	481
<i>recurvatum</i>	174	<i>flexicaule</i>	156
<i>rigidulum</i>	188	<i>glaucescens</i>	158
<i>rufescens</i>	187	<i>homomallum</i>	137. 156
<i>rupestre</i>	185. 469	<i>inclinatorum</i>	153
<i>rupestre?</i>	174	<i>latifolium</i>	133. 154
<i>saxatile</i>	112	<i>longirostrum</i>	155. 463
<i>saxicola</i>	167. 466	<i>pusillum</i>	157
<i>Schraderi</i>	177	<i>pusillum</i>	158
<i>Schreberi</i>	184	<i>rigidulum</i>	159
<i>Schreberianum</i>	185	<i>trifarum</i>	150. 160
<i>sciuroides</i>	123		
<i>scoparium</i>	173	<i>Diphyscium</i>	
<i>Scottianum</i>	171	<i>foliosum</i>	377
<i>secundum</i>	191		

*Diplocomium**longisetum* 374*Diplostachium* 55*Encalypta**affinis* 106*alpina* 107*ciliata* 107*ciliata* 107*extinctoria* 106*grandis* 107*lanceolata* 129*streptocarpa* 107*vulgaris* 106*Equisetum**arenarium* 60*arvense* 57*capillare* 57*eburneum* 58*fluviale* 58*fluviale* 59*Heleocharis* 59*hyemale* 60*limosum* 59*nodosum* 59*palustre* 59*polymorphum* 59*polystachium* 59*pratense* Ehrh. 58*pratense* Roth. 58*ramosum* 59*reptans* 60*scirpoides* 60. 447*sylvaticum* 57*Telmateja* 58*tenue* 60*variegatum* 60. 447*Fissidens**adiantoides* 164*bryoides* 161*exilis* 161*incurvus* 162*osmundoides* 163*polycarpus* 180*polypodioides* 165*pulvinatus* 109— *S. afric.* 111*sciuroides* 123*sciuroid. vagin.* 126*semicompletus* 129*strumifer* 181. 182*subbasilaris* 165 bis.*taxifolius* 165*Weberi* 331*Fontinalis**albicans* 78*alpina* 121*antipyretica* 376*capillacea* Scop. ? 76*erecta* 122*minor* 121. 377*pennata* 239*squamosa* 376*Funaria**calcareo* 380

<i>dentata</i>	381	<i>Donniana</i>	131
<i>flavicans</i>	380	<i>filiformis</i>	150
<i>hygrometrica</i>	378	? <i>Forsteri</i>	148
<i>Muehlenbergii</i>	380	<i>fragilis</i>	84
Georgia		<i>gracilis</i>	129. 150
<i>Mnemosynum</i>	93	<i>heteromalla</i>	137
Grammitis		<i>lanceolata</i>	136
<i>Ceterach</i>	25	<i>latifolia</i>	137. 147
<i>cheilanthoides</i>	26	<i>maritima</i>	131
<i>leptophylla</i>	26	<i>nigrita</i>	147
Grimmia		<i>nuda</i>	133
<i>aciphylla</i>	139. 457	<i>obliquata</i>	153
<i>acuta</i>	145	<i>obtusa</i>	132
<i>alpestris</i>	110	<i>ornithopodioid.</i>	148
<i>alpicola</i>	129. 131	<i>ovata</i>	112
<i>apostarpa</i>	129	<i>plagiopodia</i>	132
<i>arborea</i>	242	<i>plagiopodia</i>	110. 111
<i>atrovirens</i>	139	<i>pusilla</i>	140
<i>calcarei</i>	141	<i>recurvata</i>	145
<i>canescens</i>	131	<i>rivularis</i>	129
? <i>catenulata</i>	151	<i>rubella</i>	136
<i>cirrata</i>	134	<i>rupicola</i>	146
<i>controversa</i>	133	<i>schisti</i>	144
<i>cribrosa</i>	132	<i>Schleicheri</i>	129
<i>cribrosa</i>	132	<i>Seligeri</i>	140. 459
<i>crinita</i>	456. 478. 480	<i>Starkeana</i>	137
<i>crispa</i>	134	<i>striata</i>	143
<i>crispata</i>	135	<i>stricta</i>	129
<i>crispula</i>	134	<i>sudetica</i>	131
<i>curvirostra</i>	135	<i>trifaria</i>	143. 460
<i>cylindracea</i>	152. 461	<i>verticillata</i>	84
<i>Dicksoni</i>	135	<i>viridula</i>	134
		Gymnostomum	
		<i>acaule</i>	79. 455
		<i>aestivum</i>	89. 90
		<i>aquaticum</i>	76

<i>caespiticiu</i>	77. 453	<i>Hepatica</i>	387
<i>compactum</i>	90	<i>Huperzia</i>	51
<i>curvirostrum</i>	83	<i>Hymenophyllum</i>	
<i>Davallianum</i>	36. 479	<i>alatum</i>	44
<i>decipiens</i>	79. 478	<i>tunbridgense</i>	44
<i>fasciculare</i>	89	<i>Hypnum</i>	
<i>Griffithianum</i>	105	<i>abbreviatum</i>	323 bis.
<i>Hedwigia</i>	78	<i>abietinum</i>	332
<i>Heimii</i>	87	<i>acacioides</i>	164
<i>intermedium</i>	81	<i>aciphyllum</i>	295
<i>lapponicum</i>	77	<i>adiantoides</i>	164
<i>luteolum</i>	90	<i>adnatum</i>	365. 366 bis.
<i>microstomum</i>	85	<i>aduncum</i>	360
<i>minutulum</i>	479	<i>aduncum</i> β <i>tenue</i>	361
<i>nanum</i>	79	<i>affine</i>	332. 357
<i>obtusum</i> H.	87	<i>albicans</i>	330
<i>obtusum</i> Schum.	88	<i>alopecurum</i>	307
<i>osmundaceum</i>	92	<i>alpestre</i>	341
<i>ovatum</i>	80	<i>alpinum</i>	368
<i>pennatum</i>	92	<i>ambiguum</i>	305. 351.
<i>pulvinatum</i>	79		360
<i>pulvinatum</i> 79. 81. 478.	480	<i>androgynum</i>	270
<i>pyriforme</i>	88	<i>annotinum</i>	280
<i>riparium</i>	120	<i>aquatile</i>	306
<i>rufescens</i>	83	<i>argenteum</i>	276
<i>rutilans</i>	85	<i>asplenioides</i>	163. 164
<i>stelligerum</i>	83	<i>atlanticum</i>	327
<i>subsessile</i>	79	<i>atrovirens</i>	326. 337
<i>tenue</i>	86	<i>attenuatum</i>	250
<i>tetragonum</i>	90	<i>aureum</i>	314
<i>trichodes</i>	85	<i>Blandovii</i>	332
<i>truncatulum</i>	81	<i>boreale</i>	287. 483
<i>truncatum</i>	81		
<i>turbinatum</i>	89		
<i>Hedwigia</i>	76		

<i>brevirostrum</i>	354	<i>diastrophyllum</i>	357
<i>bryoides</i>	163	<i>dubium</i> 248. 356.	357
<i>bryoides</i> var.	162		360
<i>caespitium</i>	283. 483	<i>elegans</i>	316
<i>capillaceum</i>	313	<i>elodes</i>	272
<i>capillare</i>	286	<i>exiguum</i>	302
<i>carinatum</i>	373	<i>extricatum</i>	356
<i>carneum</i>	278	<i>? falcatum</i>	359
<i>chryseon</i>	373	<i>fallax</i>	304
<i>chrysophyllum</i>	349	<i>filicifolium</i>	251
<i>cirrosum</i>	373	<i>filiciforme</i>	251
<i>clavellatum</i>	329	<i>filicinum</i>	355
<i>commutatum</i>	356	<i>filicinum</i>	357. 368
<i>complanatum</i>	246	<i>filicin. v. pendula</i>	356
<i>compressum</i>	340. 371	<i>filifolium</i>	251
<i>confertum</i>	329	<i>filiforme</i>	150. 251
<i>confertum</i>	323	<i>flagellare</i>	367. 368
<i>contextum</i>	302. 346	<i>flavescens</i>	330. 360
<i>cordifolium</i>	320	<i>fluitans</i>	358
<i>crassum</i>	372	<i>fluviatile</i>	303
<i>crenulatum</i>	325	<i>fluviatile</i>	304. 366
<i>crispum</i>	239	<i>fontanum</i>	328
<i>Crista castrens.</i>	368	<i>fuscum</i>	372
<i>Crista castrens.</i>	369	<i>glareosum</i>	356
<i>crudum</i>	290	<i>gracile</i>	148
<i>crudum</i>	269	<i>gratum</i>	336
<i>cupressiforme</i>	370	<i>Halleri</i>	352
<i>cupressiforme</i>	355	<i>Halleri</i>	369
<i>curtipendulum</i>	241	<i>hornum</i>	293
<i>curvatum</i>	307	<i>hornum</i>	331
<i>cuspidatum</i>	339	<i>illecebrum</i> 316 bis.	318.
<i>cuspid. β. bicol.</i>	320		319
<i>decipiens</i>	370	<i>implexum</i>	305. 373
<i>delicatulum</i>	333. 334	<i>incurvatum</i>	342
<i>delicatum</i>	334	<i>intermedium</i>	283. 483
<i>dendroides</i>	253	<i>intricatum</i>	309
<i>denticulatum</i>	346	<i>intricatum</i>	327
<i>— γ. obtusif.</i>	347	<i>inundatum</i>	327

<i>lacustre</i>	285. 483	<i>paludella</i>	274
<i>ligulatum</i>	298	<i>palustre</i>	365
<i>longicollum</i>	290. 291	<i>palustre</i>	301
<i>longifolium</i>	331	<i>parietinum</i>	334. 339
<i>longirostrum</i>	323	<i>pendulum</i>	356
<i>longisetum</i>	361	<i>penicilliforme</i>	479
<i>lorenum</i>	352	<i>penniforme</i>	326
<i>lucens</i>	347	<i>piliferum</i>	315
<i>Ludwigianum</i>	322	<i>plicatum</i>	364
<i>Ludwigii</i>	337	<i>plumosum</i>	311
<i>luridum</i>	365	<i>plumosum</i>	305. 311.
<i>lutescens</i>	314		313
<i>marginatum</i>	292	<i>polyanthum</i>	251
<i>medium</i>	247	<i>polymorphum</i>	350
<i>megapolitanum</i>	325	<i>polytrichoides</i>	238
<i>minutulum</i>	335	<i>populeum</i>	305
<i>molle</i>	340	<i>praecox</i>	322
<i>molle</i>	323	<i>praelongum</i>	336
<i>molluscum</i>	369	<i>praelong. ? abbrev.</i>	
<i>murale</i>	323		337
<i>mutabile</i>	306. 371	<i>proliferum</i>	334. 339
<i>muticum</i>	340	<i>prolixum</i>	327
<i>myosuroides</i>	308	<i>protensum</i>	336. 350
<i>myosuroides</i>	308. 314	<i>pseudo - plumos.</i>	311
<i>myosuroid. ♂.</i>	371	<i>pseudo - triquetr.</i>	269.
<i>myosurum</i>	308		288
<i>nigricans</i>	76. 121	<i>pulchellum</i>	343
<i>nigro - viride</i>	312. 355.	<i>pulchellum</i>	322
	371	<i>punctatum</i>	296
<i>nitens</i>	314	<i>purum</i>	316
<i>nitens</i>	315	<i>purum</i>	340
<i>nutans</i>	289	<i>pyriforme</i>	274
<i>obesum ?</i>	324	<i>recognitum</i>	334
<i>ornithopodioid.</i>	148.	<i>reflexum</i>	306. 476
	347	<i>revolvens</i>	360
<i>palatinum</i>	150	<i>riparioides</i>	326
<i>pallens</i>	286. 483	<i>riparium</i>	331
<i>pallidum</i>	331	<i>rivulare</i>	327. 341

<i>roseum</i>	297	<i>Stokesii</i>	336
<i>rostellatum</i>	328	<i>stramineum</i>	320
<i>rostratum</i>	296	<i>striatum</i>	324
<i>rufescens</i>	342	<i>strigosum</i>	321
<i>rugosum</i>	362	<i>strigosum</i>	309
<i>rugosum</i>	364	<i>subsphaerocarpum</i>	366
<i>rugulosum</i>	363	<i>subtile</i>	320
<i>rupestre</i>	341	<i>Swartzii</i>	337
<i>ruscifolium</i>	327	<i>sylvaticum</i>	345
<i>rusciforme</i>	327	<i>sylvaticum</i>	346
<i>rutabulum</i>	324	<i>tamariscinum</i>	333
<i>rutab. γ. virens</i>	325.	<i>taxifolium</i>	165
	328	<i>Teesdalii</i>	309
<i>Saladinianum</i>	153	<i>tenellum</i>	302
<i>salebrosum</i>	312	<i>tenue</i>	302
<i>Schleicheri</i>	329	<i>thuringicum</i>	321
<i>Schreberi</i>	317	<i>Timmii</i>	370
<i>Schreberi</i>	339. 340	<i>trichomanoides</i>	246
<i>Schultzii</i>	331	<i>trichopodium</i>	331
<i>sciuroides</i>	123	<i>trifarium</i>	317. 319
<i>scorpioides</i>	372	<i>trifarium</i>	320
<i>scorpioides</i>	362	<i>triquetrum</i>	354
<i>Seligeri</i>	-302. 356	<i>turbinatum</i>	282
<i>sericeum</i>	249	<i>uliginosum</i>	319
<i>serpens</i>	300	<i>umbratum</i>	338
<i>serrulatum</i>	329 bis.	<i>uncinatum</i>	358
	346. 372	<i>undulatum</i>	348
<i>Silesianum</i>	343	<i>velutinum</i>	310
<i>Smithii</i>	149	<i>velutinum</i>	306. 309
<i>spinulosum</i>	302	<i>virens</i>	325
<i>splendens</i>	338	<i>viticulosum</i>	240
<i>squarrosulum</i>	351	<i>viviparum</i>	308
<i>squarrosulum</i>	353	<i>Wahlenbergii</i>	280 475
<i>Starkii</i>	309	<i>Zierii</i>	275
<i>stellare</i>	294		
<i>stellatum</i>	350	<i>Isoetes</i>	
<i>stellatum</i> Web.	367	<i>lacustris</i>	63

Jungermannia

<i>acris</i>	398
<i>albicans</i>	428
<i>alpina</i>	384
<i>angulosa</i>	489
<i>aquatica</i>	418
<i>asplenoides</i>	420
<i>barbata</i>	430
<i>bicornis</i>	423
<i>bicrenata</i>	407. 431
<i>bicuspidata</i>	424
<i>bicuspid. v. filament.</i>	424
<i>bidentata</i>	408
<i>bidentata</i>	407
<i>birostrata</i>	423
<i>byssacea</i>	423 bis. 424
<i>byssoides</i>	425
<i>capillaris</i>	412
<i>cavifolia</i>	404
<i>ciliaris</i>	413
<i>ciliaris</i>	413. 414
<i>cinerea</i>	402
<i>cochleariformis</i>	426
<i>compacta</i>	427
<i>complanata</i>	416
<i>concatenata</i>	415
<i>connata</i>	404
<i>cordifolia</i>	424
<i>curvifolia</i>	423
<i>dichotoma</i>	430. 435
<i>dilatata</i>	402
<i>dilatata</i>	400
<i>divaricata</i>	424
<i>doelaviensis</i>	411
<i>emarginata</i>	421
<i>endiwiaefolia</i>	432

<i>epiphlaea</i>	404
<i>epiphylla</i>	431
<i>excisa</i>	422 bis.
<i>exsecta</i>	428
<i>exsecta</i>	431
<i>fissa</i>	424
<i>Flörkii</i>	410
<i>fluviatilis</i>	405
<i>fragilis</i>	405
<i>Funckii</i>	422
<i>Funckii</i>	424
<i>furcata</i>	434
<i>globulifera</i>	431
<i>gracilis</i>	430
<i>graveolens</i>	406
<i>heterophylla</i>	407
<i>hirtella</i>	431
<i>incisa</i>	431
<i>julacea</i>	421
<i>juniperina</i>	400
<i>laevigata</i>	398
<i>lanceolata</i>	419
<i>Leersii</i>	413
<i>linearis</i>	435
<i>macrorhiza</i>	422
<i>magellanica</i>	400
<i>minuta?</i>	406
<i>multifida</i>	433
<i>multiflora</i>	413. 425
<i>nemorosa</i>	426
<i>nemorosa</i>	426
<i>nigricans</i>	403
<i>pallescent</i>	404
<i>palmata</i>	433
<i>paludosa</i>	426
<i>pauciflora</i>	413
<i>pinguis</i>	432
<i>plutiphylla</i>	397

<i>polyanthos</i>	418	<i>triangularis</i>	410
<i>Porella</i>	397	<i>Trichomanis</i>	405
<i>pubescens</i>	435	<i>trichophylla</i>	411
<i>pulchella</i>	403	<i>tricrenata</i>	410
<i>pulcherrima</i>	413	<i>tridentata</i>	430
<i>pumila</i>	419	<i>trilobata</i>	409
<i>pusilla</i>	429	<i>umbrosa</i>	427
<i>pygmaea</i>	429	<i>undulata</i>	426
<i>quadridentata</i>	430	<i>varia</i>	422. 428 bis.
<i>quinquedentata</i>	430	<i>ventricosa</i>	425
<i>radicans</i>	409	<i>viticulosa</i>	417
<i>reptans</i>	411		
<i>reptans</i>	424	Koelreutera	378
<i>resupinata</i>	427	Lasia	149
<i>resupinata</i>	426	Leersia	
<i>rivularis</i>	422	<i>fimbriata</i>	107
<i>rupestris</i>	384	<i>lanceolata</i>	136
<i>rupicola</i>	424	<i>pulvinata</i>	110
<i>saxicola</i>	425		
<i>saxicola</i>	415	Lepidotis	52
<i>scalaris</i>	419	Leptodon	149
<i>scutata</i>	408	Leskia	
<i>serpyllifolia</i>	402. 406	<i>attenuata</i>	249
<i>sertularioides</i>	411	<i>brachyclados</i>	248
<i>setacea</i>	349	<i>complanata</i>	245
<i>setiformis</i>	415	<i>dendroides</i>	253
<i>sinuata</i>	433 bis.	<i>elongata</i>	243
<i>sphaerocephala</i>	424	<i>gracilescens</i>	248
<i>sphagni</i>	420	<i>inclinata</i>	244. 482
<i>spinulosa</i>	421	<i>incurvata</i>	248
<i>stolonifera</i>	410	<i>julacea</i>	251
<i>supina</i>	409		
<i>tamarisci</i>	403		
<i>tamariscifolia</i>	398		
<i>tamariscifolia</i>	403		
<i>Thuja</i>	398		
<i>Tomentella</i>	414		
<i>tomentosa</i>	414. 435		

<i>longifolia</i>	314	<i>conica</i>	390
<i>Ludwigii</i>	325	<i>conica</i>	389
<i>marchica</i>	267	<i>dichotoma</i>	390
<i>myosuroides</i>	308	<i>fragrans</i>	391
<i>nitida</i>	343	<i>hemisphaerica</i>	388
<i>obscura</i>	248	<i>hemisphaerica</i>	391
<i>paludosa</i>	246. 366	<i>polymorpha</i>	387
<i>paludosa</i>	304	<i>quadrata</i>	389
<i>palustris</i>	304	<i>triandra</i>	389
<i>plumosa</i>	305. 311. 355	<i>triloba</i>	389
<i>polyantha</i>	251		
<i>polycarpa</i>	247	<i>Marsilea</i>	
<i>pulchella</i>	343	<i>mitis</i>	62
<i>Seligeri</i>	343	<i>nata</i>	62
<i>sericea</i>	249	<i>quadrifolia</i>	61
<i>subtilis</i>	250. 302		
<i>trichomanoides</i>	246	<i>Meesia</i>	
<i>varia</i>	248	<i>dealbata</i>	375
<i>vivipara</i>	308	<i>longiseta</i>	374
Lunularia	387	<i>minor</i>	374
Lycopodium		<i>nutans</i>	288
<i>alpinum</i>	52	<i>uliginosa</i>	374
<i>annotinum</i>	53	Mnium	
<i>clavatum</i>	53	<i>affine</i>	295
<i>complanatum</i>	53	<i>androgynum</i>	271
<i>denticulatum</i>	55	<i>annotinum</i>	281
<i>helveticum</i>	55	<i>caespitium</i>	284
<i>inundatum</i>	52	<i>capillare</i>	287
<i>radicans</i>	55	<i>cirratum</i>	155
<i>selaginoides</i>	54	<i>crudum</i>	290
<i>Selago</i>	51	<i>cuspidatum</i>	295
Marchantia		<i>ellipticum</i>	296
<i>androgyna</i>	390	<i>fissum</i>	424
		<i>fontanum</i>	268

glaciale	280
gracile	286
holosericeum	276
hornum	294
— β . integrif.	294
hygrometricum	379
inordinatum	273
integrifolium	294
intermedium	283
lacustre	285
longirostrum	296
marchicum	267
nigricans	285
osmundaceum	92
palustre	272
pellucidum	93
Pohlia	243
polycephalum	273
polytrichoides α .	228
— — β .	226
pomiforme var.	266
proliferum	297
prolixum	273
pseudo-triquetr.	288
punctatum	296
pyriforme	274
ramosum	273
reclinatum	274
roseum	297
serpyllifolium	296
— α . punct.	296
— β . cuspid.	295
— γ . prolif.	297
— δ . undul.	298
serratum	293
setaceum	195
sphaerocarpum	267

stellare	294
Trichomanis	405
triquetrum	374
turbinatum	285. 287.
	483
turbinatum?	282
undulatum	298

Neckera

bipinnata	149
crispa	238
curtipendula	241
decipiens	150. 241. 473
dendroides	253
heteromalla	242
lutescens	314
minor	241
pennata	239
pennata	239
pumila	239. 240
ulophylla	236
viticulosa	240
viticul. β . min.	240

Nephrodium

asplenioides	37
cristatum?	34
thelypteroid.	32

Octoblepharum

albidum	129
---------	-----

Onoclea

crispa	46
--------	----

<i>spicant</i>	43	<i>Osmunda</i>	
<i>struthiopteris</i>	47	<i>bavarica</i>	49
<i>Ophioglossum</i>		<i>crispa</i>	46
<i>vulgatum</i>	56	<i>Lunaria</i>	49
<i>Orthopyxis</i>	257	<i>Matricariae?</i>	49
<i>Orthotrichum</i>		<i>ramosa</i>	49
<i>affine</i>	233	<i>regalis</i>	48
<i>anomalum</i>	229	<i>spicant</i>	43
<i>aristatum</i>	235	<i>struthiopteris</i>	47
<i>cirratum</i>	237	<i>Phascum</i>	
<i>crispum</i>	237	<i>acaulon</i>	68. 69
<i>cupulatum</i>	230	<i>axillare</i>	63
<i>cupulatum</i>	231	<i>bryoides</i>	65
<i>diaphanum</i>	234	<i>bryoides</i>	66
<i>diaphanum</i>	235	<i>caruolicum</i>	69. 450
<i>hercynicum</i>	217	<i>caulescens</i>	98
<i>heterophyllum</i>	235	<i>cernuum</i>	449
<i>humile</i>	230	<i>cohaerens</i>	452
<i>longisetum</i>	230	<i>confervoides</i>	71
<i>nudum</i>	231	<i>crispum</i>	64. 477
<i>obtusifolium</i>	231	<i>crispum</i>	477 bis.
<i>octoblepharis</i>	233	<i>curvicollum</i>	65
<i>pumilum</i>	232	<i>curvicollum</i>	65
<i>pumilum</i>	233	<i>curvisetum</i>	67. 478
<i>rivulare</i>	234	<i>cuspidatum</i>	68
<i>rupestre</i>	233	<i>cuspidatum</i>	65. 478
<i>striatum</i>	234	<i>elatum</i>	68. 448
<i>striatum</i>	482	<i>elongatum</i>	66
<i>striatum</i> β .	234	<i>Flörkeanum</i>	70. 451
<i>ulmicola</i>	235	<i>grandiusculum</i>	68
		<i>gymnostoides</i>	66
		<i>maximum</i>	68
		<i>multicapsulare</i>	65. 477
		<i>muticum</i>	69

<i>nitidum</i>	64	<i>asplenioides</i>	39
<i>patens</i>	70	<i>austriacum</i>	39
<i>pedunculatum</i>	104	<i>calcareum</i>	29
<i>piliferum</i>	66	<i>Callipteris</i>	32
<i>piliferum</i>	78	<i>cambricum</i>	27
<i>rectum</i>	65. 448	<i>crenatum</i>	37
<i>recurvifolium</i>	70	<i>crispum</i>	36
<i>Schreberianum</i>	68	<i>cristatum</i> L.	32
<i>serratum</i>	71	<i>cristatum</i> auctt.	33
<i>sphaerocarpon</i>	65. 477	<i>cynapifolium</i>	35
<i>stoloniferum</i>	71	<i>dentatum</i> D.	36
<i>strictum</i>	64	<i>dentatum</i> H.	37
<i>subulatum</i>	64	<i>dilatatum</i>	33
<i>velutinum</i>	71	<i>Dryopteris</i>	29
		<i>Dryopteris</i> Dicks.	29
<i>Pilularia</i>		<i>Dryopteris</i> Fl. dan.	33
<i>globulifera</i>	61	<i>Filix femina</i> L.	37
		<i>Filix fem.</i> Hoffm.	37
<i>Plananthus</i>	51	<i>Filix mas</i>	32
<i>Pohlia</i>		<i>fontanum</i>	35
<i>elongata</i>	243. 283. 289	<i>fragile</i>	35
<i>inclinata</i>	244. 482	<i>fumarioides</i>	35
<i>intermedia</i>	283. 482	<i>Heliopteris</i>	33
<i>minor</i>	244	<i>hexagonopterum</i> ?	28
<i>pallens</i>	286	<i>hyperboreum</i>	27
<i>Polypodium</i>		<i>ilvense</i>	28
<i>aculeatum</i>	34	<i>incisum</i>	37
<i>alpinum</i>	36	<i>leptophyllum</i>	26
<i>anthriscifolium</i>	35	<i>limbospermum</i>	31
— v. <i>angust.</i>	35	<i>Lonchitis</i>	30
<i>aristatum</i>	34	<i>Marantae</i>	28
<i>arvonicum</i>	27	<i>molle</i>	37
		<i>montanum</i>	38
		<i>montanum</i> Vogl.	31
		<i>myrrhidifol.</i>	38
		<i>Oreopteris</i>	31
		<i>ovato - crenat.</i>	37
		<i>pedicularifol.</i>	35

<i>Phegopteris</i>	28	commune α .	221
pteroides	31	— β .	219
rhaeticum	35. 36	— γ .	219
rigidum	33	controversum	217
robertianum	29	Dicksoni	227
setiferum	34	elatum	221
spinulosum	33	elongatum	221
spinulosum Schrk.	37	ericoides	228
tanacetifolium	33	ferrugineum?	224
tenue	35	formosum	221
Thelypteris L.	31	gracile	222
Thelypteris auctt.	31	hercynicum	217
trifidum	37	intermedium	228
virginianum	27	juniperifolium	219
vulgare	26	juniperinum	219. 220
		laterale	227
		longisetum	222
		minimum	227
		nanum	227
		norvegicum	223
		Oederi?	223
		pallidisetum	222
		perigoniale	221
		piliferum	218
		pulverulentum	227
		pumilum	228 bis.
		remotifolium	221
		rubellum	226
		septentrionale	223
		saxangulare	223
		strictum	220
		subpilosum	221
		subrotundum	228
		sylvaticum	225
		undulatum	216
		— β . minus	217
			bis.
<i>Polystichum</i>			
multiflorum	33		
spinosum	33		
strigosum	33		
<i>Polytrichum</i>			
affine	219		
aloides	226		
aloides	226		
aloid. nanum	227		
alpestre	219. 220		
alpinum	225		
alpinum	225		
angustatum	217		
arcticum	225		
attenuatum	222		
aurantiacum	222 bis.		
australe	224		
commune	221		

<i>urnigerum</i>	226	<i>ciliaris</i>	442
<i>yuccae-folium</i>	221	<i>ciliata</i>	442
Pottia		<i>coriandrina</i> ?	442
<i>cavifolia</i>	80	<i>crystallina</i>	438
<i>eustoma</i>	81	<i>crystallina</i>	441
Pterigynandrum		<i>fluitans</i>	443
? <i>catenulatum</i>	151	<i>fluitans</i>	440
<i>filiforme</i>	150	<i>glauca</i>	440
<i>gracile</i>	148. 151	<i>glauca</i>	440
<i>julaceum</i>	153	<i>major</i>	442
<i>longifolium</i>	152	<i>minima</i>	441. 442
<i>nervosum</i> ?	152	<i>minoriformis</i>	441
<i>patens</i>	127	<i>natans</i>	443
<i>Smithii</i>	149	<i>natans</i>	440
<i>subcapillatum</i>	149	<i>pellucida</i>	439
<i>trichomitrium</i>	149. 153	<i>pyramidata</i>	438. 443
		<i>venosa</i>	441
Pteris		Salvinia	
<i>aquilina</i>	45	<i>natans</i>	62
<i>crispa</i>	45	Schistostega	
<i>heterophylla</i>	46	<i>osmundacea</i>	92
<i>septentrionalis</i>	39	Scolopendrium	
Rhizophyllum	396	<i>alternifolium</i>	42
Riccia		<i>Ceterach</i>	25
<i>bifurca</i>	441	<i>officinarum</i>	42
<i>canaliculata</i>	444	<i>Phyllitis</i>	42
<i>capillaris</i>	444	<i>Ruta muraria</i>	41
<i>capillata</i>	443	<i>septentrionale</i>	39
<i>cavernosa</i>	439	<i>vulgare</i>	42
		Selaginella	54

Selago**Sphaeria**

Pteridis

Sphaerocarpus 439**Sphagnum**

<i>acutifolium</i>	73
<i>alpinum</i> L.	170
<i>alpinum</i> Rül.	74
<i>arboreum</i>	242
<i>capillifolium</i>	74
<i>compactum</i>	73
<i>condensatum</i>	72. 73
<i>crassisetum</i>	73
<i>cuspidatum</i>	74
<i>cymbifolium</i>	72
<i>cymbif. borbon.</i>	72
<i>ericetorum</i>	73
<i>gracile</i>	74
<i>intermedium</i>	74
<i>javense</i>	166
<i>latifolium</i>	72
<i>magellanicum</i>	72
<i>oblongum</i>	73
<i>obtusifolium</i>	72
<i>palustre</i>	72. 74
<i>patens</i>	73
<i>pentastichum</i>	74
<i>recurvum</i>	74
<i>squarrosum</i>	73
<i>subulatum</i>	74
<i>tenellum</i>	72
<i>vulgare</i>	72

51

Splachnum

<i>ampullaceum</i>	99
<i>angustatum</i>	97
<i>attenuatum</i>	99
<i>austriacum</i>	105
<i>bavaricum</i> ?	100
<i>brewerianum</i>	97. 104
<i>bryoides</i>	102
<i>caulescens</i>	97
<i>fastigiatum</i>	104
<i>flagellare</i>	99
<i>Frölichianum</i>	104
<i>gracile</i>	101
<i>helveticum</i>	98
<i>ligulatum</i>	99
<i>lingulatum</i>	97. 105
<i>longisetum</i> ?	100
<i>magellanicum</i>	98
<i>minioides</i>	103
<i>ovatum</i>	99. 101
<i>piliferum</i>	103
<i>punctatum</i>	104
<i>pusillum</i>	102
<i>refractum</i>	106
<i>reticulatum</i>	104
<i>rugosum</i>	101
<i>serratum</i>	98
<i>setaceum</i>	97
<i>sphaericum</i>	100
<i>sphaericum</i>	101
<i>tenue</i>	98
<i>tenue</i>	99
<i>Turnerianum</i>	99
<i>urceolatum</i>	102
<i>vasculosum</i>	100

Stachygynandrum 55

Struthiopteris		<i>acuta</i>	214
<i>spicant</i>	43	<i>apiculata</i>	210, 481 bis.
Swartzia		<i>aristata</i>	210
<i>capillacea</i>	155	<i>barbata</i>	211
<i>inclinata</i>	154	<i>crocea</i>	214, 481
<i>pilifera</i>	203	<i>cuneifolia</i>	207
<i>trifaria</i>	160	<i>curvata</i>	206
Syntrichia		<i>decipiens</i>	481
<i>norvagica</i>	215	<i>ericetorum</i>	216
<i>ruralis</i>	215	<i>flavescens</i>	206
<i>subulata</i>	214	<i>goettingensis</i>	215
Targionia		<i>hercynica</i>	207
<i>hypophylla</i>	391	<i>Hoffmanni</i>	208
Tectaria	30	<i>imberbis</i>	211
Tetraphis		<i>inclinata</i>	206
<i>ovata</i>	95	<i>mucronulata</i>	209, 481
<i>pellucida</i>	93	<i>muralis</i>	207
<i>rigida</i>	95	<i>muralis v. aestiva</i>	207
Timmia	374	<i>mutica</i>	208
<i>austriaca</i>	254	<i>pilosa</i>	215
<i>cucullata</i>	259	<i>revoluta</i>	210
<i>megapolitana</i>	254	<i>Saussuriana</i>	214
<i>megapolitana</i>	254	<i>subulata</i>	214
Tortula		<i>tortuosa</i>	206
<i>acuminata</i>	207	<i>unguiculata</i>	208, 209, 213, 481 bis.
		Trematodon	
		<i>longicollis</i>	195
		Trentepohlia	
		<i>erecta</i>	281
		Trichomanes	
		<i>pyxidiferum</i>	44
		<i>tunbridgense</i>	44

Trichostomum

<i>aciculare</i>	119
<i>affine</i>	127
<i>angustatum?</i>	160
<i>aquaticum</i>	119. 120
<i>canadense</i>	115
<i>canescens</i>	116
<i>cirratum</i>	180
<i>cylindricum</i>	202
<i>elongatum</i>	117
<i>ericoides</i>	117
<i>fasciculare</i>	117
<i>fontinaloides</i>	121
<i>fontinaloides</i>	76
<i>glaucescens</i>	158
<i>heterostichum</i>	113
<i>hypnoides</i>	115 bis.
<i>lanuginosum</i>	114
<i>lineare</i>	468
<i>linoides</i>	199
<i>microcarpum</i>	113
<i>nigricans</i>	120
<i>nudum</i>	127
<i>obtusum</i>	120. 128
<i>ovatum</i>	111
<i>pallidum</i>	196. 197
<i>patens</i>	125
<i>piliferum</i>	203
<i>polyphyllum</i>	180
<i>pulvinatum</i>	109
<i>pusillum</i>	158
<i>ramigerum</i>	115
<i>riparium</i>	120
<i>sciuroides</i>	123. 479
<i>serratum</i>	115. 180
<i>strictum</i>	197
<i>strumiferum</i>	197

<i>tenue</i>	158. 198
<i>tenuifolium</i>	202
<i>tortile</i>	198

Vittaria

<i>Ceterach</i>	25
-----------------	----

Webera

<i>clandestina</i>	266
<i>Diphyscium</i>	377
<i>intermedia</i>	290
<i>longicollis</i>	269. 291
<i>mutabilis</i>	289
<i>nutans</i>	289
<i>pyriformis</i>	269. 270. 274

Weissia

<i>aciphylla</i>	139. 457
<i>acuta</i>	146
<i>bi-partita</i>	136
<i>calcareae</i>	141
<i>cirrata</i>	135
<i>controversa</i>	133
<i>crispa</i>	134
<i>crispula</i>	134
<i>denticulata</i>	144
<i>Dicksoni</i>	135
<i>fugax</i>	143
<i>gypsacea</i>	84
<i>heteromalla</i>	137
<i>ithyphylla maj.</i>	234
<i>ithyphylla min.</i>	230
<i>latifolia</i>	147
<i>Ludwigii</i>	143
<i>major</i>	234

Index.

509

microodonta	133. 134	rosea	133
minor	230	rupestris	146
nana	139	Starkeana	138
nigrita	147	trifaria	143
octoblepharis	233	tristicha	143
paludosa	134. 135	ulophylla	237
pusilla	140	virens	134
recurvirostra	136	viridula	134

607

Index

181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

Kiel,

gedruckt von C. L. Wäser.



Weber, Friedrich

Handbuch der Einleitung in das Studium der Kryptogamischen Gewächse

Bd.: 1

Kiel 1807

Phyt. 762-1

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10303848-3